CAHIERS DES ECN

Collection sous la direction de G. Perlemuter, D. Montani, L. Perlemuter

Urgences Réanimation

D. Osman


Anesthésie

M.-P. Bonnet, K. Bouferrache, J. Josserand

INCLUSES les CONFÉRENCES de CONSENSUS

ECN +++

- Le cours synthétique
- Les sujets tombés depuis 10 ans
- Les liens transversaux
- Les zéros aux questions
- Les fiches *Dernier tour*



MASSON

Copyrighted material

Internat



Etudiants en Médecine

ECN blanches

Epreuves Classantes Nationales blanches

La 1re étape d'un partenariat pour vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel

Les ECN blanches les plus proches du véritable examen

- 3 demi-journées dans les mêmes conditions que le jour J !
- 9 dossiers d'1 heure rédigés et corrigés par un board d'experts pluridisciplinaire
- Classement national et régional sous 15 jours
- Résultats confidentiels par courrier et sur www.internat.sanofi-aventis.com
- + de 20 facultés partenaires

Les ECN blanches les plus proches des étudiants

- 15 ans d'expertise
- 2 sessions par an
- 66 % des étudiants de DCEM4
- Épreuves le samedi toute la journée et le dimanche matin
- Nouveau site internet

Pour plus d'information :

- Affichage, en faculté et à l'hôpital
- Site Internet : www.internat.sanofi-aventis.com
- Jeunes médecins Services : 0 805 45 56 56 (appel gratuit)

sanofi aventis

Copyrighted material

Copyrighted material

Urgences
Réanimation
Anesthésie

This One
Q4B7-GGX-JLA3
Copyrighted material

Chez le même éditeur

Dans la même collection : *Cahiers des ECN*
Chirurgie digestive – Chirurgie orthopédique, par I. Dagher, E. Dagher. 2007, 128 pages.
Dermatologie, par M. Bergis. 2006, 232 pages.
Gynécologie – Obstétrique, par A.-C. Donnadieu, C. Firtion. 2006, 416 pages.
Médecine légale – Médecine du travail – Pharmacologie, par M. Coffy, M. Bardou, F. Goirand, P. Lirussi. 2007, 272 pages.
Neurologie, par A. Bertrand, S. Epelbaum. 2006, 432 pages.
Pneumologie, par D. Montani, C. Tcherakian. 2006, 320 pages.
Santé publique, par J. Rongère, M.-P. Tavolacci. 2006, 240 pages.
Urologie, par l'Association Française des Urologues en Formation. 2007, 276 pages.

Dans la collection *Abrégés Connaissances et Pratique*
Réanimation et urgences, par le CNERM (Collège national des enseignants de réanimation médicale). 2005, 2e édition, 640 pages.

Dans la collection *Réviser et s'entraîner en DCEM*
Réanimation et urgences, par L. Sabbah. 2004, 168 pages.

Guide de thérapeutique, par L. Perlemuter, G. Perlemuter. 2006, 4e édition, 2016 pages.
Guide de thérapeutique – version ebook, par L. Perlemuter, G. Perlemuter. Document téléchargeable sur le site : www.masson.fr

Copyrighted material

Collection sous la direction de

Gabriel PERLEMUTER
Professeur des universités
Praticien hospitalier

David MONTANI
Chef de clinique des universités
Assistant hospitalier

Léon PERLEMUTER
Professeur des universités

Urgences

Réanimation

David OSMAN
Réanimateur, praticien hospitalier, service de réanimation médicale,
hôpital de Bicêtre, le Kremlin-Bicêtre

Anesthésie

Marie-Pierre BONNET
Chef de clinique-assistant en anesthésie-réanimation,
hôpital Antoine-Béclère, AP-HP

Koceila BOUFERRACHE
Interne en anesthésie-réanimation des hôpitaux de Paris

Julien JOSSERAND
Interne en anesthésie-réanimation des hôpitaux de Paris



ELSEVIER
MASSON

Copyrighted material



Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du « photocopillage ». Cette pratique qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70.

Maquette intérieure de Pascal Plottier

Avertissement
Les DCI sont en caractères droits minuscules.
Les marques déposées sont en caractères italiques, commençant par une majuscule.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (L. art. L 122-4, L 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© 2007 Elsevier Masson SAS – Tous droits réservés

ISBN : 978-2-294-08340-2

Elsevier Masson S.A.S. – 62, rue Camille Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex

Copyrighted material

Avant-propos

Cette nouvelle collection destinée à la préparation aux épreuves classantes nationales (ECN) tient compte de la réforme du programme de DCEM2-DCEM4 de 2001.

Cette collection suit un découpage par spécialité, chaque ouvrage traitant l'ensemble des items figurant au programme de la spécialité.

Nous avons souhaité rendre les plus synthétiques et les plus pratiques possibles, ces ouvrages pour faciliter le travail de mémorisation de l'étudiant :

- **Synthétiques :** les auteurs, proches de la réalité des épreuves classantes nationales, ont privilégié **un style et une structure** qui permettent non seulement de lire et d'acquérir facilement les items mais aussi de retenir rapidement le contenu grâce à la fiche « Dernier tour » ;
- **Pratiques :** chaque chapitre commence systématiquement par un encadré qui récapitule les objectifs de l'item, les liens transversaux, les conférences de consensus, les sujets tombés avec leur date et le résumé des Annales.

Par rapport aux ouvrages existants, **des innovations originales** ont été apportées :

- ***Pour comprendre.*** Il s'agit d'une introduction expliquant les notions essentielles qui permettent d'appréhender mieux l'item.
- ***Les conférences de consensus ou d'experts.*** Elles font le point sur un problème d'actualité. Ces conférences sont importantes car elles font appel aux meilleurs spécialistes de la question, dont elles soulignent l'intérêt. Le consensus évite des attitudes différentes entre auteurs. La présence d'une conférence de consensus rend un sujet plus facilement « tombable » aux ECN car la correction est moins sujette à discussion.

Les conférences sont référencées pour qu'on puisse les consulter à part. Un encadré de l'énoncé et du contenu des conférences permet de les repérer aisément.



Ces conférences sont rappelées en début de chapitre et s'il n'en existe aucune sur le sujet, cela est également précisé.

- ***Les items « tombés » au concours de l'Internat ou aux ECN au cours des dix dernières années*** sont signalés face au texte concerné mais sont résumés avec leur énoncé et leurs questions en début de chapitre.



- ***Les liens transversaux*** renvoient aux ITEMS qui traitent les mêmes sujets au sein du programme mais sous un angle différent. Ils sont signalés dans le texte mais sont également récapitulés en début de chapitre.

Copyrighted material

■ ***Les zéros*** 0 marquent la note nulle obtenue à l'ensemble de la question dans le cadre des dossiers des ECN en cas d'oubli de la notion ainsi signalée. Ils figurent à deux endroits : dans la marge, en regard du texte concerné pour qu'on puisse facilement les repérer et les compter, ainsi que dans la fiche « Dernier tour ».

■ ***La fiche « Dernier tour »*** permet en un instant de se remémorer le contenu de l'item. Elle peut comporter un arbre décisionnel si cela est nécessaire.

■ ***Les images-types.*** Nous avons placé au fil du texte, les images les plus caractéristiques, sachant qu'elles valent mieux qu'un long discours.

Telle qu'elle est, **cette collection est incontournable pour l'étudiant en médecine.** Nous souhaitons qu'elle devienne une référence pour le médecin.

Gabriel PERLEMUTER

David MONTANI

Léon PERLEMUTER

Copyrighted material

Table des matières

Avant-propos V

Abréviations XI

Urgences
Réanimation

ITEM 104 Septicémie 3
- I. Physiopathologie 4
- II. Causes 5
- III. Diagnostic 7
- IV. Prise en charge 10

ITEM 185 Arrêt cardio-circulatoire 21
- I. Physiopathologie 22
- II. Causes 23
- III. Diagnostic 23
- IV. Prise en charge 24

ITEM 193 Détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures 31
- I. Physiopathologie 32
- II. Causes 35
- III. Diagnostic 38
- IV. Prise en charge 39

ITEM 200 État de choc 49
- I. Physiopathologie 50
- II. Causes 53
- III. Diagnostic 54
- IV. Prise en charge 57

ITEM 211 Œdème de Quincke et anaphylaxie 65
- I. Physiopathologie 66
- II. Causes 66
- III. Diagnostic 67
- IV. Prise en charge 71

ITEM 214 Principales intoxications aiguës 77
- I. Diagnostic 78
- II. Intoxication par psychotropes 83
- III. Intoxication par cardiotropes 85
- IV. Intoxication par le monoxyde de carbone 87
- V. Intoxication alcoolique aiguë (IAE) 91
- VI. Intoxication par antalgiques 93
- VII. Prise en charge 94

Copyrighted material

ITEM 219 **Troubles de l'équilibre acidobasique et désordres hydroélectrolytiques** 103
Troubles de l'équilibre acido-basique 105
I. Physiopathologie 106
II. Acidose métabolique 108
III. Alcalose métabolique 109
IV. Acidose respiratoire 110
V. Alcalose respiratoire 111
Dysnatrémies 111
I. Physiopathologie 112
II. Hyponatrémies 113
III. Hypernatrémies 117
Dyskaliémies 118
I. Physiopathologie 118
II. Hyperkaliémies 119
III. Hypokaliémies 122
Dyscalcémies 125
I. Physiopathologie 125
II. Hypercalcémies 126
III. Hypocalcémies 128

ITEM 230 **Coma non traumatique** 137
I. Physiopathologie 138
II. Causes 138
III. Diagnostic 140
IV. Prise en charge 144

ITEM 252 **Insuffisance rénale aiguë – Anurie** 149
I. Physiopathologie 151
II. Causes 153
III. Diagnostic 159
IV. Prise en charge 164

ITEM 91 **Infections nosocomiales** 175
I. infection nosocomiale en réanimation 176
II. Infections urinaires sur sonde 181
III. Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) 184
IV. Infections liées aux cathéters veineux centraux (CVC) 187
V. Infections du site opératoire 193

Anesthésie

ITEM 66 **Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses** 205
I. Stratégie de prise en charge globale d'une douleur aiguë ou chronique 207
II. Traitements médicamenteux de la douleur 207
III. Traitements non médicamenteux 218
IV. Évaluation de l'efficacité du traitement antalgique 221

ITEM 67 **Anesthésie locale, locorégionale et générale** 225
I. Anesthésie générale (AG) 226
II. Anesthésie locale et locorégionale (ALR) 229
III. Obligations réglementaires à respecter avant une anesthésie 232

Copyrighted material

ITEM 201 **Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces** 239

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un brûlé 240
I. Épidémiologie 241
II. Étiologie 241
III. Physiopathologie 242
IV. Diagnostic positif 243
V. Prise en charge thérapeutique 245
VI. Complications 246

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un polytraumatisé 247

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé abdominal 255
I. Épidémiologie 256
II. Physiopathologie 256
III. Prise en charge diagnostique 256
IV. Prise en charge thérapeutique 258
V. Traumatismes abdominaux : exemples 259
VI. Principales complications des traumatismes abdominaux 262

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé crânien 263
I. Traumatisé crânien non grave adulte 264
II. Traumatisé crânien grave 265

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé des membres 271
I. Généralités sur les fractures traumatiques des membres 272
II. Complications locales 276
III. Complications générales 280
IV. Autres complications 283

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé du bassin 283
I. Mécanismes lésionnels 284
II. Prise en charge préhospitalière 284
III. Prise en charge hospitalière 285

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé thoracique 287
I. Physiopathologie 288
II. Examen clinique 289
III. Examens complémentaires 289
IV. Prise en charge des lésions principales 290

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces devant une plaie des parties molles 297
I. Prise en charge diagnostique 298
II. Prise en charge thérapeutique 299
III. Spécificités et complications 301

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé du rachis 304
I. Epidémiologie 306
II. Physiopathologie 306
III. Les différents types de fractures et lésions rachidiennes 311
IV. Prise en charge préhospitalière 317
V. Prise en charge hospitalière 318
VI. Prise en charge thérapeutique 324
VII. Complications 327

Index 345

Copyrighted material

Copyrighted material

Abréviations

ACSOS	agressions cérébrales secondaires d'origine systémique
AG	anesthésie générale
AINS	anti-inflammatoire non stéroïdien
AL	anesthésiques locaux
ALR	anesthésie locorégionale
ATP	adénosine triphosphate
AVP	accident de la voie publique
BGN	bacilles à Gram négatif
BGP	bacilles à Gram positif
BLSE	bétalactamase à spectre élargi
BMR	bactéries multirésistantes
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive
bpm	battements par minute
BZP	benzodiazépines
C3G	céphalosporine de 3e génération
CGP	cocci à Gram positif
CGR	concentrés érythrocytaires
CIVD	coagulation intravasculaire disséminée
CPK	créatine phosphokinase
cpm	cycles par minute
CRP	*C Reactive Protein*
CVC	cathéter veineux central
DAE	défibrillation automatisée externe
DFG	débit de filtration glomérulaire
ECBU	examen cytobactériologique des urines
ECG	électrocardiogramme
EER	épuration extrarénale
ENS	échelle numérique simple
EVA	échelle visuelle analogique
EVS	échelle verbale simple
FC	fréquence cardiaque
Fg	fibrinogène
FR	fréquence respiratoire
FV	fibrillation ventriculaire
GCS	score de Glasgow
GEM	glomérulonéphrite extramembraneuse
GISA	*Staphylococcus aureus* résistant aux glycopeptides
HAD	hormone antidiurétique
Hb	hémoglobine
HbCO	carboxyhémoglobine
HEA	hydroxyéthylamidon
HED	hématome extra-dural
HSD	hématome sous-dural
HSF	hyalinose segmentaire et focale
HTIC	hypertension intracrânienne
IAE	intoxication alcoolique aiguë
IAS	infection associée aux soins
IEC	inhibiteur de l'enzyme de conversion
IPD	interphalangienne distale
IPP	interphalangienne proximale
IRA	insuffisance rénale aiguë
IVD	intraveineux direct
IVSE	intraveineux à la seringue électrique
LCR	liquide céphalorachidien
MCP	métacarpophalangienne
MEOS	système microsomial d'oxydation
MS	mort subite
NFS	numération-formule sanguine
NO	monoxyde d'azote
NTA	nécrose tubulaire aiguë
OAP	œdème aigu du poumon
PA	pression artérielle
PAF	*Platelet-Activated Factor*
PAM	pression artérielle moyenne
PAS	pression artérielle systolique
PAVM	pneumopathie acquise sous ventilation mécanique
PBR	ponction-biopsie rénale
PCA	*Patient Controlled Analgesia*
PCI	produits de contraste iodés
PEP	pression expiratoire positive

Copyrighted material

PFC	plasma frais congelé
PIC	pression intracrânienne
PL	ponction lombaire
PO	*per os*
PPC	pression de perfusion cérébrale
PTH	parathormone
PTT	purpura thrombotique thrombocytopénique
RCP	réanimation cardiopulmonaire
RP	radiographie pulmonaire
SARM	*Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline
SCB	surface cutanée brûlée
SDRA	syndrome de détresse respiratoire aiguë
SEP	sclérose en plaques
SHR	syndrome hépatorénal
SHU	syndrome hémolytique et urémique
SIRS	syndrome de réponse inflammatoire systémique
SMR	segment mobile rachidien
SpO_2	saturation pulsée en oxygène
SRAA	substance réticulée activatrice ascendante
SSIH	syndrome de sécrétion inappropriée d'HAD
SSPI	salle de surveillance postinterventionnelle
SVM	segment vertébral moyen
TA	trou anionique
TC	tronc cérébral
TCA	temps de céphaline activé
TCG	traumatisme crânien grave
TDM	tomodensitométrie
TNF	*Tumor Necrosis Factor*
TP	taux de prothrombine
UFC	unité formant colonie
VRE	entérocoque résistant à la vancomycine
VS	vitesse de sédimentation

Copyrighted material

Urgences Réanimation

David OSMAN

Copyrighted mater

Copyrighted material

ITEM 104

Septicémie

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer une septicémie.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 80 Endocardite infectieuse.

ITEM 105 Surveillance des porteurs de valve et de prothèse vasculaire.

ITEM 173 Prescription et surveillance des antibiotiques.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 203 Fièvre aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. Critères de gravité d'un syndrome infectieux.

CONSENSUS



- Antibiothérapie probabiliste des états septiques graves – Conférence d'experts – SFAR, SRLF, SPILF, 14 septembre 2004. www.srlf.org
- Prise en charge initiale des états septiques graves de l'adulte et de l'enfant – Expertise collective – Groupe transversal Sepsis : SRLF, SFAR, SPILF, 24 octobre 2006. www.srlf.org
- Prise en charge des candidoses et aspergilloses invasives de l'adulte – Conférence de consensus commune – SRLF, SFAR, SPILF, 13 mai 2004. www.srlf.org

POUR COMPRENDRE...

- Le terme de « septicémie » n'est plus utilisé mais est remplacé par le terme de « bactériémie ».
- La bactériémie est la présence de bactéries viables dans le sang. On parle également de virémie, fongémie et parasitémie.
- Une bactériémie est soit asymptomatique, soit associée à un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS), à un sepsis sévère ou à un choc septique.
- Le SIRS est caractérisé par la présence d'au moins deux des signes suivants :
 - température > 38,3 °C ou < 36 °C ;

Copyrighted material

– pouls > 90 bpm ;

– fréquence respiratoire > 20 cpm ou hyperventilation alvéolaire ($PaCO_2$ < 32 mmHg) ;

– glycémie > 7,7 mmol/L ;

– leucocytes > 12 000/mm^3 ou < 4 000/mm^3 ou > 10 % de formes immatures ;

– altération des fonctions supérieures ;

– temps de recoloration capillaire > 2 s ;

– lactatémie > 2 mmol/L.

■ La bactériémie y est en générale massive. Le SIRS n'est pas toujours d'origine infectieuse (maladie systémique, hémopathie, polytraumatisme, pancréatite).

■ Le sepsis sévère et le choc septique représentent les formes les plus graves de SIRS d'origine infectieuse. Deux définitions, plus descriptives que physiopathologiques, permettent de les distinguer au moyen d'éléments cliniques et biologiques simples :

– le sepsis sévère est défini comme un sepsis associé à une hypotension répondant au remplissage vasculaire et/ou une hypoperfusion et/ou une dysfonction d'au moins un organe : encéphalopathie septique, syndrome de détresse respiratoire aigu, oligurie < 1 mL/kg/h, acidose métabolique, hyperlactacidémie, coagulation intravasculaire disséminée ;

– le choc septique est défini comme un sepsis avec une hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire adéquat et/ou la nécessité d'utiliser des drogues vasoactives associées à une hypoperfusion et/ou une dysfonction d'au moins un organe.

■ Les cocci à Gram positif (CGP) sont en cause dans 50 % des septicémies, suivis des bacilles à Gram négatif (BGN) (35 %) puis des champignons (levures) (5 %).

■ Les septicémies sont responsables de 1 à 2 % des hospitalisations et associées à une mortalité globale de 20 %.

■ 47 % des bactériémies en France sont acquises en milieu hospitalier (on parle de bactériémies nosocomiales).

I. PHYSIOPATHOLOGIE

Une phase d'« invasion de l'hôte » est suivie d'une phase de « réponse de l'hôte », souvent responsable de la symptomatologie.

A. Invasion de l'hôte

Trois mécanismes peuvent être à l'origine d'une septicémie.

■ **Origine thrombophlébitique** : les bactéries colonisent d'abord le réseau veineux du tissu infecté. Un caillot se forme alors dans la lumière veineuse et les bactéries s'y multiplient. La fragmentation secondaire du caillot libère les bactéries dans la circulation veineuse. Des localisations infectieuses à distance

Copyrighted material

(embols septiques) sont alors possibles. Dans ce mécanisme de septicémie, la libération des bactéries dans la circulation sanguine est irrégulière.

■ **Origine lymphatique** : les bactéries colonisent d'abord le réseau lymphatique du tissu infecté. Les bactéries qui s'y multiplient sont véhiculées dans le canal thoracique, puis libérées dans la circulation sanguine. Le risque de localisation secondaire est moindre. La libération des bactéries dans la circulation sanguine est régulière.

■ **Origine endocarditique** : les bactéries se multiplient au sein d'une lésion valvulaire : la végétation. Les bactéries sont libérées dans la circulation de façon assez constante tandis que des fragments de fibrine infectée provenant de la végétation sont libérés irrégulièrement dans la circulation. Le risque de localisation secondaire est élevé ➤ ITEM 80.

B. Réponse de l'hôte ➤ ITEM 200

La présence du micro-organisme dans le sang et/ou de ses toxines (acides téichoïques des CGP, lipopolysaccharides des BGN) entraîne une activation de l'immunité cellulaire et humorale. Au plan cellulaire, l'activation des polynucléaires, du système monocytomacrophagique, des plaquettes, des cellules endothéliales va être responsable de la sécrétion de nombreux médiateurs pro-inflammatoires : cytokines (TNF, IL1, IL6, IL8), eicosanoïdes (leucotriènes, prostaglandines, thromboxanes), *Platelet-Activated Factor* (PAF), radicaux libres et monoxyde d'azote (NO), facteurs de la coagulation. Au plan humoral, on observe une activation des voies classiques et alternes du complément et une activation du système kallicréine-kinine. Parallèlement intervient la libération de cytokines anti-inflammatoires (IL4, IL10, TGF-β).

La réponse systémique est le produit de l'équilibre entre le versant pro-inflammatoire et le versant anti-inflammatoire.

II. CAUSES

A. Septicémie à staphylocoque

■ La porte d'entrée est :

– souvent liée à un corps étranger implanté : cathéter, prothèse vasculaire, sonde de pacemaker, prothèse orthopédique ;

– ou bien peut être cutanée, ORL ou gynécologique.

■ Dans 30 % des cas, la porte d'entrée n'est pas retrouvée.

■ Elle est parfois associée à une endocardite : une échographie est donc souvent justifiée afin d'éliminer cette hypothèse.

■ En situation nosocomiale, la possibilité d'un staphylocoque résistant à la méticilline doit être évoquée.

Copyrighted material

■ Une forme particulière est le *Toxic Shock Syndrome* qui associe un sepsis et une érythrodermie scarlatiniforme.

B. Septicémie à streptocoque

La porte d'entrée peut être déterminée à partir de la classification de Lancefield :

■ cutanée : streptocoque du groupe A, rarement C ou G ;

■ digestive : entérocoque et streptocoque du groupe D (*S. bovis*, particulièrement), imposant la réalisation d'une coloscopie ;

■ gynécologique : streptocoque du groupe B *(S. agalactiae)*, imposant une consultation spécialisée ;

■ urinaire : entérocoque et streptocoque du groupe B *(S. agalactiae)*, nécessitant une exploration de l'arbre urinaire (TDM) ;

■ ORL : streptocoque du groupe A ;

■ dentaire : streptocoques non groupables ;

■ pulmonaire : S. *pneumoniae* (streptocoque non groupable).

Les septicémies à streptocoques non groupables dentaires et S. *bovis* sont souvent associées à une endocardite, imposant la réalisation d'une échocardiographie.

C. Septicémie à bacilles Gram négatif

La porte d'entrée est :

■ une infection urinaire ou digestive : entérobactéries *(E. coli, Proteus sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Citrobacter sp.)* ;

■ une infection nosocomiale urinaire, pulmonaire, du site opératoire ou d'un cathéter vasculaire : entérobactéries et BGN non entérobactéries *(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia)*.

D. Septicémie à anaérobies

La porte d'entrée est :

■ cutanée (gangrène) : *Clostridium perfringens* ;

■ digestive (péritonite, cholécystite, abcès hépatique) : BGN (*Bacteroides sp.*, *Prevotella sp.*) ou BGP (*Clostridium sp.*, *Peptostreptococus sp.*) ;

■ gynécologique : BGN (*Bacteroides sp.*, *Prevotella sp.*) ou BGP (*Clostridium perfringens*, *Peptostreptococus sp.*) ;

■ pleuropulmonaire (abcès pulmonaire, pleurésie purulente) : BGN *(Prevotella, Fusobacterium)* ;

■ cérébrale (abcès cérébraux, empyèmes sous duraux) : coques *(Peptostreptococcus, Veillonella)* et bacilles *(Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium)* ;

■ dentaire, cervico-faciale, périnéale (gangrène de Fournier).

E. Candidémie

■ La porte d'entrée est :

Copyrighted material

– digestive : les levures du genre *Candida* appartiennent à la flore digestive commensale. Les modifications de cette flore, lors d'une antibiothérapie par exemple, favorisent la croissance des *Candida*, qui colonisent alors les surfaces muqueuses. À partir d'une masse critique d'inoculum, si l'intégrité des surfaces muqueuses est compromise, une dissémination hématogène est possible. L'immunosuppression favorise la greffe du *Candida* à distance ;

– vasculaire : infection nosocomiale sur cathéter (80 % des candidémies).

■ Candidémie et candidose systémique ont la même signification : la candidémie est la situation où du *Candida* a été identifié par au moins une hémoculture, la candidose systémique est la situation où du *Candida* a été identifié dans plusieurs sites non contigus, impliquant une dissémination hématogène, même si les hémocultures sont négatives, ce qui est le cas dans 50 % des cas.

■ Leur mortalité est élevée, de l'ordre de 40 %.

■ Les facteurs prédisposants de candidose systémique sont ceux qui :

– favorisent la colonisation (antibiothérapie à large spectre, nutrition parentérale, immunosuppression) ;

– altèrent la barrière muqueuse (perforation digestive, chirurgie abdominale, chirurgie urologique, ischémie digestive, dispositifs vasculaires, brûlures) ;

– altèrent l'immunité : neutropénie, chimiothérapie, âge avancé, diabète.

F. Cryptococcose

■ Il s'agit d'une infection grave, due à une levure capsulée *(Cryptococcus neoformans)*, survenant le plus souvent sur un terrain de déficit immunitaire (VIH, hémopathies lymphoïdes, transplantation d'organe).

■ La porte d'entrée est pulmonaire : des particules infectantes inhalées se maintiennent dans les macrophages alvéolaires jusqu'à l'apparition d'un déficit immunitaire qui leur permettrait de sortir de cette phase dormante, de se multiplier et de disséminer dans tous les organes après une fongémie.

■ L'infection se présente en général sous la forme d'une méningo-encéphalite, à l'occasion de laquelle sont souvent découvertes d'autres localisations : pulmonaire et cutanée, notamment.

■ L'examen direct des prélèvements est primordial et permet un diagnostic rapide. Le diagnostic de cryptococcose méningée est ainsi fait par examen direct à l'encre de Chine du LCR, la culture sur milieu de Sabouraud, la détection de l'antigène capsulaire dans le sang ou le LCR.

III. DIAGNOSTIC

A. Clinique

Le diagnostic repose sur la positivité des hémocultures, mais il est suspecté si :

■ le tableau clinique est brutal ;

Copyrighted material

- il existe un SIRS *(tableau 104-1)* ;
- il existe un point d'appel infectieux :
 - urinaire ;
 - cutané ;
 - pulmonaire ;
 - biliaire ;
 - péritonéal ;
 - endovasculaire (voie veineuse centrale ou périphérique, sondes de pacemaker, prothèse valvulaire) ITEMS 105, 80 ;
 - ostéoarticulaire ;
 - neuroméningé ;
- il existe des signes de choc : on distingue classiquement le sepsis grave et le choc septique *(tableau 104-1)* ITEMS 200, 203.

Tableau 104-1. Définition du SIRS, du sepsis, du sepsis sévère et du choc septique

Réponse inflammatoire systémique (au moins deux des critères suivants)	• Température > 38,3 °C ou < 36 °C • Pouls > 90 bpm • Fréquence respiratoire > 20 cpm • Glycémie > 7,7 mmol/L • Leucocytes : – > 12 000/mm^3 – ou < 4 000/mm^3 – ou > 10 % de formes immatures • Altération des fonctions supérieures • Temps de recoloration capillaire > 2 s • Lactatémie > 2 mmol/L
Sepsis	Réponse inflammatoire systémique + infection présumée ou identifiée
Sepsis sévère	• Sepsis + lactates > 4 mmol/L • Ou hypotension artérielle avant remplissage • Ou dysfonction d'organe (une seule suffit) : – respiratoire : PaO_2/FiO_2 < 300 – rénale : créatininémie > 176 µmol/L – coagulation : INR > 1,5 – hépatique : INR > 4, bilirubine > 78 µmol/L – thrombocytopénie < 105/mm^3 – fonctions supérieures : score de Glasgow < 13
Choc septique	Sepsis grave + hypotension artérielle malgré le remplissage vasculaire

B. Biologie

1. Hémocultures

- Elles font le diagnostic de septicémie, permettent l'identification du germe et l'adaptation du traitement antibiotique.
- Elles sont réalisées par paires (un flacon avec milieu de culture pour germes aérobies, un flacon pour germes anaérobies) :

Copyrighted material

– la concentration des bactéries dans le sang étant souvent basse (< 1 UFC/mL chez l'adulte), il est important de bien remplir le flacon (10 mL de sang au minimum) ;

– la réalisation de plus de 2 paires d'hémocultures au cours des 24 premières heures augmente peu la sensibilité mais augmente le risque de détecter des contaminants (micro-organismes commensaux : staphylocoques coagulase négative, corynébactérie, *Propionibacterium acnes*).

■ Elles sont prélevées :

– à 30 minutes d'intervalle. S'il est classique de prélever les hémocultures à l'acmé des pics fébriles ou lors des frissons, la bactériémie précède en réalité d'environ 1 heure le pic fébrile ;

– dans des conditions d'asepsie stricte ;

– avant toute antibiothérapie si possible.

■ Cependant, elles ne mettent en évidence un agent infectieux que dans 5 à 10 % des cas. Le renouvellement des hémocultures au-delà de la 24e heure est généralement peu rentable. Néanmoins, la négativation des hémocultures fait le diagnostic de guérison.

■ La septicémie est affirmée si 2 hémocultures sont positives au même germe. Une hémoculture suffit pour les pathogènes exclusifs qui ne peuvent coloniser l'organisme sans provoquer d'infection (salmonelle, par exemple). 0

■ En présence d'un cathéter veineux central, la responsabilité d'une infection du cathéter peut être établie par la réalisation simultanée d'hémocultures sur le cathéter et en périphérie après mise en évidence d'un délai différentiel de positivation d'au moins 2 heures en faveur de l'hémoculture prélevée sur cathéter.

2. Autres prélèvements bactériologiques

■ Examen cytobactériologique des urines : il est réalisé classiquement après la mise en évidence de leucocytes et de nitrites sur la bandelette réactive urinaire. Il faut savoir cependant qu'un certain nombre de germes n'ont pas d'activité réductrice des nitrates (entérocoque, staphylocoque, *Pseudomonas, Acinetobacter*, levures).

■ Prélèvement cutané (bulles, phlyctène), pulmonaire (lavage brochoalvéolaire, prélèvement distal protégé), coproculture, ponction lombaire, articulaire, ponction d'un abcès parenchymateux, ponction pleurale, ponction d'ascite : ils sont réalisés en fonction des investigations cliniques et paracliniques.

■ Antigène urinaire de *Streptococcus pneumoniae* et de *Legionella pneumophila* (sérotype 1) : chez les patients présentant une pneumonie et des signes de gravité clinique.

Copyrighted material

3. Bilan biologique standard

■ Numération-formule sanguine : polynucléose à polynucléaires neutrophiles ou neutropénie, thrombocytose liée à l'inflammation ou thrombopénie dans le cadre d'une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) associée.

DÉFINITION DE LA CIVD BIOLOGIQUE

■ D-dimères > 500 µg/L et présence :
– d'un critère majeur : plaquettes < 50 g/L, TP < 50 % ;
– ou de deux critères mineurs : 50 g/L < plaquettes < 100 g/L et 50 % < TP < 65 %, fibrinogène < 1 g/L.

■ Ionogramme sanguin et urinaire, glycémie, protidémie, urée, créatinine.

■ Bilan hépatique complet.

■ CPK et troponine Ic.

■ Gaz du sang et lactatémie.

■ Bilan d'hémostase : recherche d'une CIVD.

■ CRP : l'élévation de la CRP est plus précoce et plus spécifique que l'accélération de la VS.

■ En contexte fébrile, la neutropénie est le meilleur critère prédictif de bactériémie.

C. Autres examens complémentaires

■ Radiographie thoracique.

■ Électrocardiogramme.

■ Recherche d'éventuelles localisations secondaires :
– TDM cérébrale injectée ou IRM cérébrale en cas de signe de localisation (abcès) ;
– IRM médullaire en cas de rachialgie d'horaire inflammatoire (spondylodiscite) ;
– TDM abdominale (abcès hépatique ou splénique) ;
– TDM thoracique (abcès pulmonaire) ;
– échographie cardiaque par voie transœsophagienne dans les septicémies à cocci Gram négatif ou à levure (endocardite), ou lorsqu'un matériel endovasculaire est présent. ITEM 80

IV. PRISE EN CHARGE

A. Identifier une situation d'urgence

Les situations d'urgence sont essentiellement liées au terrain ou à l'existence de signes de gravité clinique :

Copyrighted material

- selon le terrain :
 - neutropénique, immunodéprimé, asplénique ; 0
 - existence de comorbidités (diabète, cirrhose) ;
- selon le tableau clinique :
 - présence d'un choc septique :
 - hypotension artérielle : pression artérielle systolique < 90 mmHg ou ≤ 30 % de la pression artérielle de référence ;
 - signes témoignant d'une hypoperfusion tissulaire : oligurie (diurèse < 0,5 mL/kg/h), marbrures cutanées, froideur des téguments, cyanose des extrémités, allongement du temps de recoloration cutanée, troubles de conscience ;
 - signes témoignant des phénomènes d'adaptation (tachycardie, polypnée, sueurs) ;
 - signes témoignant du retentissement viscéral : rénal (insuffisance rénale fonctionnelle puis nécrose tubulaire aiguë), hépatique (foie hypoxique), cardiaque (altération de la contractilité et ischémie myocardique), pulmonaire (syndrome de détresse respiratoire aigu), digestif (ischémie mésentérique), cérébral (troubles neurologiques), hématologique (CIVD) ➤ ITEM 200 ; 0
 - présence d'un purpura aigu fébrile : doit faire redouter une méningococcémie et justifie une antibiothérapie immédiate par une céphalosporine de 3e génération, avant toute investigation bactériologique : céfotaxime *(Claforan)*, 1 g IVL chez l'adulte, 50 mg/kg chez le nourrisson et l'enfant, ou ceftriaxone *(Rocéphine)*, 1 à 2 g IVL ou IM, 50 à 100 mg/kg chez le nourrisson et l'enfant ; 0
 - présence d'un syndrome méningé aigu fébrile justifiant une ponction lombaire immédiate et la mise en route d'une antibiothérapie avant les résultats de l'examen du LCR lorsque le liquide prélevé est purulent ; 0
 - présence d'une infection grave des parties molles nécessitant une antibiothérapie immédiate et un avis chirurgical urgent ; 0
 - toujours penser à la possibilité d'un accès palustre. 0

CONSENSUS

Prise en charge initiale des états septiques graves de l'adulte et de l'enfant
Expertise collective 2006

Un malade adulte suspect d'infection et présentant au moins deux des symptômes suivants doit être considéré à risque d'évolution rapide vers un sepsis grave :
- température > 38,2 °C ;
- tachypnée ≥ 30/min ;
- tachycardie 120/min ;
- pression artérielle systolique < 110mmHg.

Copyrighted material

Ces risques sont aggravés si l'infection est d'origine :
- pulmonaire ;
- intra-abdominale ;
- lorsqu'il existe des signes directs d'infection grave (purpura, lésions nécrotico-bulleuses de fasciite nécrosante, etc.)

L'association aux signes précédents, ou l'apparition secondaire de :
- thrombopénie < 150 000
- et/ou natrémie > 145 mmol/L
- et/ou bilirubine > 30 µmol/L

renforce l'estimation du risque d'aggravation.
En pratique, l'association d'au moins trois des dix signes précédents indique un risque relativement élevé d'aggravation dans les heures ou les jours suivants (15-20 %). La présence de quatre signes fait passer ce risque à 20-30 %, et de cinq signes ou plus à > 30 %.
La notion de risque élevé de sepsis grave doit conduire à :
- demander un avis spécialisé de réanimation si le malade est hospitalisé en dehors d'une structure d'urgence ou de soins intensifs/réanimation ;
- obtenir sans délai un dosage de lactatémie artérielle ;
- prélever sans délai des hémocultures (2 rapidement espacées) et des prélèvements locaux accessibles en fonction du (des) site(s) infectieux suspecté(s) ;
- compléter et répéter le bilan biologique à la recherche de signes biologiques évolutifs témoins de l'apparition de dysfonction d'organe (TP, plaquettes, créatinine, bilirubine) ;
- demander les examens complémentaires d'imagerie utiles à la recherche de la source du foyer infectieux ;
- instaurer une surveillance rapprochée à la recherche de l'apparition de signes de dysfonction d'organe (pression artérielle, diurèse horaire) ;
- en fonction des premiers résultats et de l'évolution des trois à six premières heures, décider de l'orientation et de la suite de la prise en charge en concertation avec le réanimateur.

B. Débuter rapidement l'antibiothérapie ITEM 173

L'antibiothérapie est dans un premier temps probabiliste, fondée sur :
- le foyer infectieux supposé ;
- le caractère communautaire ou nosocomial de l'infection ;
- l'épidémiologie de la résistance bactérienne ;
- le terrain.

Elle doit être :
- débutée immédiatement après les prélèvements bactériologiques ;
- administrée d'abord par voie veineuse ;
- avec association synergique et bactéricide en première intention.

1. En l'absence d'orientation, en présence d'un sepsis sévère ou d'un choc septique

- En contexte communautaire, l'association d'une céphalosporine de 3^{e} génération, d'un aminoside et de métronidazole est recommandée. Ex : ceftriaxone (*Rocéphine*) 2 g/J en IV + metronidazole (*Flagyl*) 500g × 3/j en IV + gentamycine (*Gentalline*) 3 à 5 mg/kg/j.

Copyrighted material

■ En contexte nosocomial, l'association d'une bêtalactamine antipyocyanique (imipénème ou ceftazidine + métronidazole ou pipéracilline-tazobactam) et d'un aminoside est recommandée. Ex : piperacilline-tazobactam (*Tazocilline*) 4g × 4/j IV + amikacine (*Amiklin*) 15 à 20 mg/kg/j.

■ Dans ces deux situations, l'utilisation systématique de métronidazole est cependant discutable. Elle se justifie quand la porte d'entrée est digestive ou gynécologique.

■ L'aminoside est le plus souvent interrompu après 48 heures de traitement.

■ Si une origine staphylococcique est suspectée (corps étranger vasculaire notamment), un traitement par glycopeptide (vancomycine) est associé. Ex : vancomycine (*Vancocine*) 1 g IV en dose de charge puis 30 mg/kg/j IVSE.

■ L'antibiothérapie probabiliste des états septiques graves a fait l'objet d'une conférence d'experts récente.

2. Mise en évidence de la septicémie : réévaluation du traitement antibiotique

■ CGP type staphylocoque : association glycopeptide-aminoside, puis amoxicilline-acide clavulanique ou oxacilline s'il s'agit d'un staphylocoque sensible à la méticilline.

■ CGP type streptocoque : amoxicilline (ou céphalosporine de 3^{e} génération, sauf si entérocoque) associée à un aminoside.

■ Lorsque le CGP n'est pas encore identifié, l'association glycopeptide-aminoside efficace sur les staphylocoques et les streptocoques est utilisée. En contexte de pneumopathie cependant, la probabilité d'un pneumocoque justifie plutôt une antibiothérapie par amoxicilline ou céphalosporine de 3^{e} génération.

■ BGN : association céphalosporine de 3^{e} génération-fluoroquinolone ou céphalosporine de 3^{e} génération-aminoside, en contexte nosocomial : pipéracilline-tazobactam-aminoside ou imipénème-aminoside.

■ *Candida* :

– toute candidémie, même isolée, doit être traitée ;

– tout cathéter vasculaire présent lors du diagnostic doit être retiré ;

– la durée du traitement est de 15 jours après la dernière hémoculture positive et la disparition des symptômes. Le traitement est poursuivi si la neutropénie persiste, pour couvrir une semaine après la correction de celle-ci. Le traitement est également poursuivi plusieurs semaines en cas de localisations secondaires.

■ Cryptocoque : le traitement repose sur l'association amphotéricine B et 5-fluorocytosine.

Copyrighted material

CONSENSUS

Prise en charge des candidoses et aspergilloses invasives de l'adulte SFAR, SRLF, SPILF, 2004

■ Les antifongiques disponibles et leurs effets indésirables respectifs sont résumés ici :

Antifongique	Voie d'administration	Principaux effets indésirables
Amphotéricine B	IV	Hypokaliémie, hypomagnésémie, insuffisance rénale, fièvre, frissons lors de l'injection, cytopénie
Amphotéricine B liposomale *(Ambisone)*	IV	Mêmes complications que l'amphotéricine B, mais fréquence moindre ; tolérance supérieure pour l'amphotéricine B liposomale
Amphotéricine B *lipid complex (Abelcet)*		
Fluconazole *(Triflucan)*	IV/PO	Troubles digestifs, cytolyse hépatique, cholestase, réactions allergiques et cutanées
Voriconazole *(Vfend)*		Troubles visuels réversibles
Caspofungine *(Cancidas)*	IV	Peu fréquents et bénins

■ L'augmentation de l'incidence des *Candida* de sensibilité diminuée ou résistants aux azolés, une neutropénie, une insuffisance rénale, la coprescription de médicaments néphrotoxiques, la prescription antérieure de traitements azolés interviennent dans le choix de l'antibiothérapie initiale *(fig. 104-1)*.




Fig. 104–1. Arbre décisionnel

■ Dès que la levure responsable est identifiée, le traitement doit être adapté : les espèces sensibles au fluconazole peuvent être traitées par fluconazole, les espèces résistantes au fluconazole peuvent être traitées par amphotéricine B, sauf en cas d'insuffisance rénale et de prise d'autres traitements néphrotoxiques : le choix se fait alors entre l'amphotéricine B liposomale et la caspofungine.

Copyrighted material

CONSENSUS

Antibiothérapie probabiliste des états septiques graves
SFAR, SRLF, SPILF, 2004

Méningites communautaires	Si *Purpura fulminans* : C3G IV immédiatement
	Si signes de localisation : C3G + vancomycine puis TDM cérébrale et PL
	Si examen direct du LCR positif : – CGP (pneumocoque) : C3G + vancomycine (40 à 60 mg/kg/j) – CGN (méningocoque) : C3G ou amoxicilline (200 mg/kg/j) – BGP *(Listeria)* : amoxicilline (200 mg/kg/j) + gentamicine (3 à 5 mg/kg/j) – BGN *(H. influenzae)* : C3G (céfotaxime : 200 à 300 mg/kg/j)
	Si examen direct du LCR négatif : – LCR trouble, glycorachie basse : C3G + vancomycine – LCR clair, lymphocytaire, glycorachie basse : amoxicilline + gentamicine + anti-BK – LCR lymphocytaire, glycorachie normale : aciclovir
Méningites nosocomiales et abcès cérébraux postopératoires	Méningite postopératoire Staphylocoques (dont *S. epidermidis*) et BGN (dont entérobactéries et *P. aeruginosa*) : céfotaxime + fosfomycine en première intention
	Méningite post-traumatique Pneumocoque : amoxicilline
Pneumopathies communautaires	Amoxicilline-acide clavulanique (2 g/8 h) ou céfotaxime (2 g/8 h) ou ceftriaxone (2 g/j) + érythromycine (1 g/8 h) ou ofloxacine (200 mg x 2/j) ou lévofloxacine (500 mg x 2/j)
	Si allergie prouvée aux bêtalactamines : glycopeptide + ofloxacine
	Si risque de *P. aeruginosa* (antibiothérapie fréquente, DDB, corticothérapie au long cours) : bêtalactamine anti-*Pseudomonas* + ciprofloxacine (400 mg/8 h)
Pneumopathies nosocomiales	Pneumopathie précoce (< 7 jours) acquise sous ventilation mécanique : bêtalactamine sans activité anti-*Pseudomonas* en monothérapie (céfotaxime ou ceftriaxone ou amoxicilline-acide clavulanique)
	Pneumopathie tardive acquise sous ventilation mécanique : bêtalactamine à activité anti-*P. aeruginosa* associée à un aminoside ou à la ciprofloxacine. La vancomycine ne sera associée que s'il existe des facteurs de risque de SARM
Infections urinaires communautaires et nosocomiales	Les entérobactéries *(E. coli)* sont les bactéries le plus souvent isolées. Les CGP sont retrouvés après 50 ans. Le caractère nosocomial et/ou les traitements antibiotiques antérieurs augmentent le risque de survenue d'une bactérie résistante, notamment : *Pseudomonas sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Citrobacter sp., CGP* et *Candida sp.*
	Infection urinaire communautaire : – fluoroquinolones ou C3G (céfotaxime ou ceftriaxone) – bithérapie dans les formes graves avec hypotension : C3G + fluoroquinolones ou aminoside (nétilmicine ou gentamicine), fluoroquinolones + aminoside en cas d'allergie aux bêtalactamines – pendant la grossesse, les fluoroquinolones sont contre-indiquées : amoxicilline-acide clavulanique + aminoside (surtout si entérocoque)
	Infection urinaire nosocomiale : – discussion au cas par cas en fonction de la colonisation du patient, de l'écologie du service et de l'examen direct de l'ECBU – chez l'homme, des antibiotiques à forte diffusion prostatique doivent être proposés, en cas de prostatite : fluoroquinolones ou cotrimoxazole

Infections intra-abdominales communautaires et nosocomiales	Péritonites communautaires : – amoxicilline-acide clavulanique (2 g/8 h) + aminoside (gentamicine ou nétilmicine : 5 mg/kg/j) – ticarcilline-acide clavulanique (5 g x 3/j) + aminoside – céfotaxime ou ceftriaxone + imidazolé – le rôle pathogène de l'entérocoque est reconnu, son traitement n'est pas consensuel
	Péritonites nosocomiales et postopératoires : – pipéracilline-tazobactam (4 g x 4/j) + amikacine (20 mg/kg/j) – imipénème (1 g x 3/j) + amikacine – ± vancomycine si SARM ou entérocoque résistant à l'amoxicilline – ± fluconazole (800 mg/j)
	Péritonites primaires du cirrhotique : – amoxicilline-acide clavulanique (1,2 g/6 h) – ou céfotaxime (2 g/8 h) – ou céftriaxone (2 g/j)
	Pancréatite : – pas d'indication à l'antibioprophylaxie – antibiothérapie débutée après ponctions sous TDM ou prélèvements peropératoires – imipénème ou fluoroquinolones ou association céfotaxime/métronidazole
Infections intra-abdominales communautaires et nosocomiales	– en cas d'antibiothérapie préalable, d'hospitalisation prolongée, de manœuvres endoscopiques ou de nécrosectomie antérieure, le choix se porte sur l'association imipénème, vancomycine et fluconazole
	Angiocholites aiguës : – communautaires : amoxicilline-acide clavulanique + gentamicine ou nétilmicine, ticarcilline-acide clavulanique, pipéracilline + métronidazole, céfoxitime, céfotaxime ou ceftriaxone + métronidazole ; si signes de gravité, association de gentamicine ou nétilmicine – nosocomiales ou post-CPRE : facteur de risque d'infection à entérocoque (pipéracilline-tazobactam + amikacine, ou imipénème + amikacine ou ceftazidime + métronidazole + amikacine)
Infections cutanées et des tissus mous, gangrène et cellulite	Les dermohypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes sont des urgences médico-chirurgicales. Dans 40 à 80 % des cas, une flore mixte est retrouvée : anaérobies, entérobactéries, streptocoques, entérocoques et *Staphylococcus aureus*. Le traitement antibiotique n'est qu'un adjuvant du traitement chirurgical (excisions larges). L'oxygénothérapie hyperbare n'a pas montré son efficacité
	Atteinte des membres et de la région cervicofaciale : amoxicilline-acide clavulanique (2 g x 3/j) + gentamicine ou nétilmicine (5 mg/kg/j)
	Gangrène périnéale communautaire : céfotaxime-ceftriaxone + métronidazole ou amoxicilline-acide clavulanique, associés avec de la gentamicine ou de la nétilmicine
	Gangrène postopératoire : pipéracilline-tazobactam (16 g/j) ou imipénème (1 g x 3/j) associé à de l'amikacine (20 mg/kg/j)
Endocardites	Valve native : – suspicion de staphylocoque communautaire : oxacilline (2 g/4 h) + gentamicine (3 mg/kg/j) – sans élément d'orientation : amoxicilline-acide clavulanique (2 g/4 h) + gentamicine (3 mg/kg/j) – allergie vraie aux pénicillines : vancomycine (30 mg/kg/j) + gentamicine (3 mg/kg/j) ou nétilmicine (6 mg/kg/j)

	Valve prothétique : – vancomycine (30 mg/kg/j) + rifampicine (600 mg/12 h) + gentamicine (3 mg/kg/j) ou nétilmicine (6 mg/kg/j) – échec ou contexte particulier : vancomycine (15 mg/kg/12 h) + ceftazidime (2 g/8 h) + gentamicine (3 mg/kg/j) ou nétilmicine (6 mg/kg/j)
Infections sur cathéter	Ablation du cathéter, culture quantitative du cathéter, réalisation d'hémocultures après ablation
	Antibiothérapie probabiliste si état septique grave et/ou immunodépression, présence d'une prothèse vasculaire ou articulaire : – vancomycine (30 mg/kg/j) + céfépime (2 g x 2) + gentamicine – vancomycine (30 mg/kg·j) + ceftazidime + amikacine – vancomycine + imipénème + amikacine – si facteurs de risque d'infection à levures : amphotéricine B

C. Poser l'indication d'un drainage ou d'une intervention chirurgicale

- Drainage urinaire en cas de rétention d'urines purulentes sur obstacle : montée de sonde urétérale par voie endoscopique ou néphrostomie percutanée en cas d'obstacle pyélo-urétéral, cathéter sus-pubien en cas d'obstacle sous-vésical.
- Sphinctérotomie endoscopique ou drainage chirurgical en cas d'angiocholite.
- Drainage pleural en cas de pleurésie purulente.
- Drainage d'un empyème ou d'un abcès parenchymateux hépatique ou pulmonaire.
- Laparotomie avec toilette péritonéale en cas de péritonite.
- Parage chirurgical d'une cellulite nécrosante ou gangréneuse.
- Lavage articulaire chirurgical d'une arthrite.

D. Évaluer l'efficacité de l'antibiothérapie ITEM 173

Cette évaluation porte essentiellement sur la courbe thermique, la persistance d'une fièvre faisant suspecter :

- une antibiothérapie inadaptée (dose insuffisante, diffusion insuffisante, germe résistant) ;
- une allergie aux antibiotiques ;
- un foyer profond non drainé, un matériel étranger persistant ;
- une infection nosocomiale ;
- une maladie thromboembolique (thrombophlébite des membres inférieurs).

En dehors de la défervescence, la surveillance de l'antibiothérapie porte sur l'amélioration clinique, la régression du syndrome inflammatoire et notamment de la leucocytose et de la CRP, et la stérilisation des prélèvements bactériologiques, en l'occurrence ici des hémocultures.

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Septicémie

- Le diagnostic de bactériémie repose sur la positivité de 2 hémocultures au même germe.
- Il est suspecté devant :
 - un tableau clinique brutal ;
 - un SIRS ; présent si 2 des signes suivants : température > 38,3 °C ou < 36 °C, FC > 90 bpm, FR > 20 bpm ou hyperventilation alvéolaire ($PaCO_2$ < 32 mmHg), glycémie > 7,7 mmol/L, leucocytes > 12 000/mm^3 ou < 4 000/mm^3, altération des fonctions supérieures, temps de recoloration capillaire > 2 s, lactatémie > 2 mmol/L ;
 - un point d'appel infectieux ;
 - un sepsis sévère : sepsis et hypotension répondant au remplissage vasculaire ;
 - un choc septique : sepsis sévère et hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire adéquat et/ou la nécessité d'utiliser des drogues vasoactives.
- Ces différents tableaux font pratiquer des hémocultures 0 :
 - 2 paires (un flacon pour germes aérobies, un flacon pour anaérobies) ;
 - 10 mL de sang au minimum par flacon ;
 - prélevées à 30 minutes d'intervalle ; le plus proche possible du pic fébrile ;
 - dans des conditions d'asepsie stricte ;
 - avant toute antibiothérapie si possible.
- Les germes retrouvés sont :
 - staphylocoques : prothèse vasculaire, infection cutanée, ORL ou gynécologique ;
 - streptocoques : infection cutanée ou digestive (entérocoque : *S. bovis*), gynécologique ou urinaire (entérocoque et streptocoque du groupe B), ORL, dentaire et pulmonaire *(S. pneumoniae)* ;
 - BGN : infection communautaire urinaire ou digestive (entérobactéries), nosocomiale urinaire, pulmonaire, du site opératoire ou d'un cathéter vasculaire (entérobactéries et BGN non entérobactéries) ;
 - bacilles anaérobies : infection cutanée, digestive, gynécologique, pleuropulmonaire, cérébrale, mais aussi dentaire, cervicofaciale, périnéale (gangrène de Fournier).
- Il faut dans un premier temps identifier une situation d'urgence :
 - selon le terrain : immunosuppression, comorbidités ;
 - selon le tableau clinique : choc septique, purpura fébrile (antibiothérapie immédiate par une C3G) 0, syndrome méningé fébrile (PL immédiate et antibiothérapie avant les résultats du LCR si le liquide est purulent) 0, infection des parties molles (antibiothérapie et avis chirurgical urgents) 0 ; toujours penser à la possibilité d'un accès palustre 0.
- On débutera l'antibiothérapie probabiliste :
 - immédiatement après les prélèvements bactériologiques ;
 - d'abord par voie veineuse ;
 - avec association synergique et bactéricide en première intention.
- En l'absence d'orientation, en présence d'un sepsis sévère ou d'un choc septique :
 - en contexte communautaire : C3G + aminoside + métronidazole ;
 - en contexte nosocomial : imipénème ou pipéracilline-tazobactam ou ceftazidine + métronidazole + aminoside ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– l'aminoside est le plus souvent interrompu après 48 heures de traitement ;
– si le staphylocoque est suspecté (corps étranger vasculaire), un traitement par glycopeptide (vancomycine) est associé.

■ La mise en évidence de la septicémie permettra de réévaluer le traitement antibiotique :
– CGP type staphylocoque : association glycopeptide-aminoside, puis amoxicilline-acide clavulanique ou oxacilline si staphylocoque sensible à la méthicilline ;
– CGP type streptocoque : amoxicilline (ou C3G) associée à un aminoside ;
– lorsque le CGP n'est pas encore identifié, l'association glycopeptide-aminoside, efficace sur les staphylocoques et les streptocoques, est utilisée. En contexte de pneumopathie : amoxicilline ou C3G (pneumocoques) ;
– BGN : association C3G-fluoroquinolone ou C3G-aminoside ; en contexte nosocomial : pipéracilline-tazobactam-aminoside ou imipénème-aminoside.

■ On recherchera une indication à un drainage ou à une intervention chirurgicale.

■ On évaluera l'efficacité de l'antibiothérapie, la persistance d'une fièvre faisant suspecter :
– une antibiothérapie inadaptée (dose insuffisante, diffusion insuffisante, germe résistant) ;
– une allergie aux antibiotiques ;
– un foyer profond non drainé, un matériel étranger persistant ;
– une infection nosocomiale ;
– une thrombophlébite des membres inférieurs.

Copyrighted material

Copyrighted material

ITEM 185

Arrêt cardio-circulatoire

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer un arrêt cardio-circulatoire.
- Prise en charge immédiate.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 132 Angine de poitrine et infarctus myocardique.

ITEM 200 État de choc.

CONSENSUS



- Prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire – Recommandations formalisées d'experts – SRLF, SFAR, octobre 2006. www.srlf.org

POUR COMPRENDRE...

- La mort subite (MS) représente 700 000 décès par an en Europe. Lorsqu'une réanimation est entreprise, la récupération d'une activité circulatoire est constatée dans 30 % des cas, mais la survie à la 24^{e} heure ne dépasse pas 15 %. Enfin, seuls 3 à 5 % des patients sortiront de l'hôpital sans séquelles neurologiques.
- L'objectif de la réanimation est double : récupération d'une activité circulatoire, et limitation des conséquences neurologiques, la privation d'oxygène entraînant des lésions neurologiques irréversibles au bout de quelques minutes.
- Toute minute supplémentaire avant la mise en route d'une réanimation cardiopulmonaire (RCP) diminue la survie de 10 %.
- La cause la plus fréquente d'arrêt cardiorespiratoire est la fibrillation ventriculaire (FV) (40 %).
- En cas de FV, une défibrillation immédiate permet la survie dans 90 % des cas. En l'absence de défibrillation, la fibrillation se dégrade en asystolie.
- Le diagnostic d'arrêt cardio-circulatoire étant rapidement fait, l'amélioration du pronostic vital et neurologique passe par la connaissance des 4 maillons de la chaîne de survie, qui sont :
 - l'alerte ;
 - la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base, première phase stéréotypée du traitement, réalisée souvent par les premiers secours ;

Copyrighted material

– la défibrillation lorsqu'elle est indiquée ;

– la RCP spécialisée.

■ À l'arrivée en réanimation se posent les problèmes de la prise en charge d'un syndrome de défaillance multiviscérale faisant suite à l'arrêt cardiaque et du pronostic neurologique.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

Trois types d'anomalies électriques sont retrouvés : la fibrillation ventriculaire, l'asystolie et la dissociation électromécanique.

A. Fibrillation ventriculaire (FV)

■ C'est l'anomalie la plus fréquente et de meilleur pronostic.

■ Elle est constituée d'une succession d'ondes de morphologie variable, de fréquence extrême, et dont chacune n'est séparée de l'autre par aucune phase isoélectrique. L'amplitude des ondes s'amortit avec le temps, donnant au départ un aspect de FV à grandes mailles puis à petites mailles. La FV n'est jamais spontanément réversible *(voir fig 185.1)*.

■ Au cours de la FV à grandes mailles (dite tonique) peut persister une activité circulatoire et les chances que la défibrillation soit efficace sont meilleures.

■ Au stade de FV à petites mailles (dite atonique) les chances d'efficacité de la défibrillation s'amenuisent ; progressivement, l'aspect de FV laisse place à un aspect d'asystolie.



Fig. 185-1. Fibrillation ventriculaire.
Source : *Les Troubles du rythme cardiaque dans la pratique médicale*, L. De Roy, D. El Allaf, M. Renard, Masson, 2006, 4e édition, 224 p.

B. Asystolie

■ L'électrocardiogramme est isoélectrique.

■ C'est la forme de plus mauvais pronostic.

C. Dissociation électromécanique (ou activité électrique sans pouls)

- Il s'agit de l'anomalie la plus rare.
- Elle est caractérisée par la persistance de complexes QRS (activité électrique) sans aucun battement cardiaque et donc aucun pouls perceptible (activité mécanique).
- Progressivement les complexes QRS s'élargissent et sont entrecoupée de pauses de plus en plus longues.
- Son pronostic est intermédiaire.
- Elle est le plus souvent secondaire à une hypovolémie, une embolie pulmonaire, une tamponnade ou un pneumothorax compressif.

II. CAUSES

A. Causes cardiaques

- Infarctus du myocarde. ➤ ITEM 132
- Troubles du rythme (FV), souvent dans un contexte d'ischémie myocardique.
- Troubles de la conduction.
- Tamponnade.

B. Causes non cardiaques

- Embolie pulmonaire.
- Pneumothorax compressif.
- Hypoxie.
- Hypovolémie.
- Métaboliques : hypokaliémie, hyperkaliémie, acidose métabolique.
- Hypothermie.
- Médicamenteuses : intoxications par bêtabloquants, digitaliques, carbamates, quinidiniques.

III. DIAGNOSTIC

Le diagnostic doit être fait en moins de 30 secondes et repose sur la présence de 3 signes :

- l'absence de réactivité ;
- l'absence de respiration spontanée (ou la présence d'une respiration agonique) ;
- l'absence de pouls fémoral ou carotidien pendant 5 à 15 secondes.

L'état de mort apparente (absence de réactivité et absence de respiration spontanée) suffit au diagnostic d'arrêt cardiorespiratoire et la prise du pouls n'est pas systématiquement recommandée aux secouristes non professionnels car elle peut être difficile et retarder la prise en charge.

La mydriase bilatérale aréactive est un signe d'apparition tardive lié à la souffrance neurologique.

Copyrighted material

IV. PRISE EN CHARGE *(voir fig. 185-2, page 30)*

A. Donner l'alerte

Même seul, un témoin doit d'abord donner l'alerte avant d'entreprendre la RCP.

B. Réanimation cardiopulmonaire de base

La décision de commencer la RCP de base est prise devant une victime qui ne répond pas et qui ne respire pas normalement.

Réalisée chez un patient en décubitus dorsal, sur un plan dur, elle comprend classiquement 4 étapes : A (*Airway* : libération des voies aériennes), B (*Breathing* : ventilation), C (*Circulation* : massage cardiaque externe), D (*Défibrillation*).

1. Libération des voies aériennes

Elle est obtenue par une légère hyperextension de la tête et un soulèvement du menton avec 2 doigts, afin de décoller la base de la langue de la paroi postérieure du pharynx. En cas de doute sur un traumatisme du rachis cervical, on ne réalise qu'une subluxation prudente du maxillaire inférieur : extraction des corps étrangers intrabuccaux.

2. Ventilation

Elle est effectuée par la méthode du bouche-à-bouche, ou du bouche-à-nez, ou à l'aide d'un masque raccordé à un ballon pour insufflation manuelle. Chaque insufflation est réalisée lentement (en 1 seconde) et doit être suivie d'une expiration passive complète (de 4 secondes environ). Ainsi, on administre chez l'adulte environ 500 mL à une fréquence de 8 à 10 cycles par minute. Ces 2 insufflations sont suivies de 30 compressions thoraciques.

3. Massage cardiaque externe

Les mains étant posées au centre du thorax, une dépression d'environ 5 cm est exercée, d'une durée égale à 50 % du cycle compression-relaxation passive et avec une fréquence de 100 par minute. Les 30 compressions sont suivies de 2 nouvelles insufflations, et ainsi de suite. Une fois intubé, le massage cardiaque est continu, au rythme de 100 compressions par minute.

Le pouls fémoral ou carotidien est contrôlé après 5 cycles, puis toutes les 2 minutes environ. L'interruption de ces manœuvres doit être limitée au maximum et réservée aux épisodes de défibrillation, au contrôle du pouls (10 secondes au maximum), à l'intubation (30 secondes au maximum) limitée.

4. Défibrillation

En cas de FV, la survie est directement liée à la précocité de la défibrillation. Une FV à grandes mailles prolongée se dégrade en FV à petites mailles, puis en asystolie. La dépolarisation induite par la défibrillation permet la resynchronisation de l'activité électrique myocardique.

Copyrighted material

CONSENSUS

Prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire
SRLF, SFAR, 2006

- Le rapport compression/ventilation est de **30/2** pour toutes les victimes d'arrêt cardiaque **0**.
- Depuis les dernières recommandations, la RCP de base ne débute plus par 2 insufflations mais par 30 compressions thoraciques, réalisées immédiatement après le diagnostic d'arrêt cardiaque **0**.
- Dès que les voies aériennes sont contrôlées (patient intubé), le massage cardiaque externe est réalisé en continu.

La défibrillation devrait être la première manœuvre (avant ABC) si le diagnostic d'arrêt cardiorespiratoire par FV a pu être fait immédiatement. Une brève réanimation cardiopulmonaire (ABC) est cependant recommandée avant défibrillation si la FV est prolongée.

Le choc électrique doit être délivré en fin d'expiration, où l'impédance thoracique est la plus faible et où l'énergie nécessaire sera donc la plus faible. Une énergie trop forte peut léser le myocarde. Une énergie trop faible est inefficace. On commence avec une énergie relativement faible (150-200 J) puis on augmente à 360 J si 150-200 J ont été inefficaces. Si l'on utilise un défibrillateur monophasique (et non biphasique), on utilise une seule énergie de 360 J pour tous les chocs.

Il faut poursuivre le massage cardiaque externe pendant la phase de chargement du défibrillateur. Chaque choc doit être suivi de la reprise de la réanimation cardiopulmonaire de base pendant 2 minutes (soit 5 cycles « 30/2 »).

CONSENSUS

Prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire
SRLF, SFAR, 2006

Un choc électrique unique, avec une énergie de 120 à 150 joules pour un défibrillateur biphasique et de 360 joules pour un défibrillateur monophasique, est délivré. Il est immédiatement suivi par 2 minutes de RCP ininterrompue, sans vérifier la disparition de la fibrillation ventriculaire (FV), le pouls ou l'apparition de signes de vie **0**.

L'existence d'un défibrillateur pour défibrillation automatisée externe (DAE) peut réduire le délai avant défibrillation. Ce défibrillateur identifie par des électrodes thoraciques la fibrillation ventriculaire, détermine la charge à administrer et donne une instruction vocale pour que soit délivré le choc. La DAE est utilisée en France par les secouristes et devrait à l'avenir être implantée dans

Copyrighted material

les hôpitaux pour être utilisée par des infirmières formées. Aux États-Unis, elle est à disposition du public dans certains lieux (centres commerciaux, casinos, aéroports, stades…).

CONSENSUS

Prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire
SRLF, SFAR, 2006

Les interruptions des mesures de la RCP de base doivent être réduites au minimum. C'est pourquoi la RCP spécialisée n'est réalisée que dans un 2e temps, quand la RCP de base a été bien conduite 0.

C. Réanimation cardio-pulmonaire spécialisée

1. Abord veineux

Mise en place d'une ou deux voies veineuses périphériques ; la voie veineuse centrale n'est pas recommandée à ce stade car elle peut être à l'origine de complications (hématome, pneumothorax) et nécessiter l'interruption du massage cardiaque externe. La voie intra-osseuse est la première alternative proposée, en position malléolaire médiane chez l'adulte, mais n'est pas encore d'utilisation fréquente en France. La voie intratrachéale est l'alternative de second choix.

2. Traitement pharmacologique

a) Adrénaline

- L'objectif essentiel de ce traitement est de restaurer la pression artérielle diastolique et donc la pression de perfusion coronaire. En cas d'asystolie ou de dissociation électromécanique, l'adrénaline est indiquée après la première séquence de la RCP. En cas de FV, du fait de son caractère proarythmogène, l'adrénaline est indiquée dès défibrillation, ou si la défibrillation échoue.
- L'adrénaline présente des propriétés alphamimétiques (vasopressives) et bêtamimétiques (inotropes positives).
- C'est le traitement de choix en l'absence de fibrillation ventriculaire car l'adrénaline est arythmogène.
- Ses modalités sont les suivantes : 1 mg IV toutes les 3 à 5 minutes puis en augmentant à 3 puis à 5 mg en cas d'échec de la posologie précédente. Des doses plus élevées exposeraient à des complications ischémiques graves sans améliorer la survie. En l'absence de voie veineuse ou osseuse, la voie endotrachéale chez un patient intubé est possible : l'adrénaline diluée dans 10 mL d'eau pour préparation injectable est alors administrée à posologie double de celle qui serait employée par voie veineuse.

Copyrighted material

■ Enfin, l'adrénaline pourrait être utilisée en cas de fibrillation ventriculaire lorsque des défibrillations itératives ont échoué.

CONSENSUS

Prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire
SRLF, SFAR, 2006

■ En cas de FV ou de TV sans pouls persistant après 2 chocs, il faut injecter 1 mg d'adrénaline IV et répéter l'injection toutes les 3 à 5 minutes.
■ Rythme sans pouls et asystolie : l'injection de 1 mg d'adrénaline IV sera pratiquée dès qu'une voie veineuse est obtenue et répétée ensuite toutes les 3 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une reprise d'activité cardiaque spontanée [0].

b) Atropine

Traitement de la bradycardie et du syndrome vagal, l'atropine est également proposée au cours de l'arrêt cardiorespiratoire par asystolie ou de dissociation électromécanique, en association à l'adrénaline (1 mg IVD et jusqu'à 3 mg).

c) Vasopressine

C'est un vasopresseur non catécholaminergique. La vasopressine ne serait donc pas arythmogène comme l'adrénaline et a donc été proposée dans la prise en charge de l'arrêt cardiorespiratoire comme alternative ou en association à l'adrénaline. L'analyse de la littérature ne permet pas cependant de la recommander à ce jour.

d) Amiodarone

C'est le traitement de première intention en cas de FV : 300 mg (2 ampoules) IV, puis 150 mg IV et 900 mg/24 h si la FV persiste. [0]

e) Xylocaïne

C'est le traitement de second choix en cas de FV, qui n'a démontré son intérêt qu'en prévention de la fibrillation ventriculaire lors de l'infarctus du myocarde mais jamais au cours de l'arrêt cardiaque.

3. Remplissage vasculaire

Les solutés cristalloïdes comme le sérum physiologique sont le plus souvent utilisés.

L'emploi de bicarbonates (50 mL de bicarbonates molaires IV) doit être limité à l'existence d'une acidose métabolique sévère préexistante, d'une hyperkaliémie ou d'une intoxication par stabilisant de membrane. Ils peuvent en effet aggraver l'acidose intracellulaire, avoir un effet inotrope négatif, entraîner une charge osmolaire et sodée délétère pour le cerveau, déplacer vers la gauche la courbe de dissociation de l'hémoglobine.

Copyrighted material

4. Ventilation artificielle

Dès que possible, l'intubation orotrachéale doit être effectuée pour l'oxygénation et la protection des voies aériennes mais son utilité doit être pesée face aux dégâts neurologiques potentiels d'un arrêt prolongé de la RCP. Elle doit donc être réalisée par un médecin expérimenté, et peut être précoce si la personne est apte à l'exécuter en un minimum de temps. Une fois intubés, les patients sont ventilés avec un volume courant d'environ 6 mL/kg et une fréquence respiratoire de 8 à 10 cycles/min.

5. Techniques alternatives au massage cardiaque externe manuel

Dans le meilleur des cas, le massage cardiaque externe ne permet d'obtenir un débit cardiaque qu'égal à 25 % du débit normal. Plusieurs méthodes ont été développées pour améliorer son efficacité :

- la compression-décompression active du thorax, où une ventouse appliquée sur le thorax génère une pression intrathoracique négative en diastole permettant d'augmenter le retour veineux sanguin et le remplissage cardiaque ;
- la compression automatisée du thorax (« planche à masser ») ;
- la compression abdominale intermittente, où l'abdomen est comprimé en alternance avec le thorax pour faciliter le retour veineux intrathoracique en diastole ;
- le ballon d'occlusion intra-aortique, permettant d'augmenter le débit sanguin cérébral et coronaire.

Certaines de ces techniques sont encore au stade de l'évaluation. Le massage cardiaque interne, enfin, s'adresse aux situations particulières du patient au bloc opératoire pour lequel une thoracotomie a déjà été réalisée.

D. Arrêt de la réanimation

Les manœuvres de réanimation peuvent être arrêtées si une activité cardiaque spontanée n'est pas obtenue après environ 30 minutes d'asystolie persistante, malgré une réanimation cardiopulmonaire bien conduite. L'hypothermie et les intoxications incitent à prolonger la RCP (facteurs de protection cérébrale).

E. En réanimation

1. Prise en charge de la défaillance myocardique

Au décours d'un arrêt cardiorespiratoire réanimé, il existe une dysfonction myocardique liée à une « sidération myocardique », pouvant être complètement réversible et pouvant bénéficier d'un traitement inotrope positif. La fréquence des lésions coronaires au cours de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier justifie la réalisation d'une coronarographie en urgence quand aucune autre cause n'a été identifiée. ➤ ITEM 132

Copyrighted material

2. Prise en charge de la défaillance multiviscérale

Au décours d'un arrêt cardiaque prolongé, le tableau clinique est celui d'un état de choc avec défaillance multiviscérale. Ce syndrome de « postressuscitation » a l'apparence d'un choc septique et en partage le traitement symptomatique.

ITEM 200

3. Pronostic neurologique

La protection du système nerveux central fait appel :

- au maintien d'une pression de perfusion cérébrale satisfaisante par restauration de la pression artérielle moyenne (à l'aide de vasopresseurs si besoin) ;
- à la correction d'une hypoxie ou d'une hypercapnie ;
- au maintien d'une hypocapnie modérée (35 mmHg) grâce aux modalités de réglage de la ventilation mécanique ;
- au contrôle de la glycémie et de la natrémie ;
- à la lutte contre l'hyperthermie (vessies de glace, traitement antipyrétique) : la réalisation d'une hypothermie modérée (32-34 °C) par refroidissement externe pendant 24 heures est proposée.

L'encéphalopathie postanoxique est le tableau clinique redouté au décours d'un arrêt cardiocirculatoire pour lequel une activité circulatoire a été récupérée. L'examen neurologique initial ne permet cependant pas d'établir le pronostic neurologique. L'examen neurologique au 3^{e} jour et la réalisation de potentiels évoqués somesthésiques à cette date permettraient d'aider à distinguer les patients pour lesquels l'absence de réveil est fortement prévisible.

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Arrêt cardio-circulatoire




Fig. 185-2. Algorithme universel selon la conférence de consensus SRLF, SFAR, 2006.

Copyrighted material

ITEM 193

Détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer une détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- Diagnostiquer un corps étranger des voies aériennes supérieures.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

LIENS TRANSVERSAUX

- ITEM 86 Infections bronchopulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- ITEM 120 Pneumopathie interstitielle diffuse.
- ITEM 135 Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.
- ITEM 198 Dyspnée aiguë et chronique.
- ITEM 211 Œdème de Quincke et anaphylaxie.
- ITEM 226 Asthme de l'enfant et de l'adulte.
- ITEM 227 Bronchopneumopathie chronique obstructive.
- ITEM 250 Insuffisance cardiaque de l'adulte.
- ITEM 254 Insuffisance respiratoire chronique.
- ITEM 276 Pneumothorax.
- ITEM 300 Constipation chez l'enfant et l'adulte.

CONSENSUS

- Aucune conférence de consensus n'existe à ce jour sur ce thème.

Copyrighted material

POUR COMPRENDRE…

■ La détresse respiratoire aiguë est une cause fréquente de consultation dans les services d'urgence.

■ La mise en route d'un traitement symptomatique prime sur la pratique d'examens complémentaires à visée étiologique.

■ La respiration requiert :

– des voies aériennes hautes et basses intègres ;

– la mise en jeu de 5 fonctions : la fonction neuromusculaire respiratoire, la fonction d'échange gazeux pulmonaire à travers la membrane alvéolocapillaire, la fonction de transport gazeux jusqu'aux tissus, la fonction de transfert gazeux du sang aux tissus puis aux cellules et aux mitochondries.

■ L'insuffisance respiratoire aiguë est donc la conséquence de l'atteinte des voies aériennes et/ou du dysfonctionnement d'une ou plusieurs de ces fonctions.

■ La détresse respiratoire aiguë représente la forme asphyxique de l'insuffisance respiratoire aiguë. Il en résulte une impossibilité pour l'organisme de maintenir l'hématose (PaO_2 et/ou $PaCO_2$) à des valeurs physiologiques.

■ L'hypoxémie met rapidement en jeu le pronostic vital par la survenue d'une hypoxie myocardique pouvant conduire à un arrêt cardiaque. Le traitement symptomatique de l'hypoxie est avant tout l'oxygénothérapie.

■ L'hypercapnie met généralement moins vite en jeu le pronostic vital, même si elle peut être à l'origine d'une acidose respiratoire puis d'une hyperkaliémie et de troubles du rythme cardiaque. Le traitement symptomatique de l'hypercapnie, qui traduit l'atteinte de la fonction neuromusculaire respiratoire, est avant tout la ventilation mécanique.

■ La mesure de la fréquence respiratoire est un paramètre capital du diagnostic d'insuffisance respiratoire aiguë mais aussi du suivi des mesures thérapeutiques.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Fonction neuromusculaire respiratoire

■ Le thorax se comporte comme une « pompe respiratoire » qui renouvelle l'oxygène alvéolaire et emporte le dioxyde de carbone alvéolaire. La ventilation varie de 6 L/min au repos à 100 L/min à l'effort maximal.

Copyrighted material

■ En situation physiologique, l'inspiration est quasi exclusivement assurée par le diaphragme, qui s'abaisse et allonge la cavité thoracique. L'expiration est assurée passivement par l'élasticité thoracopulmonaire.

■ Lorsque le diaphragme est dépassé, les muscles respiratoires accessoires sont mis en jeu et permettent soit une inspiration (muscles intercostaux externes, sternocléidomastoïdien, scalènes, qui provoquent une élévation des côtes et du sternum), soit une expiration active (muscles intercostaux internes, droit abdominal qui abaissent les côtes et le sternum et compriment le contenu abdominal contre le diaphragme).

■ La commande respiratoire est située dans le bulbe rachidien au niveau du tronc cérébral.

■ Le diaphragme est innervé par le nerf phrénique, qui est constitué principalement des rameaux issus des 3^e et 4^e racines cervicales.

■ Les muscles respiratoires du cou sont innervés par les branches motrices des nerfs mixtes et des premières racines cervicales. Les muscles intercostaux sont innervés par les nerfs intercostaux issus des racines dorsales correspondantes. Les muscles de l'abdomen sont innervés par les cinq derniers nerfs intercostaux.

B. Fonction d'échanges gazeux

■ Les échanges gazeux se font entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire pulmonaire au travers de la membrane alvéolocapillaire.

■ La diffusion de l'oxygène à travers la membrane alvéolocapillaire résulte du gradient de pression existant entre l'alvéole (PAO_2 = 100 mmHg) et le sang veineux mêlé dans l'artère pulmonaire (PvO_2 = 20 à 40 mmHg).

■ L'atteinte de la fonction d'échanges gazeux peut être la conséquence d'un trouble de la diffusion à travers la membrane alvéolocapillaire ou d'une altération des rapports entre la ventilation et la perfusion par effet shunt (zone perfusée non ventilée) ou espace mort (zone ventilée non perfusée).

C. Fonction de transport en oxygène

■ L'oxygène est présent dans le sang de façon majoritaire lié à l'hémoglobine, sous la forme d'oxyhémoglobine (HbO_2), et en très petite quantité sous forme dissoute.

■ La saturation en oxygène (SaO_2 = HbO_2/Hb totale) reflète la partie liée à l'hémoglobine ; la PaO_2 est le reflet de la partie dissoute.

■ Le transport en oxygène (TaO_2) est donc essentiellement réalisé par l'hémoglobine, les globules rouges étant eux transportés aux tissus par le débit cardiaque : $TaO_2 = CaO_2 \times IC$, où :

– IC = index cardiaque ;

– CaO_2 = contenu artériel en O_2 = $(SaO_2 \times 1{,}34 \times Hb) + (PaO_2 \times 0{,}003)$;

Copyrighted material

– 1,34 étant le coefficient d'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène ;

– 0,003 étant le coefficient de solubilité de l'oxygène dans le plasma.

■ L'atteinte de la fonction de transport en oxygène est donc la conséquence d'une diminution du contenu artériel en oxygène (par diminution de l'hémoglobine, ou de la saturation, ou de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène) et/ou d'une diminution du débit cardiaque.

D. Fonction de transfert de l'oxygène

■ Le transfert de l'oxygène aux tissus périphériques se fait par diffusion jusqu'aux cellules et aux mitochondries, où se produit la respiration cellulaire.

■ La quantité d'oxygène extraite du sang artériel par les tissus est reflétée par les différences de saturation en oxygène du sang artériel et veineux. Au repos, l'extraction globale est d'environ 25 % mais est très variable d'un organe à l'autre (l'extraction basale du myocarde est de 60 %, par exemple).

■ La fonction de transfert peut être atteinte au cours des situations associées à une anomalie de l'extraction en oxygène.

E. Courbe de dissociation de l'hémoglobine *(fig. 193-1)*

La relation entre la PO_2 et la SO_2 n'est pas linéaire mais sigmoïde. La partie supérieure droite est presque plate car pour des PO_2 élevées (> 50 mmHg), l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est élevée. Ainsi au niveau pulmonaire, la captation de l'oxygène est forte. À l'inverse, la partie inférieure gauche est presque verticale car pour des PO_2 basses (< 40 mmHg), l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est très réduite. Ainsi au niveau tissulaire, la libération de l'oxygène et sa diffusion vers les cellules sont possibles.

On comprend également qu'en dessous du seuil de SaO_2 de 90 %, la PaO_2 chute dramatiquement. C'est la raison pour laquelle, en pratique clinique, l'objectif de l'oxygénothérapie est d'obtenir une SaO_2 > 90 %, soit une PaO_2 > 60 mmHg.




Fig. 193-1. Courbe de dissociation de l'hémoglobine.

Copyrighted material

II. CAUSES

L'insuffisance respiratoire aiguë est donc la conséquence de l'atteinte des voies aériennes et/ou du dysfonctionnement d'une ou plusieurs étapes de la respiration.

A. Atteinte des voies aériennes

- Obstruction des voies aériennes supérieures : corps étranger, œdème de Quincke, épiglottite, tumeur laryngée.
- Obstruction des voies aériennes inférieures : crise d'asthme, exacerbation d'une bronchopathie chronique ITEMS 226, 254.

B. Atteinte de la fonction neuromusculaire respiratoire

- Au niveau du tronc cérébral :
 - intoxication médicamenteuse : benzodiazépines, morphiniques ITEM 300 ;
 - accident vasculaire cérébral ;
 - tumeur ;
 - abcès.
- Au niveau de la moelle épinière, au-dessus du niveau C4 :
 - traumatisme du rachis cervical ;
 - thrombose vasculaire ;
 - tumeur ;
 - myélite.
- Au niveau des afférences nerveuses :
 - poliomyélite antérieure aiguë ;
 - polyradiculonévrite aiguë ;
 - sclérose latérale amyotrophique.
- Au niveau de la plaque motrice : myasthénie.
- Au niveau de la musculature respiratoire :
 - myopathies par atteinte musculaire aiguë (polymyosite, dermatopolymyosite) ou par dystrophie musculaire lentement progressive (myopathie de Duchenne de Boulogne, myopathie de Steinert…) ;
 - épuisement respiratoire engendré par l'augmentation du travail respiratoire quelle que soit la cause initiale de la détresse respiratoire.

C. Atteinte de la fonction d'échanges gazeux

- Trouble de la diffusion alvéolocapillaire :
 - œdème pulmonaire cardiogénique ITEM 250 ;
 - œdème pulmonaire lésionnel aboutissant dans sa forme la plus sévère au syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) ;
 - pneumopathie infiltrative du poumon et fibroses pulmonaires ITEM 120.
- Effet shunt :
 - œdème pulmonaire cardiogénique ;

Copyrighted material

– pneumopathie infectieuse aiguë ITEM 86 ;

– hémorragie intra-alvéolaire ;

– atélectasie ;

– épanchement pleural liquidien ou gazeux, le parenchyme pulmonaire étant tassé en regard de l'épanchement.

- Effet espace mort : embolie pulmonaire ITEM 135.

D. Atteinte de la fonction de transport gazeux

- Par diminution de l'hémoglobine : anémies.
- Par diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène : intoxication au monoxyde de carbone.
- Par diminution du débit cardiaque : choc cardiogénique, choc hypovolémique.

E. Atteinte de l'utilisation cellulaire de l'oxygène

- Choc septique.
- Rares mitochondriopathies.

F. Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

1. Définition

Le SDRA est un syndrome caractérisé par une inflammation de la membrane alvéolocapillaire et une augmentation de la perméabilité capillaire pulmonaire. Il est associé à une constellation d'anomalies cliniques, radiologiques et physiologiques qui ne peuvent être expliquées par une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire ou une maladie pulmonaire chronique.

2. Diagnostic

Le diagnostic de SDRA est donc fondé sur une association de critères biologiques, cliniques et radiologiques, incluant :

- un tableau brutal ;
- des infiltrats radiologiques pulmonaires bilatéraux ;
- la présence d'un rapport $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ mmHg ;
- une pression artérielle pulmonaire d'occlusion ≤ 18 mmHg ou l'absence d'évidence clinique d'insuffisance ventriculaire gauche.

3. Causes

La cause du SDRA peut être respiratoire (l'agression initiale a lieu dans les poumons) ou extrarespiratoire (l'agression initiale est extrapulmonaire mais entraîne des lésions pulmonaires par l'activation de cascades inflammatoires) :

- les causes respiratoires sont : la pneumopathie infectieuse, la pneumopathie d'inhalation (syndrome de Mendelson), la pneumopathie infiltrative aiguë, la pneumopathie radique, la contusion pulmonaire, la noyade, l'inhalation de gaz toxiques, les embolies graisseuses et amniotiques ;

Copyrighted material

■ les causes extra-respiratoires sont : les états de choc (septique notamment), la pancréatite aiguë, la péritonite, le polytraumatisme, les brûlures étendues, la transfusion massive, certaines intoxications par voie générale.

4. Physiopathologie

Après agression de la membrane alvéolocapillaire, la physiopathologie est décrite en 3 phases :

■ phase exsudative : liée à la formation d'un œdème exsudatif alvéolo-interstitiel ;

■ phase de fibrose, caractérisée par la prolifération de fibroblastes ;

■ phase de réparation, marquée par la fin des phénomènes inflammatoires et du processus de fibrose. La constitution progressive d'une fibrose pulmonaire est parfois responsable du décès ou de la constitution d'une insuffisance respiratoire séquellaire.

5. Pronostic

La mortalité du SDRA est élevée, de l'ordre de 50 %. Elle survient soit précocement, et est alors liée à l'hypoxie, soit tardivement et est alors liée au syndrome de défaillance multiviscérale qui lui est associé ou aux complications d'une réanimation prolongée (infections nosocomiales, notamment). Chez la plupart des survivants, la fonction respiratoire redevient normale dans les 6 à 12 mois qui suivent l'agression pulmonaire.

6. Prise en charge

En dehors du traitement spécifique de la cause, le traitement repose le plus souvent sur la ventilation mécanique, qui permet :

■ d'administrer un mélange gazeux riche en oxygène (jusqu'à FiO_2 = 100 %) ;

■ d'appliquer une pression expiratoire positive (PEP) permettant de maintenir les alvéoles ouvertes (recrutement alvéolaire) et de favoriser les échanges gazeux.

Des études récentes ont démontré le bénéfice de réaliser une ventilation « douce », dite également « protectrice », en employant un volume courant bas et en limitant les pressions insufflées de façon à ne pas surdistendre le poumon.

Enfin plusieurs techniques sont actuellement utilisées pour améliorer encore l'oxygénation. Parmi ces techniques, on retient :

■ le positionnement en décubitus ventral, qui favorise le recrutement alvéolaire des régions dorsales du poumon ;

■ le monoxyde d'azote qui, administré par voie inhalée, favorise la vasodilatation des territoires ventilés (mais pas des territoires collabés), augmentant ainsi le rapport VA/Q, et diminuant par là même l'effet shunt.

Copyrighted material

III. DIAGNOSTIC

A. Diagnostic d'insuffisance respiratoire aiguë

■ Le diagnostic d'insuffisance respiratoire aiguë est fondé sur la survenue brutale ou rapidement progressive de signes respiratoires, au premier rang desquels la dyspnée ITEM 198 et la polypnée, qu'il est indispensable de quantifier par la mesure de la fréquence respiratoire .

■ Le diagnostic de détresse respiratoire aiguë repose sur la présence de signes de gravité respiratoires, circulatoires et neurologiques (voir *infra*) associés à cette dyspnée.

B. Diagnostic de la cause

Le diagnostic de la cause de la détresse respiratoire reposera, après mise en œuvre des mesures d'urgence, sur les étapes suivantes :

1. Interrogatoire

Il recherche ou précise :

■ les modalités d'installation (début brutal ou progressif) ;

■ l'existence d'épisodes antérieurs ;

■ l'existence d'un handicap respiratoire ou d'une pathologie respiratoire préalable, d'une pathologie cardiaque, neurologique, d'un terrain thromboembolique, d'une néoplasie, d'une immunodépression, d'un traumatisme, d'un contexte toxique ;

■ l'activité professionnelle, le contexte social.

2. Examen clinique

Il recherche ou précise :

■ le type de la dyspnée (orthopnée, de type Cheyne-Stokes, de type Kussmaul) ITEM 198 ;

■ des bruits respiratoires anormaux (sibilants, freinage expiratoire, crépitants, ronchis, stridor, cornage…), un silence auscultatoire ;

■ une matité ou un tympanisme à la percussion thoracique ;

■ les caractères d'une éventuelle expectoration (mousseuse, purulente, hémoptoïque) ;

■ une dysphonie, une dysphagie, une hypersialorrhée ;

■ des signes d'insuffisance cardiaque droite ;

■ un syndrome infectieux ;

■ un syndrome douloureux thoracique ;

■ des signes de phlébite.

Copyrighted material

3. Bilan complémentaire

Il comporte :

- radiographie thoracique : elle est souvent difficile à interpréter car mal inspirée dans un contexte de détresse respiratoire aiguë et faite seulement de face en décubitus dorsal en position assise ou couchée ;
- gaz du sang : ils permettent de juger de l'importance de l'hypoxie, de rechercher une hypercapnie, de rechercher une acidose respiratoire ou métabolique, alors souvent d'origine lactique. On distingue classiquement deux tableaux :
 - l'effet shunt, défini par la présence d'une hypoxie sans hypercapnie, avec une somme $PaO_2 + PaCO_2 < 120$ mmHg en air ambiant ;
 - l'hypoventilation alvéolaire définie par la présence d'une hypercapnie. La réalisation du premier gaz du sang en air ambiant permet de mieux juger de la gravité de l'hypoxémie et constitue un examen de référence ;
- ionogramme sanguin, urée, créatinine, glycémie, protidémie ;
- électrocardiogramme ;
- numération-formule sanguine ;
- bilan hépatique ;
- bilan d'hémostase ;
- selon le contexte : prélèvements bactériologiques, CRP, procalcitonine, BNP ou NT-proBNP, D-dimères ;
- échocardiographie : elle permet d'apprécier la contractilité myocardique, d'estimer les pressions de remplissage, de rechercher une anomalie de la cinétique segmentaire, une valvulopathie, un aspect de cœur pulmonaire, de mesurer la pression artérielle pulmonaire ;
- selon le contexte : écho-Doppler des membres inférieurs, angioscanner thoracique, cathéter artériel pulmonaire…

IV. PRISE EN CHARGE

A. Rechercher des signes de gravité

La première étape consiste à rechercher des signes de gravité respiratoires, cardiovasculaires ou neurologiques, qui font le diagnostic de détresse respiratoire aiguë et motivent une prise en charge en réanimation.

1. Signes de gravité respiratoires

- Polypnée > 25 cpm ou, plus grave, bradypnée < 10 cpm ou apnées.
- Mise en jeu des muscles respiratoires accessoires (tirage sus-claviculaire, sus-sternal et intercostal ou, plus grave, disparition des signes de lutte).
- Épuisement diaphragmatique : respiration abdominale paradoxale (dépression inspiratoire du creux épigastrique).
- Dyspnée à la parole.

Copyrighted material

■ Cyanose (signe la présence d'une Hb réduite > 5 g/100 mL, majorée en cas de polyglobulie, retardée en cas d'anémie).

■ Sueurs (liées à l'hypercapnie).

2. Signes de gravité cardiovasculaires

■ Tachycardie > 120 bpm.

■ Troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire ou, plus graves, bradycardie et autres troubles conductifs.

■ Signes d'insuffisance ventriculaire droite.

■ Signes de choc.

3. Signes de gravité neurologiques

■ Syndrome confusionnel.

■ Agitation (plutôt liée à l'hypoxie).

■ Troubles de la conscience (plutôt liés à l'hypercapnie).

B. Rechercher une étiologie imposant un geste salvateur particulier

1. Pneumothorax suffocant

ITEM 276

■ Une exsufflation à l'aiguille sur la ligne médioclaviculaire et au 2e espace intercostal permet, parce qu'elle met en communication la cavité pleurale où règne une pression élevée et l'atmosphère, d'établir une pression pleurale nulle.

■ Secondairement, un drain thoracique est mis en place, le plus souvent au 6e espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne.

2. Œdème de Quincke

ITEM 211

Son traitement en urgence repose sur l'administration d'un bolus d'adrénaline, par voie IM en l'absence de voie veineuse (0,5 mg), ou par voie IV (0,1 mg).

3. Corps étranger des voies aériennes supérieures

■ Rare chez l'adulte, l'incidence du corps étranger des voies aériennes supérieures augmente avec l'âge. Il survient dans 3 types de circonstances :

– au cours d'un repas, lors d'un événement perturbateur (fou rire, surprise) ou à l'occasion d'une attitude gloutonne (imprégnation éthylique, troubles psychiatriques, démence) ;

– au cours d'activités de bricolage par inhalation d'un objet tenu dans la bouche ;

– au cours de soins dentaires.

■ Il est favorisé par les troubles de déglutition (pathologie neurologique évolutive, pathologie ORL).

■ Le tableau clinique initial du syndrome de pénétration associe brutalement une toux quinteuse, intense, expulsive et un tableau d'angoisse et d'agitation.

Copyrighted material

Secondairement, 4 situations peuvent être observées :

– soit le corps étranger est expulsé et les signes respiratoires s'amendent complètement ;

– soit le corps étranger est inhalé, migre le plus souvent dans l'arbre bronchique droit (rarement dans la trachée, qui est large) et les signes respiratoires s'atténuent tandis qu'apparaît un sifflement unilatéral ;

– soit le corps étranger reste enclavé dans les voies aériennes supérieures mais n'est pas totalement obstructif et l'on observe une bradypnée inspiratoire, un cornage, une dysphonie ;

– soit le corps étranger reste enclavé dans les voies aériennes supérieures et est totalement obstructif, entraînant un tableau d'asphyxie.

■ Les insuffisances respiratoires d'origine haute peuvent imposer un geste immédiat de désobstruction, qui est un geste de sauvetage si l'obstacle est total. Ces gestes sont de réalisation difficile et dangereuse. En cas d'obstacle partiel, il est donc préférable de les faire réaliser par une équipe entraînée et dans l'attente éviter toute manœuvre, calmer le patient, administrer de l'oxygène.

■ Parmi les gestes de désobstruction, on retient :

– l'ouverture forcée de la bouche : elle s'effectue à l'aide du pouce et de l'index, introduits au coin de la bouche, l'index prenant appui sur le maxillaire inférieur, le pouce sur le maxillaire supérieur. Un éventuel corps étranger est alors extrait au doigt ou à la pince de Magill ;

– la manœuvre de Heimlich : le patient étant assis ou debout, on se positionne derrière lui et l'on enlace la partie haute de l'abdomen, les deux mains étant placées sous la xiphoïde. Une compression forte de l'abdomen est réalisée, orientée de bas en haut dans le but de provoquer une hyperpression dans les voies aériennes capable d'éjecter le corps étranger hors de celles-ci. Chez une victime inconsciente au sol, le sauveteur applique ses 2 mains sur l'épigastre et appuie fortement de bas en haut et d'avant en arrière. Cette manœuvre ne doit pas être pratiquée en cas d'occlusion partielle, car le corps étranger déplacé peut devenir complètement occlusif ;

– l'intubation : elle est souvent très difficile dans ce contexte et parfois impossible ;

– la cricothyroïdotomie ou la trachéotomie : possibles en milieu hospitalier, elles sont également réalisées par une équipe entraînée.

■ Secondairement, la bronchoscopie rigide au bloc opératoire permettra l'extraction d'un corps étranger enclavé dans les voies aériennes supérieures ou les bronches.

Copyrighted material

C. Rechercher une indication à la mise sous ventilation mécanique

■ La mise en route de la ventilation mécanique (invasive après intubation ou non invasive par l'intermédiaire d'un masque facial) est souvent nécessaire lorsque le patient présente des signes liés à une hypercapnie (sueurs, tachycardie, hypertension artérielle, astérixis, troubles de la conscience), l'hypercapnie signant l'atteinte de la musculature respiratoire.

■ L'intubation est extrêmement urgente si le patient présente :

0 – une bradypnée ou des apnées qui précèdent l'arrêt respiratoire ;

– des troubles du rythme graves, une bradycardie ou des troubles conductifs

0 qui précèdent l'arrêt cardiaque.

D. Mise en condition dans toutes les situations

■ Le patient est laissé en position demi-assise.

■ La liberté des voies aériennes est vérifiée.

■ Un monitorage du rythme cardiaque et de l'oxymétrie de pouls est mis en

0 place.

0 ■ Une oxygénothérapie est débutée :

– l'objectif de l'oxygénothérapie est d'augmenter la fraction inspirée en oxygène (FiO_2) de 21 % en air ambiant jusqu'à 100 % (oxygène pur), de façon à corriger l'hypoxémie et *in fine* l'hypoxie tissulaire. La correction de l'hypoxie est un objectif prioritaire et le risque d'aggravation d'une hypercapnie chez un insuffisant respiratoire chronique n'est jamais une contre-indication à

0 l'oxygénothérapie. Elle est indiquée dès lors que la SaO_2 est inférieure à 92 % (90 % chez l'insuffisant respiratoire chronique). Il est en revanche nécessaire de diminuer les débits d'oxygène lorsque la SaO_2 devient trop élevée chez

0 l'insuffisant respiratoire chronique ;

– les moyens disponibles pour administrer l'oxygène sont :

• les lunettes nasales à oxygène, qui ne permettent d'obtenir que des FiO_2 basses, le mélange gazeux inhalé étant contaminé par la ventilation buccale ;

• la sonde nasale, qui permet d'obtenir des FiO_2 plus élevées si son extrémité est bien positionnée au-dessus du plan glottique ;

• le masque à haute concentration avec ballon réservoir permettant d'obtenir des FiO_2 élevées (jusqu'à 100 %). Il faut savoir cependant que dans le ballon réservoir peut s'accumuler du CO_2 expiré par le patient si les débits d'O_2 utilisés sont faibles ou si la mécanique ventilatoire du patient est altérée. Le patient est alors susceptible d'inhaler ce mélange gazeux riche en CO_2 *(rebreathing)* avec un risque d'hypercapnie ;

– chez l'insuffisant respiratoire chronique, l'oxygénothérapie est susceptible d'aggraver l'hypercapnie. Ce risque, bien que classique, est limité et ne doit pas contre-indiquer la mise en route de l'oxygénothérapie lorsqu'il existe une

0 hypoxie. Les mécanismes à l'origine de ce phénomène sont nombreux et com-

Copyrighted material

plexes. La disparition du stimulus neurologique central à l'hypoxie est le plus souvent citée. C'est cependant un mécanisme transitoire probablement limité par la stimulation neurologique centrale quand la $PaCO_2$ augmente. Les mécanismes les plus importants sont probablement :

- la modification des rapports ventilation/perfusion avec augmentation de l'espace mort ;
- l'effet Haldane, lié au fait que l'oxyhémoglobine a moins d'affinité pour le CO_2 que l'hémoglobine réduite : la fraction dissoute en CO_2 est alors augmentée et donc la $PaCO_2$ est augmentée ;
 - l'objectif de l'oxygénothérapie est bien ici d'obtenir une SaO_2 de 90 % sans dépasser ce seuil. L'aggravation d'une hypercapnie malgré une oxygénothérapie conduite selon ces conditions motive de toute façon la mise en route de la ventilation mécanique ;
 - la surveillance de l'oxygénothérapie repose sur la mesure des gaz du sang et surtout sur l'oxymètre de pouls, qui permet un monitorage continu de la SpO_2. Un capteur positionné au niveau d'un doigt en permet la mesure transcutanée par spectrophotométrie. [0]

■ Une voie veineuse de bon calibre est posée. [0]

■ Une sonde nasogastrique est souvent posée en raison de la fréquence des dilatations gastriques aiguës accompagnant la détresse respiratoire.

■ Une sonde urinaire est mise en place, notamment si une surveillance de la diurèse est indispensable.

E. Ventilation mécanique

La principale fonction de la ventilation mécanique est de suppléer à la faillite des muscles respiratoires et donc de corriger l'hypercapnie et l'acidose. Elle [0] permet aussi :

■ de corriger l'hypoxie, ce d'autant qu'une pression expiratoire positive permettant de recruter des alvéoles fermés est appliquée ;

■ de protéger les voies aériennes, lorsqu'un coma est associé à la détresse respiratoire, si elle est pratiquée par l'intermédiaire d'une intubation ;

■ de mettre en repos la musculature respiratoire et ainsi de réduire significativement la demande en oxygène au cours d'un état de choc ;

■ de diminuer le retour veineux (et donc les pressions de remplissage du cœur) par l'application d'une pression positive dans le thorax, cette propriété étant utilisée dans le cas particulier de l'œdème pulmonaire cardiogénique.

La ventilation mécanique peut être pratiquée après intubation orotrachéale ou nasotrachéale du patient, ou de façon dite non invasive par l'intermédiaire d'un masque facial.

Copyrighted material

1. Intubation orotrachéale ou nasotrachéale par laryngoscopie directe

■ Positionnement du patient : le meilleur alignement des axes oral, pharyngé et laryngé est obtenu après flexion du rachis cervical associée à une extension de la tête sur le cou.

■ Préoxygénation : par ventilation manuelle au masque, un ventilateur manuel composé d'un ballon « autoremplisseur » raccordé à un masque facial étant utilisé. Le gaz insufflé est enrichi en oxygène. Les voies aériennes sont d'abord libérées de tout corps étranger, une canule de Guédel est posée.

■ Laryngoscopie directe : après anesthésie générale, l'extension de la tête est accentuée. Le laryngoscope est introduit dans la bouche et la lame refoule la langue vers la gauche, offrant une vue directe du pharynx, tandis que le manche du laryngoscope est amené dans le plan médian. Lorsque la lame atteint la base de la langue, une traction exercée sur le laryngoscope vers le haut permet de voir l'extrémité supérieure de l'épiglotte. La pointe de la lame est avancée dans le sillon glosso-épiglottique. La traction du laryngoscope entraîne alors l'épiglotte vers l'avant et expose la glotte.

■ Intubation : la sonde endotrachéale à ballonnet est alors passée par la bouche (plus rarement par le nez) au travers des cordes vocales. Une fois la sonde en place, on la raccorde au système de ventilation et on gonfle le ballonnet.

2. Ventilation non invasive

■ Au cours de la ventilation non invasive, le patient est ventilé non pas par l'intermédiaire d'une sonde endotrachéale mais d'un masque facial. L'objectif est d'assurer un support ventilatoire en évitant le recours à une intubation et ses complications.

■ Les indications reconnues de la ventilation non invasive sont les situations où il existe une acidose respiratoire : décompensation aiguë d'une insuffisance respiratoire chronique et œdème pulmonaire cardiogénique asphyxique.

■ La ventilation non invasive n'est pas une bonne indication lorsqu'il existe une hypoxie isolée, sauf peut-être chez le patient immunodéprimé chez qui le risque de pneumopathie nosocomiale acquise sous ventilation mécanique après intubation est grand.

■ Les troubles de conscience sont la contre-indication majeure de la ventilation non invasive, qui ne remplit pas, par définition, son rôle de protection des voies aériennes.

■ L'échec de la ventilation non invasive doit de toute façon être jugé rapidement sur l'évolutivité clinique (fréquence respiratoire) et gazométrique et faire recourir à l'intubation.

Copyrighted material

F. Traitement spécifique de la cause

Il est indispensable mais extrêmement variable d'une situation à l'autre. Ses grands principes sont rappelés pour les pathologies les plus fréquentes dans le *tableau 193-1*.

Tableau 193-1. Traitements spécifiques des pathologies les plus fréquentes.

Cause	Traitement spécifique
Œdème pulmonaire cardiogénique	• Traitement vasodilatateur par dérivés nitrés • Traitement diurétique par diurétiques de l'anse • Ventilation non invasive dans les formes asphyxiques (hypercapniques)
Asthme aigu	• Traitement bronchodilatateur par bêta-2-mimétiques nébulisés • Traitement anti-inflammatoire par corticoïdes par voie générale • Traitement bronchodilatateur par atropiniques nébulisés en cas d'inefficacité des bêta-2-mimétiques nébulisés • Traitement bronchodilatateur par bêta-2-mimétiques IVSE en 2e intention • Traitement bronchodilatateur par adrénaline IVSE en 3e intention
Insuffisance respiratoire aiguë des insuffisances respiratoires chroniques	• Traitement bronchodilatateur par bêta-2-mimétiques nébulisés (dont l'efficacité est ici modeste) • Traitement bronchodilatateur par atropiniques nébulisés en cas d'inefficacité des bêta-2-mimétiques nébulisés • Traitement anti-inflammatoire par corticoïdes par voie générale, dont l'efficacité est ici très discutée • Traitement antibiotique, dès lors qu'un facteur déclenchant infectieux est suspecté • Ventilation non invasive ici indiscutable
Embolie pulmonaire	• Traitement anticoagulant par héparine non fractionnée IVSE, ou de bas poids moléculaire SC en l'absence de signe de gravité • Relais précoce par traitement anticoagulant anti-vitamine K dans tous les cas • Traitement thrombolytique par voie générale en cas de choc
Pneumopathie aiguë communautaire	Traitement antibiotique probabiliste par une association couvrant le pneumocoque et les germes atypiques fréquents (*Chlamydia* et mycoplasme)

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures

■ L'insuffisance respiratoire aiguë est la conséquence :

– de l'obstruction des voies aériennes hautes (corps étranger, œdème de Quincke, épiglottite, tumeur laryngée) ou basses (asthme, BPCO) ;

– et/ou d'un dysfonctionnement respiratoire au niveau neuromusculaire (intoxication médicamenteuse, traumatisme du rachis cervical, polyradiculonévrite, myasthénie, myopathie, épuisement respiratoire) et/ou des échanges gazeux (œdème pulmonaire cardiogénique, œdème pulmonaire lésionnel, hémorragie intra-alvéolaire, atélectasie, embolie pulmonaire) et/ou du transport gazeux (anémies, intoxication au CO, choc cardiogénique et hypovolémique) et/ou du transfert gazeux (choc septique).

■ Il en résulte une impossibilité pour l'organisme de maintenir l'hématose (PaO_2 et/ou $PaCO_2$) à des valeurs physiologiques : l'hypoxémie mettant rapidement en jeu le pronostic vital par la survenue d'une hypoxie myocardique pouvant conduire à un arrêt cardiaque, l'hypercapnie mettant généralement moins vite en jeu le pronostic vital, même si elle peut être à l'origine d'une acidose respiratoire puis d'une hyperkaliémie et de troubles du rythme cardiaque.

■ Le SDRA, motif fréquent d'admission en réanimation, est un œdème pulmonaire lésionnel défini par :

– un tableau brutal ;

– des infiltrats pulmonaires bilatéraux ;

– un rapport $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ mmHg ;

– une PAPO ≤ 18 mmHg ou l'absence d'évidence clinique d'insuffisance ventriculaire gauche.

■ Le diagnostic de détresse respiratoire aiguë repose sur la présence d'une dyspnée et de signes de gravité **0** :

– respiratoires : polypnée > 25 cpm, bradypnée < 10 cpm, signes de lutte (tirage sus-claviculaire, sus-sternal, intercostal), disparition des signes de lutte, respiration abdominale paradoxale, dyspnée à la parole, cyanose, sueurs ;

– cardiovasculaires : tachycardie > 120 bpm, troubles du rythme supraventriculaires ou ventriculaires, bradycardie, troubles conductifs, signes d'IVD, signes de choc ;

– neurologiques : syndrome confusionnel, agitation, troubles de la conscience.

■ La mesure de la fréquence respiratoire est un paramètre capital du diagnostic d'insuffisance respiratoire aiguë mais aussi du suivi des mesures thérapeutiques **0**.

■ Trois étiologies imposent un geste salvateur :

– pneumothorax suffocant : exsufflation à l'aiguille sur la ligne médioclaviculaire au 2e espace intercostal **0** ;

– œdème de Quincke : bolus d'adrénaline, par voie IM : 0,5 mg, ou IV : 0,1 mg **0** ;

– corps étranger des voies aériennes supérieures : manœuvre de Heimlich (si obstacle complet) **0**.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

- Dans tous les cas, le traitement associe :
 - positionnement demi-assis, libération des voies aériennes ;
 - monitorage du rythme cardiaque et de l'oxymétrie de pouls 0 ;
 - oxygénothérapie si $SpO_2 < 92\ \%$ 0 (même chez l'insuffisant respiratoire chronique, le risque d'aggravation d'une hypercapnie n'étant jamais une contre-indication à l'oxygénothérapie) 0 ;
 - pose d'une voie veineuse de bon calibre 0 ;
 - pose d'une sonde nasogastrique, d'une sonde urinaire.
- L'intubation est extrêmement urgente, si :
 - bradypnée ou apnées (précèdent l'arrêt respiratoire) 0 ;
 - troubles du rythme graves, bradycardie, troubles conductifs (précèdent l'arrêt cardiaque) 0.
- La ventilation mécanique peut être pratiquée après intubation orotrachéale ou nasotrachéale, ou de façon dite non invasive par l'intermédiaire d'un masque facial.
- La ventilation mécanique a pour principal objectif de corriger l'acidose respiratoire (en suppléant la faillite des muscles respiratoires) 0. Elle permet aussi de corriger l'hypoxie (recrutement alvéolaire par l'application d'une PEP), de protéger les voies aériennes en cas de coma associé (si intubation), de reposer la musculature respiratoire au cours d'un état de choc.
- Le traitement spécifique de la cause, variable d'une situation à l'autre, est indispensable.

Copyrighted material

Copyrighted material

ITEM 200

État de choc

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer un état de choc.
- Prise en charge immédiate.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 104 Septicémie.

ITEM 132 Angine de poitrine et infarctus du myocarde.

ITEM 201 Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un brûlé, chez un polytraumatisé, chez un traumatisé abdominal, chez un traumatisé cranio-facial, chez un traumatisé des membres, chez un traumatisé thoracique, devant une plaie des parties molles. Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

ITEM 205 Hémorragie digestive.

ITEM 211 Œdème de Quincke et anaphylaxie.

ITEM 250 Insuffisance cardiaque de l'adulte.

ITEM 252 Insuffisance rénale aiguë.

Sujets tombés aux concours de l'Internat

Sujets tombés

- 2000, interrégion Nord, dossier 8 :

Un homme de 55 ans est hospitalisé aux urgences pour une hématémèse survenue 4 heures avant son arrivée. L'interrogatoire trouve une consommation excessive d'alcool depuis plus de 20 ans. Il n'a pas d'autres antécédents. L'examen clinique met en évidence une pression artérielle à 90/50 mmHg, la fréquence cardiaque est à 110/mn. Le patient est pâle, couvert de sueur, il n'a pas d'ictère ; son abdomen est souple, indolore, il n'a pas d'ascite. Il existe une circulation veineuse collatérale, une hépatomégalie dure à bord inférieur tranchant. Le toucher rectal objective un melaena. La conscience est normale, il n'y a pas de flapping.

1) Quelles mesures thérapeutiques d'urgence préconisez-vous ?
2) Compte tenu du contexte, quelles sont les causes d'hémorragie les plus fréquentes à évoquer ?
3) Après stabilisation de l'état hémodynamique, une fibroscopie œso-gastro-duodénale est réalisée. Elle objective une varice œsophagienne en cours de saignement. Que faut-il faire ?
4) En dehors des mesures à visée hémostatique, quelles autres méthodes thérapeutiques doivent être envisagées dès maintenant ?
5) Dans quelles circonstances peut-on être amené à discuter l'indication d'une dérivation porto-cave ?

CONSENSUS

- Prise en charge hémodynamique du sepsis sévère – Conférence de consensus – SRLF, SFAR, 13 octobre 2005. www.srlf.org
- Antibiothérapie probabiliste des états septiques graves – Conférence d'experts – SFAR, SRLF, SPILF, 14 septembre 2004. www.srlf.org
- Coagulations intravasculaires disséminées en réanimation – Conférence de consensus – SRLF, SFAR, SFH, 10 octobre 2002. www.srlf.org

Copyrighted material

POUR COMPRENDRE...

- L'état de choc est un syndrome regroupant les manifestations liées à une altération aiguë et durable de l'oxygénation des tissus du fait d'une inadéquation entre apports et besoins tissulaires en oxygène.
- Le métabolisme cellulaire est ainsi orienté de la voie aérobie vers la voie anaérobie. Il existe alors un défaut de production d'adénosine triphosphate (ATP), principale source énergétique de la cellule. Le cycle de Krebs est donc interrompu et le pyruvate est transformé en lactate.
- Quelle qu'en soit la cause, l'état de choc va être à l'origine d'un dysfonctionnement des différents organes soumis à l'hypoxie :
 - la peau : marbrures cutanées, froideur des téguments, cyanose des extrémités, allongement du temps de recoloration cutanée ;
 - les muscles : rhabdomyolyse ;
 - les reins : insuffisance rénale fonctionnelle puis nécrose tubulaire aiguë ;
 - le foie : foie hypoxique, souvent appelé « foie de choc » ;
 - le cœur : altération de la contractilité (liée à la libération de médiateurs de l'inflammation) et ischémie myocardique (par baisse de la pression artérielle diastolique et diminution de la perfusion coronaire) ;
 - les poumons : syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), par libération de médiateurs de l'inflammation ;
 - le tube digestif : ischémie de l'intestin grêle et/ou du côlon pouvant être responsable d'une migration de bactéries du tube digestif vers le sang (translocation bactérienne) ;
 - le cerveau : troubles neurologiques ;
 - l'endothélium vasculaire : coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).
- Malgré les progrès de la réanimation, la mortalité de l'état de choc reste élevée, de 50 % environ toutes causes confondues.
- La clé du pronostic est un diagnostic rapide et une prise en charge immédiate.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

On distingue 2 types de chocs :

- les chocs liés à une diminution du transport artériel en oxygène (TaO_2) vers les tissus : chocs cardiogénique, hypovolémique et anaphylactique ;
- les chocs liés à une diminution de l'extraction de l'oxygène (EO_2) par les tissus : choc septique.

Ces 2 mécanismes sont volontiers associés entre eux. Ainsi une diminution de l'extraction tissulaire de l'oxygène peut s'observer dans tout état de choc dès lors qu'il se prolonge.

Copyrighted material

A. État de choc hypovolémique

La diminution du volume sanguin est responsable d'une diminution du retour veineux cardiaque. Il en résulte une baisse du débit cardiaque et donc du transport artériel de l'oxygène (TaO_2) vers les tissus.

L'organisme utilise 2 mécanismes pour préserver l'oxygénation des tissus :

- la stimulation sympathique :
 - elle augmente le débit cardiaque (effets chronotrope et inotrope positifs) ;
 - elle entraîne une vasoconstriction qui tend à améliorer le retour veineux et à redistribuer le débit sanguin vers le cerveau et le cœur puisqu'elle se fait sélectivement dans les territoires musculocutané, hépatique et splanchnique ;
- l'augmentation de l'extraction tissulaire de l'oxygène.

Cependant, si l'état de choc se prolonge, l'ischémie des différents tissus entraîne une libération dans la circulation de substances vasodilatatrices et inotropes négatives.

B. État de choc cardiogénique

- L'altération de la fonction cardiaque et donc du débit cardiaque est responsable d'une diminution du transport artériel en oxygène.
- Les mêmes mécanismes compensateurs sont alors mis en jeu (stimulation sympathique et augmentation de l'extraction tissulaire de l'oxygène).
- L'insuffisance cardiaque gauche aiguë entraîne par ailleurs une élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche, une stase sanguine dans la circulation pulmonaire et un œdème pulmonaire aigu, dont la symptomatologie s'ajoute à celle de l'état de choc.

C. État de choc septique

Un constituant du micro-organisme en cause (le mieux connu est l'endotoxine des bacilles à Gram négatif) entraîne une cascade inflammatoire. Cette cascade comporte 3 niveaux interagissant entre eux :

- au niveau plasmatique, le système contact et le système du complément sont activés, entraînant une activation de l'endothélium et de la coagulation. Cet état d'hypercoagulabilité favorise les microthromboses et donc l'ischémie tissulaire, aggravant les dysfonctions d'organe ;
- au niveau vasculaire, la cascade inflammatoire se traduit par la sécrétion de médiateurs, qui favorise le recrutement des phagocytes, par la sécrétion de monoxyde d'azote, qui induit une vasodilatation intense, et par des troubles de la perméabilité capillaire, qui entraînent un œdème interstitiel ;
- au niveau cellulaire, l'activation des macrophages et des polynucléaires conduit à la libération de nombreux médiateurs, dont l'interleukine 1 (IL1) et le *Tumor Necrosis Factor* (TNF), qui amplifient la réaction inflammatoire.

Copyrighted material

Selon l'importance de cette réaction inflammatoire, on définit 4 grands syndromes cliniques pouvant compliquer un processus infectieux *(tableau 200-I)*.

Tableau 200-1. Définition des syndromes septiques.

Réponse inflammatoire systémique (au moins deux des critères suivants)	• Température > 38,3 °C ou < 36 °C • Pouls > 90 bpm • Fréquence respiratoire > 20 cpm • Glycémie > 7,7 mmol/L • Leucocytes : – > 12 000/mm^3 – ou < 4 000/mm^3 – ou > 10 % de formes immatures • Altération des fonctions supérieures • Temps de recoloration capillaire > 2 s • Lactatémie > 2 mmol/L
Sepsis	Réponse inflammatoire systémique + infection présumée ou identifiée
Sepsis sévère	• Sepsis + lactates > 4 mmol/L • Ou hypotension artérielle avant remplissage • Ou dysfonction d'organe (une seule suffit) : – respiratoire : PaO_2/FiO_2 < 300 – rénale : créatininémie > 176 µmol/L – coagulation : INR > 1,5 – hépatique : INR > 4, bilirubine > 78 µmol/L – thrombocytopénie < 105/mm^3 – fonctions supérieures : score de Glasgow < 13
Choc septique	Sepsis grave + hypotension artérielle malgré le remplissage vasculaire

Il en résulte :

- une vasodilatation importante et une hypovolémie relative ;
- la mise en jeu d'un mécanisme compensateur : stimulation sympathique (effets chronotrope et inotrope positifs, vasoconstriction) ;
- une altération possible de la fraction contractile du myocarde, à l'origine d'une insuffisance cardiaque associée ;
- une diminution de l'extraction de l'oxygène par les tissus.

D. État de choc anaphylactique ITEM 211

- Un 1er contact préparant avec l'allergène entraîne la synthèse d'IgE spécifiques qui restent fixées sur la membrane des polynucléaires basophiles circulants et des mastocytes tissulaires. Un nouveau contact (contact déclenchant) produit une dégranulation des basophiles et des mastocytes et la libération d'une importante quantité de médiateurs (allergie de type immédiat – type I de la classification de Gell et Coombs).
- L'histamine est le principal médiateur, ainsi que les leucotriènes, le thromboxane A2 et le *Platelet Activating Factor* (PAF). En se fixant sur les récepteurs H1, l'histamine est responsable des symptômes de l'allergie et notamment d'une intense vasodilatation.

Copyrighted material

■ Il existe des chocs dits « anaphylactoïdes », n'impliquant pas de sensibilisation initiale et dont les mécanismes sont imparfaitement connus.

■ Il en résulte :

– une hypovolémie relative par vasoplégie massive et brutale et extravasation du plasma vers l'interstitium ;

– une mise en jeu des mêmes mécanismes compensateurs : stimulation sympathique (effets inotrope et chronotrope positifs, vasoconstriction) et augmentation de l'extraction tissulaire de l'oxygène.

II. CAUSES

A. De l'état de choc hypovolémique*



■ Hémorragie aiguë : hémorragie digestive ITEM 205, traumatisme grave ITEM 201, chirurgie lourde.

■ Déshydratation extracellulaire : pertes digestives, rénales ou cutanées.

B. De l'état de choc cardiogénique

■ Infarctus du myocarde ITEM 132. D

■ Décompensation aiguë d'une cardiopathie dilatée ITEM 250.

■ Myocardite.

■ Cardiopathie valvulaire : insuffisance aortique aiguë, insuffisance mitrale aiguë, accident de prothèse valvulaire, décompensation aiguë d'une valvulopathie chronique.

■ Contusion myocardique.

■ Insuffisance cardiaque droite aiguë : embolie pulmonaire massive, infarctus du ventricule droit, tamponnade péricardique, pneumothorax compressif.

C. De l'état de choc septique ITEM 104

■ Infection à bacilles Gram négatif : pyélonéphrite, cholécystite, angiocholite, péritonite, pneumopathie nosocomiale.

■ Infection à cocci Gram positif : méningococcie, pneumococcie, cellulite, infection sur cathéter.

■ Infection à bactéries anaérobies : infection des parties molles, cholécystite gangréneuse.

■ Infection fungique : septicémie à *Candida*, aspergillose invasive.

D. De l'état de choc anaphylactique ITEM 211

■ Allergènes protéiques (venin d'hyménoptères, latex, aliments, pollens).

■ Haptènes (anesthésiques, antibiotiques, produits de contraste).

■ Idiopathique.

Copyrighted material

III. DIAGNOSTIC

A. Diagnostic de l'état de choc

0 Le diagnostic d'un état de choc est clinique et comprend 3 types de signes.

1. Hypotension artérielle

Hypotension artérielle = pression artérielle systolique < 90 mmHg ou ≤ 30 % de la pression artérielle de référence.

L'hypotension peut manquer à la phase initiale du fait de la stimulation sympathique. Il faut savoir que la perfusion de la majorité des organes dépend de la pression artérielle moyenne (PAM = 1/3 PAS + 2/3 PAD). La baisse de pression artérielle différentielle (ou pression pulsée, PP = PAS – PAD) témoigne d'un abaissement du volume d'éjection systolique. La baisse de la pression artérielle diastolique, responsable d'un élargissement de la pression artérielle différentielle, témoigne, elle, d'une vasoplégie.

2. Signes témoignant d'une hypoperfusion tissulaire

- Oligurie : diurèse < 0,5 mL/kg/h.
- Marbrures cutanées, froideur des téguments, cyanose des extrémités, allongement du temps de recoloration cutanée.
- Troubles de conscience.

Les signes cutanés sont le reflet d'une vasoconstriction liée à une réaction adrénergique. Ils sont particulièrement intenses dans les chocs avec bas débit cardiaque (choc cardiogénique, choc hypovolémique). Ils sont moins marqués dans les chocs avec vasoplégie (choc septique, choc anaphylactique).

3. Signes témoignant des phénomènes d'adaptation

- Tachycardie.
- Polypnée.
- Sueurs.

B. Diagnostic du retentissement viscéral

0
- **Reins :** insuffisance rénale fonctionnelle puis nécrose tubulaire aiguë ITEM 252.
- **Foie :** foie hypoxique, souvent appelé « foie de choc », avec cytolyse et/ou cholestase.
- **Cœur :** altération de la contractilité (liée à la libération de médiateurs de l'inflammation) et ischémie myocardique (par baisse de la pression artérielle diastolique et diminution de la perfusion coronaire).
- **Poumons :** syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) par libération de médiateurs de l'inflammation.

Copyrighted material

- **Tube digestif :** ischémie de l'intestin grêle et/ou du côlon pouvant être responsable d'une migration de bactéries du tube digestif vers le sang (translocation bactérienne).
- **Cerveau :** troubles neurologiques.
- **Endothélium vasculaire** : CIVD.

C. Diagnostic de la cause

- **Choc hypovolémique :** contexte de déshydratation ou contexte hémorragique, signes biologiques de déshydratation extracellulaire ou anémie. Pression artérielle pincée.
- **Choc cardiogénique :** contexte d'infarctus du myocarde le plus souvent, signes associés d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite. Pression artérielle pincée.
- **Choc septique :** contexte clinique et biologique infectieux (pouvant manquer à la phase initiale). Élargissement de la pression artérielle différentielle.
- **Choc anaphylactique :** contexte d'exposition allergique, signes cutanéomuqueux (érythème, urticaire, œdème de Quincke), respiratoires (bronchospasme, rhinorrhée), gastro-intestinaux (hypersialorrhée, douleurs abdominales, diarrhée).

D. Examens complémentaires

La réalisation d'examens complémentaires n'est pas utile au diagnostic d'état de choc mais peut aider à préciser sa cause, son retentissement et évaluer la réponse à une thérapeutique :

- bilan biologique :
 - ionogramme sanguin et urinaire, protidémie, urée, créatinine ;
 - bilan hépatique complet à la recherche d'un « foie de choc » ;
 - CPK et troponine Ic ;
 - gaz du sang et lactatémie ; 0
 - numération-formule sanguine ;
 - bilan d'hémostase ;
 - CRP, procalcitonine ;
 - hémocultures, examen cytobactériologique des urines et autres prélèvements bactériologiques (ponction lombaire…) ; 0
- radiographie thoracique ; 0
- électrocardiogramme. 0

L'hyperlactatémie est le témoin direct de l'anaérobiose cellulaire. La régression de cette hyperlactatémie est un témoin majeur de réponse favorable au traitement.

Copyrighted material

E. Explorations hémodynamiques

Elles permettent de préciser le mécanisme du choc.

1. Échographie cardiaque

Elle permet la recherche d'une cause cardiaque au choc (par exemple : akinésie segmentaire au cours d'un infarctus du myocarde), la recherche d'une dysfonction contractile pouvant accompagner tout choc, l'évaluation des pressions de remplissage par Doppler. Une évaluation échographique est aujourd'hui quasi-systématique au cours des états de choc.

2. Cathétérisme artériel pulmonaire dit de « Swan-Ganz »

Placé par voie veineuse centrale et monté dans les cavités cardiaques droites puis dans l'artère pulmonaire, il permet la mesure du débit cardiaque, des pressions de remplissage du cœur, et de la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Un prélèvement simultané des gaz du sang au niveau de l'artère pulmonaire et au niveau artériel périphérique permet la mesure de la saturation veineuse en oxygène (SvO_2), de l'extraction tissulaire en oxygène (EO_2) et de la différence artérioveineuse, égale à la différence entre les contenus artériel et veineux en oxygène ($DAV = CaO_2 - CvO_2$). En condition physiologique, l'extraction de l'oxygène est de 25 %, correspondant à une SvO_2 de 75 % si la SaO_2 est normale. Le caractère septique de l'état de choc est apprécié par une SvO_2 anormalement élevée du fait d'une EO_2 et d'une DAV anormalement basses. La SvO_2 est au contraire abaissée dans les états de choc avec bas débit cardiaque. Le *tableau 200-2* résume les caractéristiques hémodynamiques des états de choc. L'utilisation du cathétérisme artériel pulmonaire est aujourd'hui très discutée. Certaines équipes l'utilisent d'emblée au cours des états de choc, d'autres l'utilisent en 2e ligne après échec d'un traitement hémodynamique institué sur les données cliniques et/ou échographiques, d'autres enfin ont définitivement abandonné son utilisation.

Tableau 200-2. Caractéristiques hémodynamiques des états de choc.

	Choc hypovolémique	Choc anaphylactique	Choc cardiogénique	Choc septique
Index cardiaque	↓	↑	↓	↑
Pressions de remplissage du ventricule gauche	↓	↓	↑	↓
Résistances artérielles systémiques	↑	↓	↑	↓
Extraction périphérique en oxygène	↑	↑	↑	↓
SvO_2	↓	↓	↓	↑

Copyrighted material

IV. PRISE EN CHARGE

L'état de choc est une urgence thérapeutique. La rapidité avec laquelle un traitement est mis en place influence indiscutablement le pronostic, l'hypoperfusion prolongée des organes étant à l'origine d'une réponse inflammatoire systémique importante. [0]

A. Mesures générales

- Hospitalisation urgente en réanimation et surveillance continue des paramètres vitaux. [0]
- Pose de voies veineuses périphériques de bon calibre et d'une voie veineuse centrale dès que possible si l'administration d'un traitement vasopresseur puissant est nécessaire. [0]
- Oxygénothérapie ou ventilation mécanique après intubation trachéale en cas d'insuffisance respiratoire et/ou de troubles de conscience. La mise au repos des muscles respiratoires entraîne par ailleurs une économie notable de la consommation en oxygène. [0]
- Pose d'un cathéter artériel périphérique, dès lors qu'une catécholamine est utilisée, afin de mesurer de façon continue la pression artérielle et de permettre la réalisation itérative des prélèvements biologiques.
- Pose d'une sonde urinaire pour surveillance continue de la diurèse.

B. Traitement hémodynamique

1. Moyens disponibles

- Remplissage vasculaire : [0]

 – utile dans tous les cas (sauf choc cardiogénique avec œdème pulmonaire), il doit être débuté le plus rapidement possible. Il fait appel aux cristalloïdes (sérum physiologique) ou aux colloïdes comme les solutés macromoléculaires de type hydroxyéthylamidon (HEA) ;

 – la supériorité des colloïdes sur les cristalloïdes n'est pas démontrée alors qu'ils exposent à des effets secondaires plus fréquents (troubles de l'hémostase avec HEA et dextrans, allergie avec les gélatines, insuffisance rénale avec les HEA) et sont d'un coût plus élevé. Le pouvoir d'expansion volémique plus faible des cristalloïdes par rapport aux colloïdes nécessite cependant des volumes de perfusion environ 3 fois plus importants pour un même résultat volémique ;

 – en première intention, le remplissage vasculaire s'effectue par séquences de 500 mL de sérum physiologique en 15 min. Ces séquences sont souvent répétées jusqu'à obtention d'une PAM satisfaisante ;

 – le remplissage peut également faire appel aux concentrés érythrocytaires en cas de choc hémorragique ou lorsque qu'une anémie est présente au cours des autres types d'état de choc. L'objectif est alors la restauration d'une

Copyrighted material

concentration en hémoglobine de 8 g/dL (ou 10 g/dL chez le coronarien). L'albumine est réservée aux hypoprotidémies ≤ 35 g/dL.

- Catécholamines :

 – la dobutamine est l'agent inotrope de choix en cas de choc cardiogénique : elle est le plus souvent débutée à la posologie de 5 µg. kg^{-1}. min^{-1} IVSE pouvant être augmentée jusqu'à 20 µg. kg^{-1}. min^{-1} ;

 – la dopamine et la noradrénaline sont les traitements utilisés dans le choc septique. Le choix va de préférence à la noradrénaline débutée le plus souvent à 0,2 µg. kg^{-1}. min^{-1} IVSE pouvant être augmentée par palier de 0,1 µg. kg^{-1}. min^{-1} selon le tableau clinique à des posologies parfois supérieures à 5 µg. kg^{-1}. min^{-1}. La dopamine est une alternative initiale possible, ce d'autant qu'elle peut être perfusée sur une voie veineuse périphérique. Elle est le plus souvent débutée à la posologie de 10 µg. kg^{-1}. min^{-1} IVSE pouvant être augmentée jusqu'à 20 µg. kg^{-1}. min^{-1} ;

 – l'adrénaline est le traitement vasopresseur de choix lors du choc anaphylactique ;

 – le *tableau 200-3* résume les effets hémodynamiques des substances vasoactives.

Tableau 200-3. Effets hémodynamiques des substances vasoactives.

	Dobutamine	Adrénaline	Dopamine	Noradrénaline
Fréquence cardiaque	↑	↑↑	↑↑	→
Débit cardiaque	↑	↑↑	↑	→
Pression artérielle	→	↑↑	↑↑	↑↑

2. Objectif hémodynamique

Le premier objectif hémodynamique est la restauration d'une pression artérielle moyenne, qui est la pression de perfusion tissulaire. Cet objectif se situe autour de 60 mmHg, ou plus (70-80 mmHg) chez les patients âgés et/ou hypertendus.

3. Traitement selon la cause

- Choc anaphylactique :

 – adrénaline : 0,1 mg en intraveineux, renouvelable toutes les minutes si le choc persiste, puis en perfusion continue ;

 – remplissage vasculaire par cristalloïdes, compte tenu du risque allergique des colloïdes, notamment des dextrans et des gélatines ;

 – les corticoïdes et les antihistaminiques, d'utilisation fréquente, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.

Copyrighted material

- Choc hypovolémique :

 – remplissage vasculaire, transfusion de concentrés érythrocytaires en cas de choc hémorragique ; [0]

 – dopamine ou noradrénaline si le remplissage est insuffisant.

- Choc septique :

 – remplissage vasculaire ; [0]

 – traitement vasopresseur si le remplissage est insuffisant. L'utilisation de la noradrénaline en première intention est de plus en plus fréquente ; la dopamine est utilisée en première intention en l'absence de voie veineuse centrale. [0]

- Choc cardiogénique :

 – dobutamine ;

 – traitement vasopresseur en association si une hypotension artérielle persiste ;

 – en cas d'insuffisance cardiaque droite, le remplissage vasculaire est la première mesure thérapeutique.

C. Traitement de la cause

Il doit être entrepris simultanément au traitement symptomatique : [0]

- **choc anaphylactique :** éviction de l'allergène ;
- **choc hémorragique :** hémostase (par chirurgie, artériographie, traitement endoscopique) ;
- **choc cardiogénique :** revascularisation par angioplastie d'un infarctus du myocarde, chirurgie réparatrice en cas de valvulopathie aiguë, drainage d'une tamponnade ou d'un pneumothorax compressif, thrombolyse d'une embolie pulmonaire ; [0]
- **choc septique :**

 – traitement antibiotique, débuté immédiatement après la réalisation rapide des prélèvements microbiologiques. Dans le cas du purpura fulminans, l'administration de ceftriaxone est entreprise immédiatement. En l'absence d'orientation diagnostique initiale, on choisit une antibiothérapie parentérale, probabiliste, par association synergique bactéricide (lors d'une infection communautaire, par exemple : céphalosporine de 3^{e} génération associée à un aminoside et à un traitement antianaérobie par métronidazole) ; [0] [0]

 – administration de protéine C activée recombinante humaine dès lors que le choc septique associe plus de deux défaillances d'organes et en l'absence de contre-indication (risque hémorragique). Ses propriétés anticoagulantes, antithrombotiques et profibrinolytiques répondent point par point aux désordres de l'hémostase engendrés par le sepsis ;

 – l'administration intraveineuse de faibles doses d'hydrocortisone (200 mg/j) permet de raccourcir la durée du choc, un sevrage plus rapide en catéchola-

Copyrighted material

mines et réduit significativement la mortalité du choc septique chez les patients chez qui une insuffisance surrénalienne relative a été objectivée par une diminution de la réponse cortisolique après un test au *Synacthène*.

D. Traitement des complications viscérales

- **Ventilation mécanique** dite « protectrice » en cas de SDRA (limitation du volume courant et des pressions d'insufflation).
- **Hémodialyse** intermittente ou hémofiltration continue en cas d'insuffisance rénale.
- **Transfusion** de concentrés plaquettaires et de plasma viro-inactivé en cas de CIVD associée à un syndrome hémorragique. (Voir Conférence de consensus sur la prise en charge de la CIVD.)
- **Résection digestive** d'une ischémie mésentérique.


E. Surveillance initiale

Elle repose sur la surveillance rapprochée de la pression artérielle et sur l'appréciation des perfusions régionales par :

- **l'examen clinique :** état neurologique, état cutané, diurèse ;
- **la biologie :** lactatémie, fonction rénale, bilan hépatique, hémostase.

CONSENSUS

Prise en charge hémodynamique du sepsis sévère
SRLF, SFAR, 2005



Copyrighted material

CONSENSUS

CIVD en réanimation
SRLF, SFAR, SPILF, 2002



Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

État de choc

L'état de choc est un syndrome regroupant les manifestations liées à une altération de l'oxygénation tissulaire.

Le diagnostic d'un état de choc est clinique et repose sur :

- une hypotension artérielle (PAS < 90 mmg) ;
- des signes et symptômes attestant d'une dysfonction d'organe : oligurie (diurèse < 0,5 mL/kg/h), marbrures cutanées, froideur des téguments, cyanose des extrémités, allongement du temps de recoloration cutanée, troubles de conscience ;
- des signes témoignant des phénomènes d'adaptation : tachycardie, polypnée, sueurs.

Les examens complémentaires contribuent à apprécier le retentissement viscéral :

- insuffisance rénale fonctionnelle puis nécrose tubulaire aiguë ;
- foie hypoxique (« foie de choc ») ;
- altération de la contractilité cardiaque et ischémie myocardique ;
- SDRA ;
- ischémie de l'intestin grêle et/ou du côlon ;
- troubles neurologiques ;
- CIVD.

L'état de choc est une urgence thérapeutique [0] :

- **traitement symptomatique** :
 - voies veineuses périphériques et voie veineuse centrale dès que possible si l'administration d'un traitement vasopresseur puissant est nécessaire ;
 - oxygénothérapie ou ventilation mécanique après intubation trachéale en cas d'insuffisance respiratoire et/ou de troubles de conscience ;
 - pose d'un cathéter artériel périphérique, dès lors qu'une catécholamine est utilisée ;
 - traitement hémodynamique :
 - remplissage vasculaire [0] : cristalloïdes (sérum physiologique) et/ou colloïdes (HEA). Concentré érythrocytaire en cas de choc hémorragique ou d'anémie associée [0] (objectif : restauration d'une concentration en hémoglobine de 8 g/dL, ou 10 g/dL chez le coronarien) ;
 - catécholamines : dobutamine en cas de choc cardiogénique ; noradrénaline en cas de choc septique (la dopamine est une alternative initiale possible) ; adrénaline en cas de choc anaphylactique ;
 - objectif hémodynamique : restauration d'une pression artérielle moyenne autour de 60 mmHg [0], ou plus chez les patients âgés et/ou hypertendus ;
 - traitement selon la cause :
 - choc anaphylactique : adrénaline, 0,1 mg en intraveineux, renouvelable toutes les minutes si le choc persiste, puis en perfusion continue ; remplissage vasculaire par cristalloïdes ;
 - choc hypovolémique : remplissage vasculaire, transfusion de concentrés érythrocytaires en cas de choc hémorragique ou lors de tout choc accompagné d'une anémie ; dopamine ou noradrénaline si le remplissage est insuffisant ;
 - choc septique : remplissage vasculaire [0] ; noradrénaline ou dopamine ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

• choc cardiogénique : dobutamine ; traitement vasopresseur en association si une hypotension artérielle persiste. En cas d'insuffisance cardiaque droite, le remplissage vasculaire est la première mesure thérapeutique ;

■ **traitement de la cause** 0 (il doit être entrepris simultanément au traitement symptomatique) :

– choc anaphylactique : éviction de l'allergène ;

– choc hémorragique : hémostase ;

– choc cardiogénique : revascularisation par angioplastie d'un infarctus du myocarde 0, drainage d'une tamponnade ou d'un pneumothorax compressif, thrombolyse d'une embolie pulmonaire ;

– choc septique : traitement antibiotique débuté immédiatement après la réalisation rapide des prélèvements microbiologiques 0 ; administration de protéine C activée recombinante humaine dès lors que le choc septique associe plus de deux défaillances d'organe ; administration intraveineuse de faibles doses d'hydrocortisone (200 mg/j) si insuffisance surrénalienne relative ;

■ **traitement des complications viscérales** :

– ventilation mécanique dite « protectrice » en cas de SDRA ;

– hémodialyse en cas d'insuffisance rénale ;

– transfusion de concentrés plaquettaires et de plasma viro-inactivé en cas de CIVD ;

– résection digestive d'une ischémie mésentérique ;

■ **surveillance initiale** = surveillance rapprochée de la pression artérielle et appréciation des perfusions régionales par :

– **examen clinique :** état neurologique, état cutané, diurèse ;

– **biologie :** lactatémie 0, fonction rénale, bilan hépatique, hémostase.

Copyrighted material

Copyrighted material

ITEM 211

Œdème de Quincke et anaphylaxie

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer un œdème de Quincke et une anaphylaxie.
- Prise en charge immédiate.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 113 Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et l'adulte : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement.

ITEM 114 Allergies cutanéomuqueuses chez l'enfant et l'adulte. Urticaire, dermatites atopiques et de contact.

ITEM 115 Allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte.

ITEM 200 État de choc.

CONSENSUS

- Prévention du risque allergique peranesthésique – Recommandations pour la pratique clinique – SFAR, 2001. www.sfar.org

POUR COMPRENDRE...

■ L'anaphylaxie regroupe les manifestations cliniques les plus graves de la réaction d'hypersensibilité immédiate. L'urticaire (atteinte dermique) et l'œdème de Quincke ou angio-œdème (atteinte hypodermique) en sont les présentations les plus courantes, le choc anaphylactique en est la présentation la plus sévère.

■ On estime le nombre de réactions anaphylactiques sévères à 50-100 par million d'habitants en France, avec un taux de mortalité de 0,5 %. Les médicaments constituent la première cause d'accident anaphylactique (les bêtalactamines étant la première cause hospitalière, les curares la première cause peropératoire) et les aliments la seconde. Dans 10 à 20 % des cas, aucune cause n'est retrouvée.

Copyrighted material

- Dans ses formes sévères, l'anaphylaxie est une urgence vitale dont le traitement repose sur l'adrénaline. Une rechute survenant dans 20 % des cas dans les 24 premières heures, une hospitalisation pour surveillance est toujours justifiée.
- L'éducation des personnes est une mesure préventive indispensable.

I. PHYSIOPATHOLOGIE ITEM 113

- L'anaphylaxie est liée à une réaction d'hypersensibilité immédiate (du type I de la classification de Gel et Coombs). Lors d'un premier contact avec l'allergène (contact préparant), des immunoglobulines de type E (IgE) sont synthétisées par les lymphocytes B et se fixent par leur fragment Fc à des récepteurs membranaires des polynucléaires basophiles circulants et des mastocytes tissulaires. Cette étape est cliniquement asymptomatique.
- Après un intervalle libre nécessaire à la production de ces IgE, une réexposition à l'allergène (contact déclenchant) produit une dégranulation basophile et mastocytaire avec libération de nombreux médiateurs, au premier rang desquels l'histamine, mais également des facteurs chimiotactiques, des neutrophiles et éosinophiles, de la tryptase et d'autres enzymes, des leucotriènes, des prostaglandines, des facteurs d'activation plaquettaire (PAF), du thromboxane…
- La stimulation des récepteurs H1 par l'histamine est responsable d'une bronchoconstriction, d'une vasodilatation et d'une augmentation de la perméabilité capillaire, responsable d'une extravasation du plasma vers l'interstitium. La plupart des autres médiateurs libérés participent directement ou non à ces 3 phénomènes.
- Il existe des manifestations anaphylactoïdes au cours desquelles il existe une activation des mastocytes et basophiles et une histaminolibération non spécifique, c'est-à-dire non médiée par les IgE, mais soit liée à une action toxique directe de la substance sur la membrane basomastocytaire, soit liée à une activation mastocytaire par des facteurs du complément. Dans ce cas, la sensibilisation préalable n'est pas nécessaire. La symptomatologie clinique est comparable, bien que généralement moins sévère du fait d'une dégranulation moins massive.

II. CAUSES

Dans 10 à 20 % des cas, aucune cause n'est retrouvée. Lorsque la cause est identifiée, elle est médicamenteuse dans 50 % des cas, alimentaire dans 25 % des cas, venimeuse dans 25 % des cas.

On distingue les allergènes protéiques, polysaccharidiques et les haptènes.

Copyrighted material

A. Allergènes protéiques

- Venins d'hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes, frelons).
- Nombreux aliments : arachides et autres fruits secs, moutarde, crustacés et poissons, lait, sésame, œufs, fruits (fraises, bananes, avocats, kiwis) et légumes.
- Certains vaccins (anatoxines et vaccins préparés sur œuf).
- Sérum d'origine animale.
- Certaines hormones (insuline, ACTH), certaines enzymes (streptokinase, chymotrypsine).
- Pollens.
- Latex : il existe une sensibilisation croisée avec les bananes, les châtaignes, les avocats, les kiwis.

B. Allergènes polysaccharidiques

- Dextrans.
- Hydroxyéthylamidons.

C. Haptènes

Ce sont de petites molécules se liant à une protéine porteuse et la rendant immunogène :

- antibiotiques (bêtalactamines notamment, sulfamides) ;
- anti-inflammatoires non stéroïdiens ;
- anesthésiques généraux ;
- myorelaxants (responsables de 70 % des accidents anaphylactiques peropératoires) ;
- produits de contraste iodés ;
- vitamines (thiamine, acide folique) ;
- antiseptique (chlorhexidine).

L'effort est une cause d'anaphylaxie. Il s'agit en fait en fait d'une anaphylaxie alimentaire se manifestant lors d'un effort physique.

III. DIAGNOSTIC

A. Diagnostic clinique

La symptomatologie clinique est variable, des formes les plus bénignes (conjonctivite, rhinite, érythème isolés) aux formes les plus graves (œdème de Quincke, asthme aigu grave, choc anaphylactique). Les signes cutanéomuqueux sont les plus fréquents, et orientent souvent le diagnostic face aux autres manifestations (respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinales), surtout lorsqu'ils apparaissent dans les **suites immédiates** d'une exposition à une substance. Les signes cutanéomuqueux peuvent manquer s'il existe d'emblée un

Copyrighted material

état de choc et n'apparaîtront que secondairement lors de la restauration hémodynamique.

1. Signes cutanéomuqueux ITEM 114

- Conjonctivite (hyperhémie conjonctivale, larmoiement).
- Rhinite (rhinorrhée, sensation d'obstruction nasale).
- Urticaire (atteinte dermique) : papules ou plaques érythémateuses, parfois plus claires en leur centre, prurigineuses, évoluant par poussées, d'apparition brutale et de résolution rapide, d'abord localisées à la face, au cou et à la région antérieure du thorax, secondairement généralisées.
- Œdème de Quincke (atteinte hypodermique) : tuméfaction non érythémateuse, non prurigineuse mais responsable d'une sensation de tension touchant essentiellement la face et ses muqueuses (lèvres, langue, palais, pharynx, épiglotte, larynx). L'œdème laryngé est alors responsable d'une dyspnée inspiratoire avec cornage et stridor.

2. Signes respiratoires ITEM 115

- Toux.
- Dyspnée inspiratoire en rapport avec un œdème laryngé.
- Dyspnée expiratoire en rapport avec un bronchospasme pouvant réaliser un asthme aigu grave.
- Œdème pulmonaire lésionnel rare.

3. Signes cardiovasculaires ITEM 200

- État de choc lié à une hypovolémie relative (vasoplégie massive et brutale et extravasation du plasma vers l'interstitium). Il existe au départ une stimulation sympathique compensatrice avec effets inotrope et chronotrope positifs mais la pérennisation du choc est responsable d'une libération dans la circulation de substances inotropes négatives, transformant un choc initialement hyperkinétique (haut débit cardiaque) en choc hypokinétique (bas débit cardiaque).
- Une atteinte myocardique directe de l'anaphylaxie est évoquée notamment au cours des accidents anesthésiques.
- Si l'état de choc n'est pas rapidement traité, un syndrome de défaillance multiviscérale s'installe.

4. Signes gastro-intestinaux

- Nausées et vomissements.
- Douleurs abdominales.
- Diarrhée parfois hémorragique.

Copyrighted material

B. Examens complémentaires

1. Bilan biologique

Il dépend de la gravité du tableau clinique. Dans les tableaux les plus graves, il associe :

- ionogramme sanguin et urinaire, urée, créatinine ;
- bilan hépatique complet ;
- CPK et troponine Ic ;
- gaz du sang et lactatémie ;
- numération et formule sanguine ;
- bilan d'hémostase ;
- CRP ;
- hémocultures, examen cytobactériologique des urines ± autres prélèvements bactériologiques.

2. Autres examens complémentaires

- Radiographie thoracique.
- Électrocardiogramme.

3. Bilan allergologique

Le diagnostic du mécanisme de la réaction sera fondé sur un bilan allergologique immédiat ; le diagnostic de l'agent responsable sera porté à la suite d'un bilan allergologique secondaire.

a) Bilan allergologique immédiat

Il repose sur le dosage de l'histamine et surtout de la tryptase plasmatique :

- histamine plasmatique (sur plasma, tube EDTA) : l'histaminolibération s'accompagne d'un pic en 5 minutes et d'une décroissance progressive en 1 heure. La mise en évidence de cette histaminolibération ne présage pas de son mécanisme anaphylactique ou anaphylactoïde. La méthyl-histamine, principal métabolite de l'histamine, peut être détectée dans les 24 premières heures suivant l'épisode mais ce dosage n'est pas assez spécifique pour être recommandé ;
- tryptase sérique (sur sérum, tube sec) : pic 1 heure après la survenue de choc puis diminution progressive en 10 heures. Son dosage est particulièrement intéressant car du fait d'une demi-vie longue, la tryptase est plus facilement détectable que l'histamine, et une augmentation franche est en faveur du mécanisme anaphylactique ;
- IgE spécifiques (sur sérum, tube sec) : les IgE spécifiques de certains allergènes (venins, latex, antibiotiques) sont dosables par technique radio-immunologique (*radio-allergo-sorbent test* : RAST).

Copyrighted material

b) Bilan allergologique secondaire

Il se fait, au moins un mois après l'épisode aigu, au cours d'une consultation allergologique, où un interrogatoire précis est réalisé, permettant d'orienter les investigations :

- les tests cutanés épidermiques *(prick-tests)*, intradermiques, ou par contact *(patch-tests)* sont toujours réalisés en première intention ;
- le dosage des IgE spécifiques sériques est proposé si le bilan cutané est négatif et l'histoire clinique évocatrice d'une cause particulière ;
- un test de provocation labial et/ou oral à l'aliment suspecté peut être proposé si le bilan est négatif, le plus souvent alors en hospitalisation. Ce test comporte en effet un risque de récidive grave pour le patient. Son indication est donc discutable et doit être bien pesée dans les suites d'un accident anaphylactique grave.

C. Diagnostic différentiel

1. Des manifestations anaphylactiques

- Accident anaphylactoïde : lié à une histaminolibération non médiée par les IgE. Les causes les plus fréquentes sont alimentaires (poisson cru, tomate, fraise, vin blanc, crustacé) ou médicamenteuses (vancomycine).
- Œdème angioneurotique : déficit familial autosomique dominant quantitatif (type I) ou qualitatif (type II) en inhibiteur de la C1 estérase (C1Inh), ou maladie acquise liée à une consommation en C1Inh (type I : cancer solide, lymphome, certaines infections) ou à un auto-anticorps anti-C1Inh (type II : maladie auto-immune). Il se manifeste par un angio-œdème touchant la muqueuse respiratoire (dyspnée), digestive (douleurs abdominales) et urinaire (rétention aiguë d'urines), survenant spontanément ou après un stress, un traumatisme, une chirurgie, des menstruations, une grossesse, un accouchement, une prise médicamenteuse (œstroprogestatifs). Le dosage du complément montre une diminution de la fraction C4 (fractions C1q et C3 normales), associée à une altération qualitative ou quantitative du C1Inh. Les crises sévères justifient d'un traitement par concentré en C1Inh. Le traitement de fond en cas de crise fréquente et/ou grave ou avant toute intervention repose sur le *Danazol*.
- Syndrome carcinoïde.

2. Des manifestations respiratoires

- Crise d'asthme.
- Laryngite.
- Épiglottite.
- Inhalation d'un corps étranger.

3. Du choc anaphylactique

- Choc septique.

Copyrighted material

- Choc hémorragique.
- Choc cardiogénique.

IV. PRISE EN CHARGE

C'est une urgence thérapeutique comprenant notamment l'administration d'adrénaline en cas de choc ou d'œdème de Quincke. La rapidité avec laquelle un traitement est mis en place influence indiscutablement le pronostic des formes graves. 0

A. Mesures générales 0

- Éviction de l'allergène.
- Hospitalisation indispensable, les rechutes étant possibles 24 heures après l'épisode initial. 0

B. En cas de choc anaphylactique ITEM 200

- Étendre le patient en décubitus dorsal et lui surélever les jambes à 90°.
- Assurer la liberté des voies aériennes.
- Oxygénothérapie au masque à haute concentration. L'intubation est rarement nécessaire compte tenu de la réversibilité rapide des symptômes après traitement.
- Mise en place d'une voie veineuse périphérique ne devant pas retarder l'administration d'adrénaline. 0
- Adrénaline :
 - elle s'oppose point par point aux effets systémiques induits par la libération des différents médiateurs : bronchodilatatrice (effet bêta-2), vasoconstrictrice (effet alpha), inotrope positive (effet bêta-1) et inhibe la dégranulation basophile et mastocytaire. Elle est indiquée dès que le patient est hypotendu ;
 - par voie IM d'abord en l'absence de voie veineuse : 0,5 mg (0,01 mg/kg chez l'enfant), renouvelable après quelques minutes selon l'évolution de la pression artérielle ; 0
 - par voie IV : bolus de 0,1 mg renouvelable toutes les minutes en fonction de l'évolution de la pression artérielle, puis perfusion continue si l'hypotension est persistante. Un monitorage cardiovasculaire est indispensable car l'adrénaline peut s'accompagner d'hypertension artérielle, de troubles du rythme.
- Chez la femme enceinte, l'éphédrine (bolus de 10 mg) serait préférable à l'adrénaline, en diminuant le risque d'effondrement du débit utéroplacentaire.
- Remplissage vasculaire : par cristalloïde compte tenu du risque allergique des colloïdes et notamment des dextrans et des gélatines. 0
- Les corticoïdes et les antihistaminiques H1 (± H2) n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en cas de choc. Leur utilisation, fréquente cependant, ne se justi-

Copyrighted material

fie qu'en raison du risque d'évolution prolongée des manifestations anaphylactiques.

C. En cas de bronchospasme

Bronchodilatateurs : aérosols bêta-2-mimétiques.

D. En cas d'œdème de Quincke

- Oxygénothérapie au masque à haute concentration. L'intubation est rarement nécessaire compte tenu de la réversibilité rapide des symptômes après traitement.
- Mise en place d'une voie veineuse périphérique ne devant pas retarder l'administration d'adrénaline.
- Adrénaline :
 – par voie IM d'abord, en l'absence de voie veineuse : 0,5 mg (0,01 mg/kg chez l'enfant) ;
 – par voie IV : bolus de 0,1 mg. Un monitorage cardiovasculaire est indispensable car l'adrénaline peut s'accompagner d'hypertension artérielle, de troubles du rythme.

E. Prévention

- Le patient est informé du diagnostic d'anaphylaxie, du produit suspecté d'en avoir été responsable, du risque vital en cas de réexposition et de la nécessité de pratiquer un bilan allergologique 4 semaines plus tard.
- Une liste de médicaments ou d'aliments susceptibles de contenir l'agent causal doit être remise au patient.
- Chez les patients ayant eu une manifestation sévère, une prescription d'adrénaline en seringue prête à l'emploi (*Anahelp* ou *Anapen*) est faite et les modalités d'administration sont expliquées : injection sur la face antérolatérale de la cuisse en cas de malaise, de gêne pour avaler, de gêne pour parler, de sensation d'asphyxie.

0

- En cas d'allergie médicamenteuse, un certificat médical signalant la sensibilisation et son niveau de sévérité doit être remis au patient.
- En cas d'allergie par venin d'abeille ou de guêpe, le traitement repose sur la désensibilisation spécifique et est indiqué si la manifestation anaphylactique a été sévère et si le bilan cutané ou biologique est positif.
- Enfin, chez le sujet à risque de choc anaphylactique, le remplacement d'un éventuel traitement bêtabloquant, parce qu'il diminue la réponse à l'adrénaline, doit être discuté.

Copyrighted material

CONSENSUS

Prise en charge d'un choc anaphylactique peranesthésique
SFAR, 2001

Signes cliniques

- **Grade I :** signes cutanéomuqueux généralisés (érythème, urticaire avec ou sans œdème angioneurotique).
- **Grade II :** atteinte multiviscérale modérée (signes cutanéomuqueux, hypotension, tachycardie, hyperréactivité bronchique).
- **Grade III :** atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie ; collapsus, tachycardie ou bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme. Les signes cutanés peuvent être absents ou n'apparaître qu'après la remontée tensionnelle.
- **Grade IV :** arrêt circulatoire et/ou respiratoire.

Traitement

- Arrêt si possible de l'injection du produit suspecté.
- Information de l'équipe chirurgicale (abstention, simplification, accélération ou arrêt du geste chirurgical).
- Oxygène pur, voie veineuse efficace, contrôle rapide des voies aériennes.
- **Adrénaline IV** par titration, toutes les 1 à 2 min, en fonction du grade :
 - grade I : pas d'adrénaline ;
 - **grade II** : bolus de 10 à 20 µg ;
 - **grade III :** bolus de 100 à 200 µg. ***La tachycardie ne contre-indique pas l'utilisation d'adrénaline.***
 - **grade IV** (arrêt circulatoire) :
 - massage cardiaque externe ;
 - **adrénaline :** bolus de 1 mg toutes les 1 à 2 minutes puis 5 mg à partir de la 3e injection, à renouveler ;
 - **relais par l'adrénaline en perfusion continue : 0,05 à 0,1 µg. kg^{-1}. min^{-1}.**
- **Remplissage vasculaire concomitant :** cristalloïdes isotoniques (30 mL. kg^{-1}) puis amidons (30 mL. kg^{-1}).

Cas particuliers

- **Bronchospasme** :
 - **salbutamol** *(Ventoline)* ;
 - si résistance ou si forme d'emblée sévère : **salbutamol** IV, bolus de 100 et 200 µg, puis perfusion continue (5 à 25 µg. min^{-1}) ;
 - formes les plus graves : perfusion continue d'adrénaline ;
 - les corticoïdes ne représentent pas le traitement de première intention.
- **Femme enceinte** :
 - **éphédrine : 10 mg IVD toutes les 1 à 2 minutes** (dose totale : 0,7 mg. kg^{-1}) **et décubitus latéral gauche** ;
 - **si inefficacité de l'éphédrine, donner rapidement de l'adrénaline.**
- **Patient traité par bêtabloquants** :
 - augmenter la posologie d'adrénaline ;
 - si inefficacité de l'adrénaline : **glucagon**, 1 à 2 mg IVD à renouveler toutes les 5 minutes ;
 - collapsus cardiovasculaire réfractaire à l'adrénaline : **noradrénaline**, 0,1 µg. kg^{-1}. min^{-1}.

Copyrighted material

Investigations allergologiques

- **Prélèvements immédiats** :
 - **quoi ?** Dosage histamine, tryptase et IgE spécifiques (curares, latex, thiopental) ;
 - **quand ?** 30 à 60 minutes après la réaction ;
 - **comment ?** 1 tube sec et 1 tube EDTA au laboratoire dans les 2 h ou stockage à 4 °C pendant 12 h au maximum.
- **Tests cutanés secondaires** :
 - **quand ?** 4 à 6 semaines après ;
 - **où ?** Centre diagnostique d'allergoanesthésie ;
 - **documents à joindre** : résultats des prélèvements immédiats, feuille d'anesthésie ;
 - **déclaration au centre régional de pharmacovigilance.**

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Œdème de Quincke et anaphylaxie

L'anaphylaxie est une réaction d'hypersensibilité immédiate : après un intervalle libre, la réexposition à un allergène produit une dégranulation basomastocytaire avec libération de nombreux médiateurs (histamine ++), responsables :

– d'une bronchoconstriction ;
– d'une vasodilatation ;
– d'une augmentation de la perméabilité capillaire.

Causes :

- dans 10 à 20 % des cas, aucune cause n'est retrouvée ;
- lorsque la cause est identifiée, elle est :
 – médicamenteuse dans 50 % des cas (antibiotiques, AINS, anesthésiques généraux, myorelaxants) ;
 – alimentaire dans 25 % des cas (arachides, crustacés, poissons, fruits) ;
 – venimeuse dans 25 % des cas (venins d'hyménoptères).

Signes :

- les signes cutanéomuqueux orientent vers la cause anaphylactique 0 :
 – conjonctivite, rhinite ;
 – urticaire ;
 – œdème de Quincke (atteinte hypodermique) : tuméfaction non érythémateuse, non prurigineuse, responsable d'une sensation de tension touchant essentiellement la face et ses muqueuses ;
- signes respiratoires :
 – toux ;
 – dyspnée inspiratoire (œdème laryngé) 0 ;
 – dyspnée expiratoire (bronchospasme) ;
 – œdème pulmonaire lésionnel ;
- signes cardiovasculaires : état de choc 0 ;
- signes gastro-intestinaux :
 – nausées et vomissements ;
 – douleurs abdominales ;
 – diarrhée parfois hémorragique.

L'œdème angioneurotique, déficit quantitatif ou qualitatif familial autosomique dominant en inhibiteur de la C1 estérase (C1Inh), ou consommation acquise en C1Inh (cancer solide, lymphome, infections, maladies auto-immunes), est le diagnostic différentiel principal.

Bilan :

- bilan allergologique immédiat :
 – histamine plasmatique : pic en 5 minutes, décroissance progressive en 1 heure. Ne distingue pas les mécanismes anaphylactiques ou anaphylactoïdes ;
 – tryptase sérique : pic en 1 heure, diminution progressive en 10 heures. Une augmentation franche est en faveur du mécanisme anaphylactique ;
 – IgE spécifiques : pour certains allergènes (venins, latex, antibiotiques) ;
- bilan allergologique secondaire (au moins un mois après l'épisode aigu) :
 – tests cutanés en première intention ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– IgE spécifiques si bilan cutané négatif ;

– test de provocation labial et/ou oral discuté si le bilan est négatif ;

– dosage du complément pour le diagnostic d'œdème angioneurotique ;

– diminution de la fraction C4, fractions C1q et C3 normales, altération qualitative ou quantitative du C1Inh.

Prise en charge :

- urgence thérapeutique 0 ;
- éviction de l'allergène ;
- hospitalisation (rechutes fréquentes 24 heures après l'épisode initial) 0 ;
- **en cas de choc anaphylactique :**
 – patient étendu en décubitus dorsal, jambes surélevées ;
 – assurer la liberté des voies aériennes ;
 – oxygénothérapie au masque à haute concentration ; l'intubation est rarement nécessaire (réversibilité rapide des symptômes après traitement) ;
 – pose d'une voie veineuse (ne doit pas retarder l'administration d'adrénaline) 0 ;
 – adrénaline (indiquée dès que le patient est hypotendu) : par voie IM en l'absence de voie veineuse 0 (0,5 mg), ou par voie IV (bolus de 0,1 mg renouvelable toutes les minutes) ;
 – monitorage cardiovasculaire (risque d'HTA, de troubles du rythme) ;
 – remplissage vasculaire : par cristalloïde 0 (risque allergique des colloïdes) ;
 – les corticoïdes et les antihistaminiques H1 (± H2) n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en cas de choc. Leur utilisation, fréquente cependant, ne se justifie qu'en raison du risque d'évolution prolongée des manifestations anaphylactiques ;
- **en cas de bronchospasme :** bronchodilatateurs (aérosols bêta-2-mimétiques) ;
- **en cas d'œdème de Quincke :**
 – oxygénothérapie au masque à haute concentration ;
 – pose d'une voie veineuse (ne doit pas retarder l'administration d'adrénaline) 0 ;
 – adrénaline (voir *supra*) ;
- **prévention :**
 – patient informé du diagnostic d'anaphylaxie, du produit suspecté, du risque vital, de la nécessité de pratiquer un bilan allergologique à 1 mois 0 ;
 – liste de médicaments ou d'aliments suspectés remise au patient ;
 – si manifestation sévère : prescription d'adrénaline en seringue prête à l'emploi (injection sur la face antérolatérale de la cuisse en cas de malaise, de gêne pour avaler, de gêne pour parler, de sensation d'asphyxie) 0 ;
 – si allergie médicamenteuse : certificat médical (sensibilisation, sévérité) ;
 – si allergie par venin (abeille ou guêpe) : désensibilisation spécifique possible ;
 – remplacement d'un éventuel traitement bêtabloquant chez sujet à risque.

Copyrighted material

ITEM 214

Principales intoxications aiguës

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer une intoxication par les psychotropes, les médicaments cardiotropes, le CO, l'alcool.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 44 Risque suicidaire de l'enfant et de l'adulte : identification et prise en charge.

ITEM 193 Détresse respiratoire aiguë.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 230 Coma non traumatique.

CONSENSUS



- Intoxications graves – Recommandations d'experts – SRLF, octobre 2006. www. srlf.org
- Intoxication aiguë à la chloroquine – Conférence de consensus – SRLF, 13 novembre 1987. www.srlf.org
- Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées – Recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 18 mars 2005. www.santé.gouv.fr

POUR COMPRENDRE...

- L'intoxication est un motif fréquent d'admission aux urgences et en réanimation dont la mortalité globale est faible, inférieure à 1 %, pouvant cependant atteindre 10 % pour certains toxiques cardiotropes.
- La tentative de suicide est la cause d'intoxication la plus fréquente chez l'adulte (90 %). Elle est le plus souvent liée à la prise de psychotropes (85 %) et est souvent polymédicamenteuse.
- L'intoxication accidentelle domestique est la cause la plus fréquente chez l'enfant (95 %).

Copyrighted material

■ L'altération de la conscience est le symptôme le plus fréquent mais la gravité est plus souvent liée à :

– l'atteinte cardiovasculaire, lors de l'exposition à un traitement vasoplégiant et/ou inotrope négatif et/ou responsable de troubles conductifs ou rythmiques ;

– l'atteinte respiratoire lorsque le coma se complique d'une pneumopathie d'inhalation ;

– la rhabdomyolyse et ses conséquences (insuffisance rénale, hyperkaliémie) lorsque le coma a entraîné une immobilisation prolongée.

■ Comme dans tout bilan de coma, la recherche immédiate d'une hypoglycémie par la réalisation d'une glycémie capillaire est indispensable. Une cause toxique au coma ne doit pas faire exclure une autre origine, traumatique notamment.

■ L'intoxication médicamenteuse volontaire justifie dans tous les cas une hospitalisation même si aucun signe de gravité n'est retenu car :

– la symptomatologie peut être retardée ;

– une évaluation psychiatrique du risque de récidive est indispensable.

■ L'intoxication oxycarbonée est une intoxication grave, responsable de centaines de décès par an en Europe et aux États-Unis. Sa fréquence reste élevée du fait de l'utilisation de moyens de chauffage vétustes ou mal utilisés et du calfeutrage des habitations. À côté du risque de décès au cours de l'intoxication aiguë, les risques de séquelles neurologiques à long terme doivent être connus.

I. DIAGNOSTIC

L'anamnèse est l'élément principal du diagnostic. L'analyse toxicologique est rarement utile lorsque l'enquête anamnestique a pu être bien conduite.

A. Anamnèse

Elle doit permettre de déterminer :

■ les circonstances de l'intoxication :

– la tentative de suicide : intoxication la plus fréquente chez l'adulte (femmes notamment), le plus souvent liée à l'ingestion de médicaments faisant partie du traitement de l'intoxiqué et/ou de son entourage ;

– l'intoxication accidentelle domestique : intoxication la plus fréquente chez l'enfant. Chez l'adulte, elle est le plus souvent due à un produit ménager déconditionné ;

– l'intoxication professionnelle : souvent liée à une erreur de manipulation d'un toxique connu ;

– l'overdose : diagnostiquée chez un toxicomane connu, elle doit faire rechercher des traces d'injection cutanée ;

– le surdosage médicamenteux involontaire : chez les enfants et les personnes âgées ;

Copyrighted material

– enfin, très rarement l'intoxication peut être criminelle : l'analyse toxicologique a alors un intérêt médicolégal ;

- l'ensemble des substances ingérées, injectées ou inhalées, les intoxications étant le plus souvent polymédicamenteuses ;
- la dose supposée à laquelle le patient est exposé pour chacune des substances ;
- les modalités d'administration ;
- l'heure de la prise et donc le délai entre l'intoxication et la prise en charge.

B. Symptômes

1. Température

- Hypothermie chez un patient comateux exposé accidentellement au froid (intoxication alcoolique ou par psychotrope).
- Hyperthermie liée au toxique lui-même (neuroleptique, médicament atropinique, cocaïne, amphétamine, ecstasy, syndrome sérotoninergique) ou à une pneumopathie d'inhalation.

2. Symptômes neurologiques

Ce sont les plus fréquents, 85 % des intoxications médicamenteuses étant liées à la prise de psychotropes : ITEM 230

- coma plus ou moins profond, sans autres signes de localisation, réversible (la présence de signes de localisation ou l'absence de réveil complet doivent conduire à la réalisation d'une imagerie cérébrale). On distingue :
 – le coma calme : benzodiazépines et assimilés, barbituriques, carbamates, phénothiazines sédatives, opiacés, phénytoïne, valproate de sodium ;
 – le coma agité : antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques, butyrophénones et phénothiazines pipérazinées, médicaments hypoglycémiants ;
- autres signes neurologiques d'orientation :
 – hypotonie (benzodiazépines, barbituriques, carbamates) ;
 – hypertonie pyramidale (antidépresseurs, monoxyde de carbone, hypoglycémie) ou extrapyramidale (phénothiazines pipérazinées) ;
 – crises convulsives ou comitialité infraclinique : antidépresseurs tricycliques, phénothiazines, lithium, carbamazépine, théophylline, dextropropoxyphène, cocaïne, amphétamines, médicaments hypoglycémiants ;
 – myoclonies : antidépresseurs tricycliques, lithium, inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine ;
 – myosis serré : opiacés ;
 – mydriase peu réactive : antidépresseurs tricycliques et autres médicaments ayant des propriétés atropiniques, cocaïne, amphétamines, inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine ;

Copyrighted material

– hallucinations : antihistaminiques, médicaments atropiniques, cannabis, LSD.

3. Symptômes respiratoires ITEM 193

■ L'hypoventilation d'origine centrale (bradypnée, acidose respiratoire) doit être particulièrement recherchée car elle peut conduire à l'arrêt respiratoire.

■ Les signes respiratoires sont sinon liés à une atélectasie chez un patient immobilisé longtemps au sol ou à une pneumopathie d'inhalation.

4. Symptômes cardiovasculaires

On observe schématiquement ITEM 200 :

■ une vasoplégie ;

■ et/ou une dépression myocardique ;

■ et/ou des troubles du rythme ou de la conduction.

5. Signes cutanés

Lésions de compression par immobilisation prolongée faisant craindre une rhabdomyolyse, traces d'injection intraveineuse.

C. Examens biologiques

Ils orientent le diagnostic et permettent d'évaluer les complications :

■ hypoglycémie : insuline et hypoglycémiants oraux, alcool ;

■ hypokaliémie : chloroquine et théophylline ;

■ hyperkaliémie : digitaliques ;

■ trou osmolaire : se mesure par la différence entre l'osmolarité mesurée au laboratoire par l'abaissement cryoscopique et l'osmolarité calculée. Cette différence est normalement inférieure à 10 mOsm. l^{-1}. Un trou osmolaire élevé indique la présence dans le plasma d'une molécule osmotiquement active non dosée : intoxication par alcool éthylique, éthylène glycol (antigel) ou méthanol ;

■ créatine phosphokinase (CPK) : rhabdomyolyse liée à une immobilisation prolongée ;

■ insuffisance rénale : fonctionnelle (déshydratation) ou organique par nécrose tubulaire (état de choc, rhabdomyolyse). Certains toxiques ont une néphrotoxicité directe (métaux lourds…) ;

■ hépatite cytolytique : intoxications par paracétamol ou lors d'un syndrome phalloïdien.

■ Osmolarité calculée = 2 × [Na^+]+[Urée]+[Glucose]

■ Trou osmolaire = osmolarité mesurée – osmolarité calculée

Copyrighted material

D. Électrocardiogramme

Sa réalisation doit être systématique *(tableau 214-1)*.

Tableau 214-1. Anomalies électriques observées au cours des intoxications.

Anomalie électrique	Toxidrome ou traitement responsable
Tachycardie	Syndrome atropinique, syndrome adrénergique
Bradycardie	Traitement bêtabloquant, traitement inhibiteur calcique, effet stabilisant de membrane, syndrome opioïde
Troubles du rythme ventriculaire	Syndrome adrénergique, traitement digitalique, effet stabilisant de membrane
Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire	Traitement digitalique, effet stabilisant de membrane
Troubles de la conduction intraventriculaire	Effet stabilisant de membrane
Élargissement de l'intervalle QT et torsades de pointe	*Cordarone*, effet stabilisant de membrane

E. Examens radiologiques

- Radiographie thoracique : indispensable, à la recherche d'une pneumopathie d'inhalation ou d'une atélectasie.
- Abdomen sans préparation chez un patient suspect d'être un *body-packer*, pour recherche d'emballages de produits toxiques : cocaïne le plus souvent transportée sous forme de boulettes dans le tube digestif et dont la fissuration expose au risque d'intoxication aiguë très sévère.
- Scanner cérébral : dès lors que le contexte toxicologique n'est pas bien établi ou que le réveil est retardé.

F. Toxidrome

Le diagnostic de l'intoxication repose essentiellement sur la mise en évidence d'un toxidrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes cliniques, biologiques et/ou électrocardiographiques évoquant une pathologie toxique :

- **syndrome de myorelaxation :** coma calme, hypotonique, hyporéflexique, sans signe de localisation, ± dépression respiratoire (benzodiazépines et apparentés, barbituriques, carbamates, certaines phénothiazines, alcool) ;
- **syndrome atropinique :** syndrome confusionnel, hallucinations, dysarthrie, tremblements, agitation, mydriase peu réactive, tachycardie sinusale, rétention aiguë d'urine, douleurs abdominales, constipation, soif et sécheresse cutanéo-muqueuse (antidépresseurs tricycliques, phénothiazines et butyrophénones, quinidine, atropine, antihistaminiques, antiparkinsoniens, datura) ;
- **effet quinidine-*like* ou effet stabilisant de membrane :** association de troubles de la conduction intraventriculaire et de troubles hémodynamiques liés à un blocage du flux sodique entrant. Cet effet concerne toutes les cellules excitables pour lesquelles le potentiel d'action joue un rôle important, au premier

Copyrighted material

rang desquelles la cellule myocardique (effet chronotrope, inotrope, dromotrope et bathmotrope négatif) et la cellule musculaire lisse vasculaire (vasoplégie) : antiarythmiques de classe I, certains bêtabloquants, antidépresseurs tricycliques, chloroquine et quinine, dextropropoxyphène, phénothiazines, carbamazépine, cocaïne ;

- **syndrome adrénergique :** hyperthermie, agitation, convulsions, hypertension, ischémie myocardique, tachycardie, hyperglycémie, hypokaliémie, hyperleucocytose (théophylline, amphétamines, cocaïne, LSD, éphédrine) ;
- **syndrome sérotoninergique :** hyperthermie, agitation ou coma, hallucinations, myoclonies, hyperréflexie, mydriase, hypersudation, frissons, tremblements, diarrhée (IMAO, ISRS, lithium, tricycliques, ecstasy) ;
- **syndrome d'hyperthermie maligne :** hyperthermie > 40 °C, hypertonie, rhabdomyolyse (neuroleptiques, anesthésiques halogénés, ecstasy) ;
- **syndrome opioïde :** trouble de la vigilance, bradypnée et apnées, myosis serré bilatéral, nausées, vomissements, iléus, prurit, bradycardie, hypotension (opiacés).

G. Tests diagnostiques et/ou thérapeutiques : antidotes

- **Naloxone** *(Narcan)* : 0,1 mg IV toutes les 2 à 3 min jusqu'à obtention d'une ventilation spontanée efficace, lors d'une intoxication par morphinique. Son seul effet secondaire est une levée brutale de l'analgésie chez un patient traité par morphinique ou un réveil explosif avec un risque de fuite chez le patient toxicomane.
- **Flumazénil** *(Anexate)* : 0,3 mg IV en 1 minute, suivi de doses additionnelles de 0,1 mg jusqu'à une dose cumulative de 2 mg, lors d'une intoxication par benzodiazépines. Son effet secondaire principal est le risque de convulsions chez le patient épileptique ou en cas d'intoxication polymédicamenteuse.

H. Électroencéphalogramme

Il doit être réalisé s'il existe une prise de substances abaissant le seuil de comitialité (antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques), à la recherche d'une comitialité infraclinique. S'il existe des convulsions, l'EEG ne servira qu'à évaluer l'efficacité du traitement antiépileptique lorsque ces convulsions auront disparu (persistance d'une comitialité infraclinique ?).

I. Analyse toxicologique

- Elle n'a pas d'intérêt dans un contexte toxique évident car :
 - elle est souvent qualitative, ne permettant pas de distinguer un taux thérapeutique d'un surdosage ;
 - l'immunoanalyse manque souvent de spécificité et/ou de sensibilité ;
 - elle peut être gênée par les médicaments sédatifs administrés lors de la mise sous ventilation mécanique (benzodiazépines, morphiniques).

Copyrighted material

■ Son intérêt peut être médicolégal ou thérapeutique lorsque le taux du médicament retrouvé conditionne la prise en charge (paracétamol, digitaliques, lithium).

■ Elle est réalisée par immunodosage (paracétamol, phénobarbital, acide valproïque, carbamazépine, digitaliques, lithium, salicylés, phénytoïne, théophylline, chromatographie (carbamate, méthanol, éthylène glycol) ou électrode sélective (lithium). Elle doit de toute façon être ciblée par le clinicien en fonction de l'anamnèse et des symptômes. Elle doit être effectuée préférentiellement dans le sang, l'analyse urinaire pouvant donner des informations complémentaires sur une consommation réalisée dans les 48 dernières heures ou en cas de toxique dont l'élimination sanguine est rapide.

■ Une attitude pragmatique consiste à réaliser une plasmathèque et une urothèque à l'admission, qui peuvent être ultérieurement utilisées si l'évolution n'est pas celle attendue ou si émerge un contexte médicolégal. Des méthodes séparatives complémentaires plus longues et coûteuses pourront être discutées secondairement dans les cas difficiles, qui sont rares cependant.

II. INTOXICATION PAR PSYCHOTROPES

A. Benzodiazépines

■ Intoxication la plus fréquente en France, mais dont le pronostic est favorable.

■ Souvent potentialisée par l'ingestion concomitante d'alcool.

■ La durée du tableau clinique est variable d'un produit à l'autre (demi-vie : 3-70 heures).

■ Coma calme et hypotonique ; la dépression respiratoire est rare mais possible (sujet âgé ou insuffisant respiratoire chronique).

■ En plus du traitement symptomatique, le traitement antidotique par flumazénil *(Anexate)* est possible sauf maladie épileptique ou prise concomitante d'un médicament épileptogène. Son action rapide mais brève consiste en une fixation compétitive sur les récepteurs ; son utilisation est essentiellement diagnostique, son utilisation à titre thérapeutique en administration continue pour traiter un coma et/ou une hypoventilation alvéolaire étant plus discutable et imposant une surveillance en unité de surveillance continue, l'alternative étant alors la mise sous ventilation mécanique après intubation. [0]

B. Antidépresseurs tricycliques

■ Intoxication devenue rare du fait de la prescription plus large aujourd'hui des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

■ Coma agité, signes d'irritation pyramidale, comitialité, syndrome atropinique.

■ La gravité est liée à l'atteinte cardiovasculaire : effet « quinidine-*like* ». [0]

Copyrighted material

■ Traitement symptomatique : la gravité cardiovasculaire potentielle justifie une prise en charge en réanimation et une décontamination digestive si elle peut être pratiquée tôt (3 heures après l'ingestion) ; les troubles conductifs peuvent bénéficier de l'administration de lactate ou de bicarbonates de sodium molaire intraveineux : 100 à 250 mL jusqu'à une dose totale de 750 mL, avec surveillance de la kaliémie, la correction du QRS et de l'hypotension étant les critères d'efficacité.

C. Barbituriques

■ Coma calme hypotonique parfois profond, dépression respiratoire, hypothermie, rhabdomyolyse.

■ Le risque prolongé de coma et d'arrêt respiratoire d'apparition brutale (barbituriques d'action rapide) justifie une prise en charge en réanimation. L'EEG peut montrer des épisodes de silence électrique mimant le diagnostic de mort encéphalique.

D. Carbamate

■ Coma calme hypotonique.

■ Le risque cardiovasculaire par vasoplégie et/ou effet inotrope négatif justifie une prise en charge en réanimation.

E. Lithium

On distingue 3 circonstances : l'intoxication aiguë en l'absence de traitement antérieur, l'intoxication aiguë du sujet préalablement traité et le surdosage du sujet traité lié à une déshydratation.

■ Manifestations neurologiques : agitation ou coma, tremblement et myoclonies, convulsions.

■ Insuffisance rénale fonctionnelle, diabète insipide néphrogénique et tubulopathie distale lors d'un traitement chronique.

■ La lithémie peut être très élevée en l'absence de signes cliniques chez le sujet intoxiqué sans traitement préalable ou peu élevée en présence de manifestations sévères chez un sujet préalablement traité et donc « imprégné » ; dans ce cas, le dosage de la lithémie érythrocytaire peut avoir un intérêt.

■ Le risque neurologique chez un sujet préalablement traité justifie une prise en charge en réanimation.

■ Le traitement repose sur l'hydratation abondante par sérum salé isotonique. L'épuration extra-rénale est réservée aux manifestations neurologiques graves (coma, convulsion), notamment chez les patients préalablement traités pour lesquels l'hydratation n'assure pas une clairance rénale suffisante du lithium.

F. Neuroleptiques

Ils appartiennent à des classes hétérogènes et sont donc responsables de tableaux variables : coma calme hypotonique (neuroleptiques sédatifs) ou

Copyrighted material

coma agité avec hypertonie extrapyramidale (butyrophénones et phénothiazines pipérazinées). Les troubles conductifs sont possibles. Ils peuvent être responsables d'un syndrome malin des neuroleptiques : hyperthermie > 40 °C, hypertonie extrapyramidale, rhabdomyolyse.

III. INTOXICATION PAR CARDIOTROPES

Les traitements cardiotropes peuvent être responsables :

- d'une atteinte myocardique systolique par effet inotrope négatif (inhibiteurs calciques, bêtabloquants, bloqueurs sodiques) ;
- plus rarement d'une atteinte diastolique (digitaliques), de troubles de la conduction, de troubles du rythme.

A. Digitaliques

Deux produits peuvent être en cause : la digitoxine, liposoluble, absorbée rapidement et complètement par le tube digestif, métabolisée par le foie et éliminée par la bile, de demi-vie longue, de 3 à 9 jours, et la digoxine, d'absorption digestive moins complète, d'élimination rénale, de demi-vie de 36 à 48 heures.

- Troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales).
- Signes neurosensoriels (troubles de la vigilance, dyschromatopsie, vision floue, scotomes).
- Signes cardiovasculaires faisant la gravité (troubles de la conduction, troubles du rythme à l'étage ventriculaire).
- Dans les formes graves, insuffisance rénale et hyperkaliémie.
- L'analyse toxicologique confirme le diagnostic.
- Le traitement est symptomatique, la gravité cardiovasculaire potentielle justifie une décontamination digestive si elle peut être pratiquée tôt.
- Le traitement antidotique par fragment FAB d'anticorps antidigitaliques *(Digidot)* est possible dans les formes graves, permettant d'éviter dans ces cas le recours à l'entraînement électrosystolique.

CONSENSUS

Intoxications graves
Recommandations d'experts 2006

- Neutralisation équimolaire si un seul des facteurs suivants est présent : arythmie ventriculaire, bradycardie < 40 bpm résistante à l'administration de 1 mg d'atropine, kaliémie > 5,5 mmol/L, choc cardiogénique, infarctus mésentérique.
- Neutralisation semi-molaire en présence d'au moins 3 des facteurs suivants : sexe masculin, cardiopathie préexistante, âge > 55 ans, BAV, bradycardie < 50 bpm et résistante à 1 mg d'atropine, kaliémie > 4,5 mmol/L.

Copyrighted material

B. Chloroquine

■ Troubles de la conscience, signes neurosensoriels (flou visuel, acouphènes, vertiges), convulsions, signes digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée). La gravité est liée à l'effet stabilisant de membrane.

■ Le traitement repose sur une conférence de consensus ancienne qui n'a pas été remise en question par la dernière conférence d'experts déterminant le traitement en fonction de la dose supposée ingérée (DSI), la pression artérielle systolique (PAS) et la durée du QRS.

CONSENSUS

Intoxication à la chloroquine
SRLF, 1987

Intoxication bénigne	Intoxication intermédiaire	Intoxication grave
• DSI < 2 g, et • PAS > 100 mmHg, et • QRS < 0,10	• 2 g < DSI < 4 g, et • PAS > 100 mmHg, et • QRS < 0,10	• DSI > 4 g, et/ou • PAS < 100 mmHg, et/ou • QRS > 0,10
Pas de traitement	**Diazépam** : 0,5 mg/kg IVSE en 30 min puis 1 mg/kg/24 h IVSE	• **Remplissage** : 500 à 1 000 mL • **Adrénaline** : 0,25 µg/kg/min à augmenter par paliers de 0,25 µg/kg/min pour PAS > 100 • **Diazépam** : 2 mg/kg sur 30 min puis 2 à 4 mg/kg/24 h • **Intubation trachéale**

C. Bêtabloquants

■ Chronotropes, inotropes, dromotropes et bathmotropes négatifs ; effet stabilisant de membrane pour certains bêtabloquants ; allongement du QT pour le sotalol.

■ Troubles digestifs, respiratoires (bronchospasme), neurologiques (confusion, hallucination).

■ En association au traitement hémodynamique, le glucagon peut être utilisé précocement : bolus de 5 ou 10 mg puis perfusion continue de 1 à 5 mg/h mais il ne doit pas constituer à lui seul le traitement des complications hémodynamiques de l'intoxication par bêtabloquant.

D. Inhibiteurs calciques

■ Inotropes négatifs et/ou vasoplégiants.

■ Traitement antidotique par insuline-glucose en complément d'autres thérapeutiques : bolus de 10 UI d'insuline, suivi de la perfusion continue avec surveillance horaire de la glycémie et régulière de la kaliémie.

Copyrighted material

IV. INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

L'intoxication par le monoxyde de carbone (CO), souvent accidentelle et très rarement volontaire, est la première cause de mortalité par intoxication dans le monde et est encore fréquente en France : 5 000 à 8 000 cas par an, dont 2 500 hospitalisations et 400 décès.

A. Physiopathologie

- Le CO est un gaz inodore, incolore, insipide, non irritant ni suffocant, responsable d'une intoxication souvent insidieuse ; c'est le produit de la combustion incomplète des hydrocarbures.
- Le CO se fixe aux hémoprotéines, en premier lieu l'hémoglobine (responsable de la formation de carboxyhémoglobine, HbCO), mais aussi la myoglobine, notamment myocardique, la cytochrome c-oxydase de la chaîne respiratoire, l'hydroperoxydase et le cytochrome P450.
- Chez le sujet normal, le taux d'HbCO est de 1 à 3 %, il peut atteindre 15 % chez le fumeur.
- Le mécanisme physiopathologique majeur est l'hypoxie liée essentiellement à un défaut de transport de l'oxygène, le CO ayant une affinité pour l'hémoglobine 240 fois supérieure à l'oxygène.
- L'administration d'oxygène permet d'accélérer la dissociation de l'HbCO. La demi-vie de l'HbCO est de 360 minutes en air ambiant, 90 minutes en oxygène pur normobare et 20 minutes en oxygénothérapie hyperbare à 2,5 ATA.

B. Causes

- Intoxication accidentelle dans 95 % des cas, souvent alors domestique, collective et hivernale (appareil de chauffage et de production d'eau chaude défectueux) ; les fumées d'incendie représentent également une cause d'intoxication au CO, souvent associée à une intoxication cyanhydrique par combustion de matières synthétiques.
- Intoxication volontaire dans 5 % des cas (exposition aux gaz d'échappement d'un véhicule automobile).

C. Symptômes immédiats

- Neurologiques : céphalées, vertiges, perte de connaissance, altération des fonctions cognitives, troubles de la conscience jusqu'au coma, syndrome pyramidal, comitialité.
- Digestifs : nausées, vomissements, diarrhée plus rarement.
- Cardiovasculaires : syndrome coronarien aigu, hypotension artérielle.

- Dans le contexte d'exposition aux fumées d'incendie, un état de choc doit faire suspecter une intoxication cyanhydrique associée. [0]

Copyrighted material

■ Respiratoires : œdème pulmonaire cardiogénique (par atteinte myocardique) ou œdème pulmonaire lésionnel (par toxicité pulmonaire directe), pneumopathie d'inhalation.

■ Cutanéomuqueux : classique teinte cochenille de la peau, en fait rare.

D. Symptômes à distance

■ Syndrome postintervallaire : signes neuropsychiatriques 7 à 21 jours après l'intoxication et après une récupération apparente. La récupération est possible dans 50 à 75 % des cas.

■ Syndrome séquellaire : persistance des signes neuropsychiatriques initiaux.

E. Bilan biologique

■ Carboxyhémoglobine (HbCO) : taux habituel de 1 à 3 %, jusqu'à 15 % chez le fumeur. L'intoxication est donc suspectée si la carboxyhémoglobine est > 10 %, et certaine si elle est > 15 %. La symptomatologie, qui devrait théoriquement être corrélée au taux d'HbCO, l'est peu en pratique du fait de la durée de la prise en charge pré-hospitalière, de la pratique précoce d'une oxygénothérapie à la phase pré-hospitalière, de la possibilité d'une co-intoxication cyanhydrique. Les troubles neurologiques sont généralement associés à des taux > 25 %. L'intoxication est potentiellement mortelle au-delà de 60 %. L'oxygénothérapie mise en route par les premiers secours est cependant susceptible de faire diminuer le taux d'HbCO et un dosage bas à l'arrivée à l'hôpital n'est plus interprétable.

■ PaO_2 : elle est habituellement normale à la phase initiale.

■ SaO_2 : mesurée par un appareil pourvu d'un CO-oxymètre, elle est diminuée. Les appareils à gaz du sang non pourvus de CO-oxymètre mesurent la PaO_2 et en déduisent une SaO_2 à partir d'abaques, qui sera alors faussement normale.

■ SpO_2 : l'oxymètre de pouls ne distingue pas l'HbCO de l'HbO_2. La SpO_2 est donc faussement normale.

■ Lactates sanguins : l'hyperlactatémie est le reflet de l'hypoxie tissulaire liée au CO. Dans le cadre d'une exposition aux fumées d'incendie, une lactatémie > 10 mmol. L^{-1} doit faire suspecter une intoxication cyanhydrique associée.

F. Traitement

C'est une urgence médicale.

0 ■ Traitement symptomatique : soustraire la victime à l'ambiance toxique, prise en charge symptomatique d'un coma, d'un état de choc, d'une détresse respiratoire.

■ Traitement spécifique : dans tous les cas, oxygénothérapie à haut débit (8 à
0 12 L/min) le plus précocement possible ; l'oxygénothérapie hyperbare est discutée en cas de perte de connaissance initiale ou de troubles neurologiques
0 persistants et semble indiscutable chez la femme enceinte, quel que soit le

Copyrighted material

terme (le CO diffuse à travers la barrière fœtoplacentaire et l'hémoglobine fœtale a une affinité supérieure à l'hémoglobine de l'adulte pour le CO).

■ Traitement d'une intoxication cyanhydrique par hydroxocobalamine (vitamine B12), 5 g IV : traitement antidotique administré systématiquement sur les lieux de la prise en charge en cas d'exposition aux fumées d'incendie en présence de troubles de la conscience ou de troubles hémodynamiques, renouvelable une fois en l'absence de réponse.

■ À distance, le risque de récidives et les complications secondaires neuropsychiques imposent d'établir un suivi de ces victimes. Pour éviter les récidives, il sera important d'identifier la cause de l'intoxication :

– tentative de suicide (entretien psychiatrique), incendie (recours aux services sociaux) ;

– intoxication professionnelle (certificat initial des lésions, déclaration d'accident du travail) ;

– intoxication domestique (identification et correction de la cause organisée par la DDASS avant retour à domicile).

■ Concernant le suivi médical, les victimes et leur médecin traitant doivent également être informés du risque de manifestations neurologiques secondaires, en ayant conscience que l'information peut également influencer chez certains patients une pathologie subjective.

■ Il faut conseiller un avis spécialisé en cas d'apparition de manifestations neurologiques.

■ Les femmes enceintes doivent bénéficier d'un examen obstétrical avec une échographie vérifiant la vitalité fœtale. Un suivi obstétrical et échographique rapproché et orienté s'impose jusqu'à l'accouchement. Le gynécologue obstétricien, le pédiatre et le médecin traitant doivent être prévenus de la possibilité de séquelles chez le nouveau-né.

CONSENSUS

Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées : prise en charge d'un patient intoxiqué au CO
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 18 mars 2005

Évaluation

■ Signes vitaux : condition cardiorespiratoire.
■ État neurologique :
– conscience ;
– réponse motrice à la stimulation ;
– réflectivité.
■ Examen clinique :
– recherche de complications (ECG, radiographie du thorax…) ;
– recherche d'un traumatisme ou d'une intoxication associés ;

▶

Copyrighted material

– recherche d'une maladie sous-jacente.

- Examen de laboratoire :
 – carboxyhémoglobine ;
 – gaz du sang si nécessaire.

Diagnostic

- Circonstances de l'intoxication.
- Tableau clinique compatible.
- Carboxyhémoglobinémie élevée (à interpréter en fonction de l'âge, du terrain, des habitudes tabagiques, du délai entre dosage et éviction, de l'administration d'oxygène).
- Optionnel : dosage de CO dans l'air expiré et dosage de CO dans l'atmosphère.

Traitement

- Mesures thérapeutiques en urgence :
 – éviction immédiate de l'atmosphère toxique ;
 – réanimation cardiorespiratoire si nécessaire ;
 – oxygène par masque nasal ou ventilation contrôlée ;
 – arrêter la source de CO, aérer le local, rechercher d'autres victimes
- Traitement symptomatique, selon l'état du patient :
 – ventilation contrôlée avec $FiO_2 = 1$;
 – remplissage vasculaire ;
 – drogue inotrope si nécessaire.
- Oxygénothérapie :
 – oxygénothérapie hyperbare : contacter un centre hyperbare si le patient présente une symptomatologie patente (coma, perte de connaissance, signes cliniques objectifs) ou s'il s'agit d'une femme enceinte ;
 – oxygénothérapie normobare dans les autres cas au masque à haute concentration, à fort débit (12 à 15 L/min chez l'adulte pendant 12 h).

Prévention de la récidive

- Éducation du patient et de son entourage vis-à-vis des risques liés au CO.
- Enquête technique sur place

Tableau 214-2. Organisation du suivi

Objectifs	Moyens	Risques
Lutter contre la récidive	Informer le patient et/ou sa famille du risque de récidive	Récidive
	Obtenir son consentement éclairé à une enquête technique par le service santé-environnement de la DDASS	Violation du secret médical
	Alerter le service santé-environnement de la DDASS	Risque médico-légal
Diagnostiquer les complications secondaires	Lettre au médecin traitant	Ne pas rapporter à l'intoxication les troubles secondaires
	Inciter le patient à consulter en cas de troubles	Mauvaise évaluation de la morbidité
		Risque médico-légal
Reconnaître l'incapacité de travail	Prescription d'un arrêt de travail	Méconnaître l'inaptitude fonctionnelle au travail
	Rédiger le certificat initial des lésions (si accident de travail)	Risque médico-légal
Faire un ECG de contrôle en cas d'anomalie initiale et chez les patients avec antécédents cardiovasculaires	Suivi ECG	Méconnaître l'anomalie éventuelle ou son aggravation

Copyrighted material

V. INTOXICATION ALCOOLIQUE AIGUË (IAE)

■ Intoxication la plus fréquente, elle est souvent banalisée.

■ Elle expose cependant à de nombreux pièges (traumatisme associé, intoxication médicamenteuse associée, hypoglycémie associée), dont la méconnaissance peut s'avérer dramatique. Toute intoxication éthylique aiguë impose un examen médical complet et un bilan paraclinique simple. 0

■ Le décès lié directement à l'absorption d'éthanol est rare : les alcoolémies sont alors généralement supérieures à 5 g/L. La mort est le plus souvent le fait d'une complication (hypoventilation alvéolaire, pneumopathie d'inhalation).

A. Physiopathologie

■ L'éthanol est absorbé par diffusion passive au niveau gastrique (30 %) et surtout au niveau duodénojéjunal (70 %). Absorbé à jeun, la concentration maximale est atteinte en environ 30 minutes. L'ingestion de nourriture ralentit la vidange gastrique et ainsi retarde et abaisse le pic plasmatique (atteint en 1 h environ). Après avoir atteint ce pic, le taux d'alcoolémie décroît, de 0,10 g/L/h à 0,20 g/L/h.

■ Quelle que soit la boisson alcoolisée, un « verre » représente à peu près la même quantité d'alcool : 1 « demi » de bière (25 cL) = 0,15 g, 1 pastis (5 cL) = 0,14 g, 1 verre de vin (12 cL) = 0,25 g, 1 coupe de champagne (8 cL) = 0,15 g.

■ L'élimination de l'éthanol est essentiellement métabolique (95 %), les 5 % restants étant éliminés sous forme inchangée par l'air expiré, l'urine, la sueur et le lait maternel.

■ Le métabolisme de l'éthanol est essentiellement hépatique (90 %) :

– plusieurs systèmes enzymatiques participent d'abord à l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde :

• la voie principale de l'alcool déshydrogénase (plusieurs isoenzymes expliquent les variations cinétiques individuelles) ;

• le système microsomial d'oxydation (MEOS) inductible par l'alcool ;

• la voie de la catalase qui est accessoire, sauf chez l'alcoolique chronique ;

– l'acétaldéhyde est ensuite oxydé en acétate par l'acétaldéhyde déshydrogénase en présence de NAD. Cette enzyme est polymorphe, un déficit conduit à l'accumulation d'acétaldéhyde et au syndrome de flushing ;

– l'acétate est en partie transformé dans le foie en acétyl-coenzyme A, qui peut soit entrer dans le cycle de Krebs (production d'ATP), soit être utilisé pour la synthèse des lipides.

B. Diagnostic positif et diagnostic de gravité

■ On distingue deux tableaux cliniques :

– l'ivresse simple, avec trois phases :

Copyrighted material

• phase d'excitation psychomotrice (désinhibition, euphorie, atteintes cognitives) ;

• phase d'incoordination (troubles de la vigilance, syndrome cérébelleux, troubles de la vision, syndrome vestibulaire, troubles vasomoteurs) ;

• coma profond sans signe de localisation neurologique ;

– l'ivresse pathologique : tableau prolongé, polymorphe (ivresse excitomotrice, hallucinatoire, délirante, avec troubles de l'humeur), souvent récidivant, marqué par une dangerosité potentielle majeure, survenant à l'occasion d'une absorption massive d'alcool ou d'alcoolisation peu importante chez des sujets à risque.

■ La réalisation d'une alcoolémie doit être systématique ; il n'existe pas de parallélisme entre le tableau clinique et l'alcoolémie. Cependant une alcoolémie ≥ 3-4 g/L engage le pronostic vital.

■ La gravité est déterminée selon quatre tableaux :

– intoxication avec manifestations psychiatriques liées à l'intoxication : troubles du comportement avec ivresse excitomotrice, troubles psychosensoriels avec ivresse hallucinatoire, troubles délirants, troubles de l'humeur ;

– intoxication avec complications : neurologiques (coma et crises comitiales, accident vasculaire cérébral), respiratoires (pneumopathie d'inhalation, hypoventilation, arrêt respiratoire), circulatoires (vasoplégie, arythmie, syndrome coronarien), métaboliques (hypoglycémie, acidocétose, trou osmolaire, hyponatrémie chez les buveurs de bière), digestives (Mallory-Weiss, hépatite alcoolique aiguë), musculaires (rhabdomyolyse ± insuffisance rénale aiguë et hyperkaliémie) ;

– intoxication avec pathologie associée : traumatisme, autre intoxication (psychotrope) ;

– intoxication chez l'enfant.

■ La gravité conditionne la prise en charge : hospitalisation en milieu spécialisé si coma, pneumonie d'inhalation, crises convulsives, traumatisme crânien, enfant. Les autres IAE sont hospitalisées à l'unité de courte durée.

C. Traitement

■ Une surveillance simple est en général suffisante.

■ Le traitement est essentiellement symptomatique.

■ L'épuration extra-rénale est exceptionnellement discutée dans les intoxications les plus massives (alcoolémie > 6 g/L).

■ L'autorisation de sortie est une décision médicale fondée sur la disparition des complications somatiques et la permanence des fonctions relationnelles.

Copyrighted material

VI. INTOXICATION PAR ANTALGIQUES

A. Intoxication au paracétamol

■ À dose thérapeutique, 90 % du paracétamol est métabolisé par le foie en dérivés glycuro et sulfoconjugués éliminés dans les urines. Les 10 % restants sont métabolisés par le cytochrome P450 en N-acétyl-p-benzoquinonéimine (NAPQI), métabolite toxique inactivé par conjugaison avec le glutathion réduit.

■ En cas de surdosage (> 125 mg/kg), la voie métabolique principale étant saturée, les réserves de glutathion étant épuisées, le paracétamol est transformé en NAPQI, entraînant une lyse hépatocellulaire et un risque d'hépatite fulminante (insuffisance hépatique aiguë compliquée d'encéphalopathie).

■ La paracétamolémie est le meilleur indicateur de gravité, réalisée au moins 4 heures après l'ingestion et interprétée sur le normogramme de Rumack et Matthew : il faut cependant savoir que le seuil de toxicité du paracétamol est abaissé en cas de réduction de la réserve en glutathion (alcoolisme chronique, malnutrition, prises répétées de paracétamol), de traitements inducteurs enzymatiques du cytochrome P450 (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, isoniazide, rifampicine), de traitement entrant en compétition avec la glycuroconjugaison du paracétamol (triméthoprime-sulfaméthoxazole, zidovudine).

■ Si la date d'ingestion n'est pas connue, 2 dosages réalisés à 4 heures d'intervalle permettent d'établir la demi-vie du paracétamol, qui est augmentée en cas d'intoxication. Une hépatite est probable quand la demi-vie dépasse 4 heures.

■ Le traitement repose sur :

– l'évacuation gastrique précoce par lavage gastrique et ingestion de charbon activé ;

– la N-acétylcystéine, précurseur du glutathion, justifiée si la dose ingérée est > 125 mg/kg ou si elle n'est pas connue. La paracétamolémie permet ensuite de décider de la poursuite du traitement :

• 150 mg/kg en 1 heure, puis 50 mg/kg en 4 heures, puis 100 mg/kg en 16 heures. En cas d'hépatite cytolytique, ce traitement est poursuivi à la dose de 300 mg/24 h jusqu'à guérison ;

• en l'absence de vomissements ou d'utilisation de charbon activé, la voie orale peut être utilisée : 140 mg/kg puis 70 mg/kg toutes les 4 heures pendant 72 heures ;

• la N-acétylcystéine peut être responsable d'une réaction anaphylactoïde.

■ Le transfert vers une unité de greffe hépatique est indiqué dès qu'il existe des signes d'encéphalopathie et/ou que le TP est < 40 %. 0

Copyrighted material

B. Intoxication aux salicylés

- Elle est peu fréquente et rarement grave. La dose toxique est de 10 g chez l'adulte.
- Cliniquement, elle peut entraîner :
 - des troubles neurosensoriels (acouphènes, hypoacousie, sensation vertigineuse, céphalées) ;
 - des troubles neurologiques dans les intoxications massives (coma et convulsions) ;
 - des troubles digestifs (épigastralgies, nausées, vomissements, rarement hémorragie digestive) ;
 - des troubles respiratoires (hyperventilation alvéolaire puis hypoventilation alvéolaire dans les formes graves) ;
 - une hyperthermie ;
 - des troubles acidobasiques (alcalose respiratoire puis acidose métabolique avec hyperlactatémie puis acidose mixte dans les formes les plus graves).
- Le diagnostic repose sur la salicylémie.
- Le traitement repose sur :
 - l'évacuation gastrique précoce par lavage gastrique et ingestion répétée de charbon activé ;
 - l'alcalinisation des urines, qui est proposée dans les intoxications graves pour augmenter la clairance urinaire des salicylés ;
 - l'épuration extra-rénale, qui concerne les intoxications massives.

C. Intoxication aux morphiniques

- Syndrome opioïde.
- Traitement antidotique par naloxone, administré par voie IVL de 0,1 mg par 0,1 mg toutes les 2 minutes jusqu'à normalisation de la fréquence respiratoire (≥ 12/min). En cas d'échec après une dose cumulée de 2 mg, une autre cause doit être recherchée. Une antagonisation complète n'est pas recommandée du fait du risque de sevrage aux opiacés. La durée clinique de l'action antagoniste n'étant pas prévisible, une surveillance continue est indispensable après injection. S'il existe un risque de remorphinisation secondaire, une perfusion continue est recommandée.

VII. PRISE EN CHARGE

A. Rechercher des signes de gravité

- Liés au terrain : sujet âgé, lourdes comorbidités.
- Liés au toxique : notamment s'il est susceptible d'entraîner des complications cardiovasculaires (cardiotropes, carbamates, cocaïne).
- Liés à la quantité de substance à laquelle le sujet a été exposé (notion de dose supposée ingérée par exemple).

Copyrighted material

- Liés à la pharmacocinétique du produit : demi-vie longue, métabolisme activateur rendant possible une symptomatologie retardée ou prolongée.
- Liés à l'association de toxiques (effets synergiques ou additifs).
- Liés au tableau symptomatique : signes neurologiques, respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques (dyskaliémie, rhabdomyolyse).

Les intoxications graves doivent ainsi être admises en réanimation.

B. Hospitaliser

L'intoxication médicamenteuse volontaire justifie dans tous les cas une hospitalisation, même si aucun signe de gravité n'est retenu lors de l'examen initial, compte tenu de la gravité potentielle, de la possibilité de récidive immédiate et de la nécessité médicolégale d'une évaluation par un psychiatre. 0

C. Procéder systématiquement aux mesures suivantes

- Mise en place d'une voie veineuse périphérique.
- Bilan biologique complet, plasmathèque et urothèque.
- Radiographie thoracique.
- Électrocardiogramme.
- Monitoring des paramètres vitaux : FR, FC, PA, SpO_2, diurèse.
- En cas de troubles de la conscience : libération des voies aériennes, oxygénothérapie, recherche d'une hypoglycémie, recherche d'un syndrome opioïde, recherche d'un traumatisme crânien associé.

D. Prise en charge des complications neurologiques ITEM 230

- Ne jamais exclure une origine traumatique au coma. 0
- Apprécier la profondeur du coma par le score de Glasgow. 0
- Rechercher une indication à un traitement par sérum glucosé (hypoglycémie), flumazénil (intoxication par benzodiazépines) ou anexate (intoxication morphinique). 0
- Protéger les voies aériennes par intubation en cas de coma profond. 0
- Rechercher et traiter une comitialité (par benzodiazépines en 1re intention). 0

E. Prise en charge des complications respiratoires ITEM 193

- On distingue les insuffisances respiratoire par hypoxie, liées le plus souvent à une pneumopathie d'inhalation, plus rarement à un œdème pulmonaire lésionnel (crack, héroïne), et les insuffisances respiratoires par hypoventilation alvéolaire, où l'assistance respiratoire doit être envisagée d'emblée. 0
- Une bradypnée doit faire immédiatement rechercher un syndrome d'intoxication morphinique et discuter l'administration de naloxone. 0
- Le bilan clinique, radiologique et biologique doit faire rechercher une pneumopathie d'inhalation, nécessitant la mise en route d'une antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique). 0

Copyrighted material

F. Prise en charge des complications circulatoires ITEM 200

■ Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine d'une défaillance circulatoire :

– hypovolémie chez un patient volontiers déshydraté n'ayant pas eu accès à l'eau du fait des troubles de la vigilance ;

– vasoplégie liée au toxique lui-même ou à un sepsis associé (pneumonie d'inhalation) ;

– altération de la contractilité myocardique.

■ La compréhension du tableau hémodynamique peut nécessiter la réalisation d'investigations hémodynamiques spécifiques (échocardiographie, cathétérisme artériel pulmonaire…). Ces investigations vont guider le traitement, qui peut associer un remplissage vasculaire, un traitement vasopresseur (noradrénaline, dopamine), un traitement inotrope positif (dobutamine, adrénaline) :

– en cas de bradycardie sinusale ou de BAV : atropine IV (0,5 à 1 mg) en première intention ; en l'absence d'efficacité, on discute un traitement bêtamimétique (isoprénaline, dopamine) ou un entraînement électrosystolique ;

– en cas de troubles conductifs intraventriculaires : administration de bicarbonates ou de lactates de sodium molaires (100 à 250 mL et jusqu'à 750 mL) ;

– en cas de torsade de pointe : bolus de 2 g de sulfate de magnésium IVL puis 3 à 20 mg/min, isoprénaline et entraînement électrosystolique en cas de récidive ;

– en cas d'intoxication digitalique avec trouble rythmique ou conductif grave : Fab.

■ En cas d'échec de ces thérapeutiques (choc persistant, arrêt cardiocirculatoire), le recours à une assistance circulatoire, technique encore d'exception, doit être discuté. Elle a pour but le maintien de débits tissulaires périphériques en attendant la reprise d'une fonction cardiaque normale avec l'élimination du toxique.

■ L'arrêt cardiaque dans un contexte toxique est une situation au cours de laquelle une réanimation prolongée est recommandée.

G. Prise en charge des complications hépatiques

En cas d'hépatite fulminante (encéphalopathie, TP < 30 % avec facteur V < 30 %), la transplantation hépatique doit être discutée.

H. Décontamination digestive

Elle ne trouve plus beaucoup d'indications :

■ les vomissements provoqués par le sirop d'ipéca sont aujourd'hui proscrits du fait du risque d'inhalation ;

■ les laxatifs n'ont pas d'indication prouvée ;

■ le lavage gastrique n'est jamais très épurateur. Il peut être dangereux, à l'origine d'inhalations. Il est ainsi contre-indiqué chez le patient comateux non

Copyrighted material

intubé, en cas d'ingestion de caustiques, d'hydrocarbures pétroliers ou de produits moussants. Il reste recommandé en cas d'ingestion récente (< 1 heure) d'un toxique susceptible d'engager le pronostic vital (ayant une toxicité cardiovasculaire, en particulier) ;

- le charbon activé administré par voie orale (*Carbomix* : 50 g chez l'adulte et 1 g/kg chez l'enfant sans dépasser 50 g) n'est jamais très efficace. Il reste recommandé en cas d'ingestion récente (< 1 heure) d'un toxique susceptible d'engager le pronostic vital et carboabsorbable (antidépresseur tricyclique, carbamate, paracétamol, salicylés). Certains toxiques carboabsorbables dont la demi-vie est longue (carbamazépine, phénobarbital, digitoxine, chloroquine, théophylline, dapsone) peuvent bénéficier de l'administration répétée de charbon activé : 50 g initialement puis 25 g toutes les 2 à 3 heures.

I. Traitement épurateur

- La diurèse forcée n'est jamais indiquée.
- L'alcalinisation urinaire est justifiée dans les intoxications sévères par aspirine et herbicides dichlorophénoxyl.
- L'hémodialyse est validée dans les intoxications chroniques ou aiguës/chroniques sévères par lithium, salicylés en cas d'acidose profonde non corrigée par le bicarbonate de sodium, le méthanol et l'éthylène glycol.

J. Antidotes

Tableau 214-3. Antidotes

Intoxication	Antidote	Remarque
hypoglycémie	sérum glucosé	
benzodiazépine (ou apparentée)	flumazénil	contre indiqué en cas d'épilepsie ou d'intoxication polymédicamenteuse
morphinique	naloxone	inefficace sur la buprenorphine (*Temgesic* et *Subutex*)
paracétamol	N-acétylcystéine	selon paracétamolémie
digitaliques	anticorps antidigitaliques	dans les formes graves
béta-bloquants	glucagon	en association au traitement hémodynamique
inhibiteurs calciques	insuline-glucose	
syndrome cholinergique	atropine	
intoxication cyanhydrique	hydroxocobolamine	systématique en cas de troubles de la conscience ou troubles hémodynamiques lors d'une exposition aux fumées d'incendie
méthémoglobinémie	bleu de méthylène	si méthémoglobinémie ≥ 20% ou associée à des signes d'hypoxie
sulfamide hypoglycémiant	octréotide	si hypoglycémie réfractaire au resucrage
isoniazide	vitamine B6	si convulsions
chloroquine	diazépam (*Valium*)	si intoxication grave et en association à un traitement par adrénaline et ventilation artificielle
AVK	vitamine K	
intoxication oxycarbonée	oxygénothérapie	

Copyrighted material

K. Mesures préventives

- Consultation psychiatrique indispensable en cas d'intoxication médicamenteuse volontaire ITEM 44. Elle a pour objectifs une évaluation diagnostique et une évaluation du risque de récidive. Si une récidive est prévisible, une hospitalisation spécialisée en service de psychiatrie est décidée dès que l'état organique le permet, si besoin après avoir eu recours à la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte. S'il est déterminé l'absence de risque de récidive, une sortie est possible dès lors qu'il existe un entourage. Un suivi ambulatoire doit être alors organisé.
- Déclaration d'accident du travail en cas d'intoxication professionnelle.

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Principales intoxications aiguës

Le **diagnostic** d'intoxication repose sur :

- l'anamnèse : substances et doses, voie d'administration, heure de prise ;
- mise en évidence d'un toxidrome.

Toxidrome	Tableau clinique	Substances responsables
syndrome de myorelaxation	coma calme, hypotonique, hyporéflexique, sans localisation et dépression respiratoire	benzodiazépines, barbituriques, carbamates, phénothiazines, alcool
syndrome atropinique	confusion, hallucination, dysarthrie, tremblements, agitation, mydriase peu réactive, tachycardie sinusale, rétention aiguë d'urine, douleurs abdominales, constipation, soif et sécheresse cutanéo-muqueuse	antidépresseurs tricycliques, phénothiazines et butyrophénones
effet stabilisant de membrane	effet chronotrope, inotrope, dromotrope et bathmotrope négatifs, vasoplégie	antiarythmiques de classe I, bêtabloquants, antidépresseurs tricycliques, chloroquine et quinine, phénothiazines, carbamazépine
syndrome adrénergique	hyperthermie, agitation, convulsions, hypertension, ischémie myocardique, tachycardie, hyperglycémie, hypokaliémie, hyperleucocytose	théophylline, amphétamines, cocaïne, LSD, éphédrine
syndrome sérotoninergique	hyperthermie, agitation ou coma, hallucinations, myoclonies, hyperéflexie, mydriase, hypersudation, frissons, tremblements, diarrhée	IMAO, ISRS, lithium, tricycliques, ecstasy
syndrome opioïde	troubles de la vigilance, bradypnée et apnées, myosis serré bilatéral, nausées, vomissements, iléus, prurit, bradycardie, hypotension	opiacés

- Un test diagnostique peut parfois aussi être réalisé :
 - la naloxone doit être utilisée dans les intoxications morphiniques avec hypoventilation alvéolaire ;
 - l'anexate peut être utilisée dans les intoxications par benzodiazépines chez un patient non épileptique et en l'absence d'intoxication polymédicamenteuse.

L'**analyse toxicologique** est rarement utile, sauf à titre médico-légal ou quand le dosage quantitatif conditionne la prise en charge (paracétamol, digitaliques, lithium).

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

L'**altération de la conscience** est le symptôme le plus fréquent.

La **gravité** est plus souvent liée à :

- l'atteinte cardiovasculaire (vasoplégie et/ou effet inotrope négatif et/ou troubles conductifs ou rythmiques) ;
- l'atteinte respiratoire (pneumopathie d'inhalation, hypoventilation alvéolaire) ;
- la rhabdomyolyse et ses conséquences (insuffisance rénale, hyperkaliémie) lorsque le coma a entraîné une immobilisation prolongée.

La **prise en charge** consiste à :

- évaluer la gravité : liée au terrain, au toxique (cardiotropes), à la dose, à la cinétique du produit, aux associations, au tableau clinique (signes neurologiques, respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques) ;
- toujours hospitaliser 0 : au minimum pour l'évaluation psychiatrique (risque de récidive) ;
- poser une voie veineuse périphérique, réaliser un bilan biologique complet, une plasmathèque et une urothèque, une radiographie thoracique, un ECG, monitorer les paramètres vitaux ;
- prendre en charge les complications neurologiques :
 - ne jamais exclure une origine traumatique au coma : TDM au moindre doute 0 ;
 - apprécier la profondeur du coma par le score de Glasgow 0 ;
 - rechercher une indication à un traitement par sérum glucosé (hypoglycémie), flumazénil (benzodiazépines) ou anexate (morphinique) 0 ;
 - protéger les voies aériennes par intubation en cas de coma profond 0 ;
 - rechercher et traiter une comitialité (par benzodiazépines en 1re intention) 0 ;
- prendre en charge les complications respiratoires :
 - on distingue les insuffisances respiratoires par hypoxie (pneumopathie d'inhalation), plus rarement par œdème pulmonaire lésionnel (crack, héroïne) et les insuffisances respiratoires par hypoventilation alvéolaire (morphiniques), où l'assistance respiratoire doit être envisagée d'emblée 0 ;
 - si bradypnée : rechercher un syndrome opioïde ± naloxone 0 ;
 - rechercher une pneumopathie ± antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique) 0 ;
- prendre en charge les complications circulatoires :
 - plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine d'une défaillance circulatoire : hypovolémie chez un patient déshydraté, vasoplégie liée au toxique lui-même ou à un sepsis associé (pneumonie d'inhalation), altération de la contractilité myocardique ;
 - l'échocardiographie, le cathétérisme artériel pulmonaire peuvent guider le traitement : remplissage vasculaire et/ou traitement vasopresseur (noradrénaline, dopamine) et/ou traitement inotrope positif (dobutamine, adrénaline) ;
 - en cas de bradycardie sinusale ou de BAV : atropine IV (0,5 à 1 mg) 0 ; en l'absence d'efficacité, traitement bêtamimétique (isoprénaline, dopamine) ou entraînement électrosystolique ;
 - en cas de troubles conductifs intraventriculaires : bicarbonate ou lactate de sodium molaire (100 à 250 mL et jusqu'à 750 mL) ;
 - en cas de torsade de pointe : bolus de 2 g de sulfate de magnésium IVL puis 3 à 20 mg/min, isoprénaline et entraînement électrosystolique en cas de récidive ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– en cas d'intoxication digitalique avec troubles rythmiques ou conductifs graves : Fab ;

- rechercher l'indication d'une décontamination digestive :
 – lavage gastrique si ingestion récente (< 1 heure) d'un toxique susceptible d'engager le pronostic vital (toxicité cardiovasculaire) ;
 – charbon activé administré par voie orale (*Carbomix* : 50 g chez l'adulte) si ingestion récente (< 1 heure) d'un toxique carboabsorbable (antidépresseur tricyclique, carbamate, paracétamol, salicylés) ;
- rechercher l'indication d'un traitement épurateur :
 – alcalinisation urinaire si intoxication sévère par aspirine et herbicides ;
 – hémodialyse si intoxication sévère par lithium, salicylés, méthanol, éthylène glycol ;
- rechercher l'indication d'un traitement antidotique :
 – sérum glucosé : hypoglycémie ;
 – flumazénil : benzodiazépine seule ;
 – naloxone : morphinique ;
 – N-acétylcystéine : paracétamol ;
 – anticorps antidigitaliques ;
 – glucagon : bêtabloquant ;
 – atropine : syndrome cholinergique ;
 – hydroxocobolamine : intoxication cyanhydrique ;
 – diazépam : intoxication grave par chloroquine en association à un traitement par adrénaline et ventilation artificielle ;
 – vitamine K : intoxication par AVK ;
 – oxygénothérapie : intoxication oxycarbonée.

Copyrighted material

Copyrighted material

ITEM 219

Troubles de l'équilibre acidobasique et désordres hydroélectrolytiques

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Prescrire et interpréter un examen des gaz du sang et un ionogramme sanguin en fonction d'une situation clinique donnée.
- Savoir diagnostiquer et traiter une acidose métabolique, une acidose ventilatoire, une dyskaliémie, une dysnatrémie, une dyscalcémie.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 154 Tumeurs des os primitives et secondaires.

ITEM 166 Myélome multiple des os.

ITEM 193 Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 227 Bronchopneumopathie chronique obstructive.

ITEM 233 Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte.

ITEM 252 Insuffisance rénale aiguë – Anurie.

ITEM 255 Insuffisance surrénale.

ITEM 302 Diarrhée aiguë chez l'enfant et chez l'adulte.

ITEM 345 Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.

Sujets tombés aux concours de l'Internat : 1995, 1997, 1998, 2001

Sujets tombés

- 1995, interrégion Nord, dossier 2 :

Madame N., 85 ans, est atteinte de démence sénile de type Alzheimer. Elle est institutionnalisée en service de soins de longue durée. Depuis six mois qu'elle y est, elle n'a pas posé de problème important. Elle semble bien adaptée à l'unité, est calme, mange bien (poids 66 kg pour 165 cm), dort bien, déambule peu. Il y a trois jours elle a fait une bronchite traitée par antibiotique. On vous appelle parce qu'elle est un peu somnolente, ne s'est pas levée, n'a pas vidé sa carafe d'eau de la veille. La température est à 37,5°, la TA est à 110-75 mmHg (habituellement 140-80 mmHg), l'examen clinique est sans autre particularité, hormis une langue et un sillon gingivojugal secs. Le diagnostic de déshydratation est évoqué et un bilan biologique sanguin le confirme, en montrant : hématocrite 48 % ; sodium 155 mEq/L ; potassium 4,5 mEq/L ; chlore 117 mEq/L ; bicarbonates 25 mEq/L ; glucose 6 mmol/L ; urée 18 mmol/L ; créatinine 135 µmol/L ; protides totaux 82 g/L.

1) De quel type de déshydratation s'agit-il ? Justifiez brièvement votre réponse.

2) On décide de corriger cette déshydratation en environ 36 heures. Quelle quantité de liquide faut-il administrer ? Justifiez votre réponse

3) La malade était dans l'immédiat dans l'incapacité de boire, une perfusion intraveineuse est envisagée pour permettre la réhydratation. Par quels autres moyens pourrait-on également réaliser cette réhydratation ?

4) Si la voie veineuse est choisie, quel type de soluté prescrivez-vous ? Avec quel appoint éventuel d'électrolytes ? Justifiez votre réponse.

5) Outre la poursuite de l'antibiothérapie, proposez-vous d'autres traitements médicamenteux ? Lesquels et dans quels buts ?

Copyrighted material

• 1997, interrégion Nord, dossier 2 :

Une femme de 22 ans, sans antécédent personnel ni familial, est hospitalisée pour altération récente de l'état général et troubles digestifs à type de nausées et anorexie. L'interrogatoire de l'entourage retrouve la notion d'un amaigrissement récent, d'une polyuropolydipsie. À l'examen, la pression artérielle est à 80/60 mmHg, la fréquence cardiaque à 100/min, la malade est apyrétique avec une fréquence respiratoire à 25/min. L'examen neurologique est normal. Les résultats des examens complémentaires sont les suivants : Dans le sang : pH : 7,10, $PaCO_2$: 10 mmHg, PaO_2 : 120 mmHg (air ambiant), HCO_3 : 6 mmol/L, SaO_2 : 97 %, créatininémie : 350 µmol/l Urée : 22 mmol/L, Na+ : 118 mmol/L, K+ : 5,2 mmol/L, Cl = 89 mmol/L, glycémie : 31 mmol/L, protides totaux 83 g/L. Dans les urines : natriurèse 3 mmol/L, urée urinaire 260 mmol/L.

1) Interpréter l'anomalie de l'équilibre acido-basique observée chez cette malade.

2) Donner les formules et calculer le trou anionique et l'osmolarité plasmatique. Les valeurs obtenues sont-elles normales, basses ou élevées ?

3) a) Quel est le diagnostic le plus probable ? b) Quel examen biologique permettra formellement de l'affirmer ?

4) Quelles sont la nature et la cause de l'insuffisance rénale observée ?

5) Rédiger et justifier la prescription pour les 6 premières heures.

6) Comment interpréter le chiffre de la kaliémie ? Quelles en sont les conséquences pour la prescription thérapeutique ultérieure ?

• 1997, interrégion Nord, dossier 8 :

Un homme de 64 ans consulte pour des douleurs de la charnière dorsolombaire, apparues depuis 3 mois, progressivement croissantes et nécessitant la prise quotidienne d'antalgiques. L'examen clinique objective une altération modérée de l'état général et une douleur à la percussion des épineuses de D7, D9 et D12. L'hémogramme révèle une anémie à 8,7 g/dl et le laboratoire signale la présence de rouleaux érythrocytaires. La VS est à 90 mm à la première heure. L'ionogramme montre une hyperprotidémie à 92 g/L et une hypercalcémie à 3,6 mmol/L (144 mg/L). La fonction rénale est normale. Vous évoquez un myélome multiple.

1) Quel traitement de l'hypercalcémie proposez-vous ?

NB : les questions suivantes portaient spécifiquement sur le myélome.

• 1998, interrégion Nord, dossier 8 :

Un patient de 30 ans est admis aux urgences après un accident sur la voie publique. La désincarcération de son véhicule a été longue et difficile et il présente un écrasement du membre inférieur droit. À l'examen, le membre inférieur est très œdématié, augmenté de volume, tendu et douloureux. Les pouls périphériques sont perçus et il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur important. La TA est à 130/70 mmHg, le pouls à 110/mn. Il n'y a pas d'autre atteinte cliniquement évidente et les radiographies ne trouvent pas de lésion osseuse. Le bilan biologique est le suivant : Na+ : 136 mmol/L pH = 7,32 K + = 6,9 mmol/L $PaCO_2$ = 32 mmHg RA = 17 mmol/L Urée = 52 mmol/L Créatinine = 625 µmol/L

1) Quel diagnostic permet d'expliquer les anomalies biologiques observées ?

2) Quel est le mécanisme de cette lésion ?

3) Quels autres signes biologiques peut-on rechercher pour confirmer l'étiologie ?

4) Décrivez toutes les anomalies électriques que l'on observe en cas d'hyperkaliémie.

5) Quels sont les principes du traitement d'urgence et les éléments de surveillance ?

• 1998, interrégion Sud, dossier 2 :

Un homme de 72 ans, sans antécédent particulier en dehors d'un tabagisme chiffré à 40 paquets/année est hospitalisé pour troubles de la conscience et vomissements existant depuis plusieurs jours. Sa TA est à 150/70 mmHg (ce qui correspond aux valeurs habituelles). L'examen neurologique ne révèle ni déficit moteur, ni signe de localisation. Le bilan sanguin veineux donne les résultats suivants : - Na+ 120 mmol/L ; K+ 3,2 mmol/L ; Ca++ 3,2 mmol/L ; Phosphore 0,8 mmol/L ; Cl- 90 mmol/L ; glucose 5 mmol/L ; créatinine 85 µmol/L ; Protides 68 g/L ; Ht 42 % - CO_2 total = 23 mmol/L. Sur un échantillon d'urines, les résultats des examens sont les suivants : - Na+ 140 mmol/L ; K+ 70 mmol/L ; Cl- 108 mmol/L ; urée 380 mmol/L.

1) Quel est l'état d'hydratation du patient ? Justifiez votre réponse.

2) Les vomissements sont-ils responsables des troubles hydro-électrolytiques ? Justifiez votre réponse.

3) Quel est le mécanisme, qui explique les faits observés, probablement responsable du trouble hydro-électrolytique ?

4) Quelle est l'étiologie probable de ce mécanisme ?

5) Quel traitement symptomatique proposez-vous pour corriger l'hyponatrémie ?

• 2001, interrégion Sud, dossier 5 :

Un homme de 70 ans, sans traitement préalable, se présente aux urgences pour vomissements (depuis plusieurs jours), altération de l'état général, polypnée. L'examen clinique retrouve une température normale, une pression artérielle à 90/60 mmHg, une fréquence cardiaque à 100/min, la persistance du pli cutané. L'examen de l'abdomen est sans particularité. Les orifices herniaires sont libres. Biologiquement : Dans le sang : hématocrite 52 %, protides 75 g/L, urée 25 mmol/L, créatinine 220 µmol/L, Na+ 128 mmol/L, K+ 2,8 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, bicarbonates 40 mmol/L, pH 7,56, PCO_2 45 mmHg, PO_2 80 mmHg à l'air ambiant. Dans les urines : K+ 20 mmol/L, Na+ 4 mmol/L, Cl- 2 mmol/L, urée 350 mmol/L. L'ECG ne note qu'une tachycardie sinusale. La radiographie pulmonaire est sans particularité. Les autres examens cliniques et biologiques standards sont sans anomalie.

1) Comment qualifier ce tableau clinique ?

2) Quel trouble acido-basique identifiez-vous ? Quelle en est la cause la plus probable ?

Copyrighted material

3) Comment interpréter les autres résultats biologiques ?

4) Quelles sont les thérapeutiques immédiates à envisager ?

5) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) peut-on proposer pour avancer dans le diagnostic étiologique une fois le traitement urgent entrepris ?

- 2001, interrégion Sud, dossier 11 :

Un patient de 65 ans est amené aux urgences par sa famille pour altération de l'état général et confusion. L'interrogatoire de son épouse révèle qu'il est diabétique, traité par *Glucophage* et *Diamicron*. Il présente depuis peu un syndrome pseudo-grippal. L'examen clinique retrouve une confusion avec désorientation temporo-spatiale et une hyperpnée. La température est à 38 °C, l'hémodynamique est conservée, le pouls est à 100/minute. Les examens complémentaires montrent : Gaz du sang : pH = 7,28 ; pO_2 = 110 mmHg ; pCO_2 = 28 mmHg ; HCO_3 = 10 mmol/L, SaO_2 = 99 % ; ionogramme sanguin : Na+=141 mmol/L ; K+ = 5,5 mmol/L ; Cl- = 101 mmol/L ; Protides = 82 g/L ; urée = 14 mmol/L ; créatinine = 120 µmol/L ; glycémie = 18 mmol/L - ECG normal en dehors d'une tachycardie sinusale.

1) Définissez avec précision le trouble de l'équilibre acido-basique dont souffre ce patient. Justifiez votre réponse.

2) Comment calculez-vous le trou anionique plasmatique ? Est-il normal, augmenté ou diminué ?

3) Citez les étiologies des acidoses métaboliques à trou anionique augmenté.

4) Chez ce patient en particulier, quels sont les deux diagnostics que vous suspectez d'emblée ? Comment les confirmez-vous ?

5) L'examen de la bandelette urinaire de ce patient vous montre : glycosurie : +++ ; cétonurie : ++++ Quel est votre diagnostic ? Quelles seront les modalités précises du traitement dans les premières heures ?

6) Par quel mécanisme physiopathologique l'hyperkaliémie de ce patient est-elle apparue ? Vous paraît-elle menaçante ? Pourquoi ?

CONSENSUS

- Aucune conférence de consensus n'existe à ce jour sur ce thème.

Troubles de l'équilibre acido-basique

POUR COMPRENDRE...

- L'équilibre acido-basique se juge sur 3 paramètres : le pH, la $PaCO_2$, les bicarbonates plasmatiques (HCO_3^-).
- Les quatre grandes perturbations acido-basiques sont l'acidose et l'alcalose métabolique, l'acidose et l'alcalose respiratoire.
- L'**acidose métabolique** est caractérisée par une diminution du pH, une diminution des bicarbonates par consommation ou perte (phénomène primitif) et une diminution de la $PaCO_2$ par hyperventilation alvéolaire (phénomène compensatoire).
- L'**alcalose métabolique** est caractérisée par une augmentation du pH, une augmentation des bicarbonates par perte d'ions H^+ (phénomène primitif) et une augmentation de la $PaCO_2$ par hypoventilation alvéolaire (phénomène compensatoire).

Copyrighted material

■ L'**acidose respiratoire** est caractérisée par une diminution du pH, une augmentation de la $PaCO_2$ par hypoventilation alvéolaire (phénomène primitif) et une augmentation des bicarbonates par diminution du seuil rénal de réabsorption des bicarbonates (phénomène compensatoire).

■ L'**alcalose respiratoire** est caractérisée par une augmentation du pH, une diminution de la $PaCO_2$ par hyperventilation alvéolaire (phénomène primitif) et une diminution des bicarbonates par augmentation du seuil rénal de réabsorption des bicarbonates (phénomène compensatoire).

■ Les phénomènes de compensation nécessitent un délai. On peut ainsi distinguer les situations chroniques, où la compensation est importante, des situations aiguës, où la compensation est modeste voire absente. La compensation respiratoire est plus rapide que la compensation rénale.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Détermination du pH

■ Un acide est une molécule qui en solution libère un ion H^+.

■ Une base est une molécule qui en solution capte un ion H^+.

■ La concentration en ion H^+ d'une solution s'exprime sous forme logarithmique :

$$pH = -\log 10[H^+]$$

B. Systèmes tampons

De nombreux acides, dits acides faibles, sont partiellement dissociés et forment avec la base conjuguée un couple acide/base :

$$RCOOH \text{ (acide faible)} \leftrightarrow RCOO^- \text{ (base conjuguée)} + H^+$$

Les ions H^+ sont ainsi, dans un mélange équimolaire d'acide faible et de sa base conjuguée, captés par la base et masqués : on parle de « système tampon », atténuant les variations d'ions H^+ et donc de pH.

C. Couple acide carbonique/bicarbonate, équation d'Henderson-Hasselbach

■ Parmi les systèmes tampons, le couple H_2CO_3/HCO_3^- est un système régulateur essentiel du pH. L'acide carbonique (H_2CO_3) est transformé en CO_2 par l'anhydrase carbonique, abondante dans les hématies.

■ Le CO_2 est évacué dans les poumons.

■ La relation physique qui lie le pH aux bicarbonates et au dioxyde de carbone est l'équation d'Henderson-Hasselbach :

– $pH = pK + \log (HCO_3^-/H_2CO_3)$;

– $pH = 6{,}1 + \log (HCO_3^- / 0{,}003.PCO_2)$;

– 6,1 = pK de l'acide carbonique.

Copyrighted material

■ Les constituants de cette équation sont mesurables dans le sang et les valeurs normales sont :

– pH = 7,40 ± 0,05 ;

– HCO_3^- = 25 ± 3 mmol/L ;

– $PaCO_2$ = 40 ± 5 mmHg.

■ Le pH varie dans le sens du quotient HCO_3^-/PCO_2. En cas de variation pathologique de PCO_2 ou de HCO_3^-, l'organisme cherche à ramener le pH vers la normale en agissant sur l'autre terme du quotient HCO_3^-/PCO_2.

D. Trou anionique (TA)

■ TA = $[NA^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$.

■ Son calcul néglige d'autres cations (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}) ou anions (sulfates, phosphates).

■ Sa valeur normale est de 12 ± 4 mmol/L, correspondant aux anions protidiques non facilement dosables. En cas d'hypoprotidémie et notamment d'hypoalbuminémie, le trou anionique est évidemment diminué.

■ Une augmentation du trou anionique est liée à la présence d'un acide (AH) dont l'anion (A^-) prend la place de HCO_3^-, un acide envahissant l'organisme étant en effet tamponné par le couple bicarbonate/acide carbonique selon la réaction :

$$AH + HCO_3^- \rightarrow A^- + H_2CO_3$$

E. Gaz du sang

■ Les trois paramètres indispensables à la détermination de l'équilibre acidobasique (pH, $PaCO_2$, HCO_3^-) sont mesurés sur un prélèvement artériel.

■ L'artère radiale est le site privilégié ; l'artère fémorale est réservée aux échecs de ponction radiale. Une compression au-dessus du point de ponction est indispensable après retrait de l'aiguille.

■ Le prélèvement doit être envoyé immédiatement au laboratoire et l'analyse tient compte de la température du patient (qui peut entraîner des corrections de PaO_2 et de pH) et des conditions de ventilation (ventilation spontanée, ventilation mécanique, débit d'oxygénothérapie, FiO_2) pour l'interprétation.

■ La ponction veineuse accidentelle ou volontaire est possible et l'interprétation d'un gaz du sang veineux doit tenir compte de l'activité métabolique du membre concerné et éventuellement de l'ischémie induite par la mise en place d'un garrot. La PvO_2 est évidemment franchement abaissée, tandis que le pH et les bicarbonates sont légèrement abaissés et la $PvCO_2$ légèrement plus élevée.

Copyrighted material

II. ACIDOSE MÉTABOLIQUE

* Concours internat 1997, 2001

A. Causes de l'acidose métabolique*

La mesure du trou anionique est indispensable au diagnostic de la cause de l'acidose.

1. Acidose métabolique à trou anionique normal ou peu augmenté

- Par fuite digestive de bicarbonates (diarrhée, fistules digestives, fistules pancréatiques, urétéro-sigmoïdostomie). ITEM 302
- Rarement par fuite rénale de bicarbonates (acidose tubulaire rénale par défaut de sécrétion d'ions H^+).
- Très rarement lors d'un traitement par inhibiteur de l'anhydrase carbonique.
- L'augmentation du chlore maintient le trou anionique à un niveau normal.
- Le calcul du TA urinaire (TAu = $NA^+ + K^+ - Cl^-$) permet de distinguer les pertes rénales des pertes digestives. Il est normalement positif. En cas de perte digestive, il se négative du fait d'une sécrétion rénale accrue de NH_4^+. En cas de perte rénale, il reste positif du fait d'une faible excrétion de NH_4^+.

2. Acidose métabolique à trou anionique augmenté

- Accumulation d'un acide entraînant une consommation de bicarbonates ($AH + HCO_3^- \rightarrow A^- + H_2CO_3 \rightarrow CO_2$ [éliminé] $+ H_2O$) :
 - insuffisance rénale : accumulation d'ions H^+ non éliminés par le rein ITEM 252 ;
 - acidocétose diabétique : par accumulation d'acides cétoniques ; ITEM 233
 - cétose de jeûne ;
 - cétose alcoolique ;
 - acidose lactique. ITEM 200
- Accumulation d'acides au cours de certaines intoxications : intoxication méthylique, intoxication par éthylène glycol, intoxication salicylée. Un trou osmolaire élevé est souvent associé.

N.B. : La seule situation où il existe une perte de bicarbonate est la perte digestive, qui constitue donc la seule indication théorique à un traitement par bicarbonates.

B. Conséquences de l'acidose métabolique

- Polypnée de Kussmaul : respiration à 4 temps :
 - inspiration ;
 - pause en inspiration ;
 - expiration ;
 - pause en expiration.
- Tableau d'insuffisance respiratoire aiguë par épuisement respiratoire.
- Hyperkaliémie.

Copyrighted material

Concours Internat 2001

0

C. Traitement de l'acidose métabolique*

Il est avant tout étiologique.

La prise en charge spécifique peut aussi reposer sur :

- la ventilation mécanique, afin d'augmenter l'élimination du CO_2, mais son utilisation reste limitée aux situations où il existe une indication associée :
 - détresse respiratoire ;
 - et/ou état de choc ;
 - et/ou troubles de la vigilance ;
- la perfusion de bicarbonates en cas de pertes digestives (ou rarement rénales), en cas d'hyperkaliémie associée (sauf acidocétose diabétique), en cas d'intoxication à un produit à effet stabilisant de membrane ;
- l'épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale associée.

III. ALCALOSE MÉTABOLIQUE

Le phénomène primitif est l'augmentation des bicarbonates dont la consommation est diminuée du fait d'une perte d'ions H^+ :

- $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$;
- donc $CO_2 + H_2O - H^+ \rightarrow HCO_3^-$.

A. Causes de l'alcalose métabolique

La perte d'ions H^+ est liée à :

- un hyperaldostéronisme primaire ;
- un hyperaldostéronisme secondaire (hypovolémie vraie ou relative) ;
- une hypokaliémie profonde : stimule dans le canal collecteur un échange actif K^+/H^+ ;
- des pertes digestives par vomissements ou aspirations gastriques avec perte de HCl ;
- une hypercalcémie : par atteinte fonctionnelle tubulaire à l'origine d'une augmentation de la réabsorption des bicarbonates.

N.B. : à fonction rénale normale, le seuil d'élimination rénale des bicarbonates est augmenté, permettant une élimination rapide de l'excédent de bicarbonates. Ces mécanismes sont donc souvent associés à une déshydratation extracellulaire et à une insuffisance rénale fonctionnelle, l'ensemble expliquant l'alcalose métabolique.

B. Conséquences de l'alcalose métabolique sévère (pH > 7,55)

- Hypopnée.
- Troubles de la conscience.
- Crampes.
- Myoclonies.
- Syndrome d'hyperexcitabilité musculaire (crises de tétanie).

Copyrighted material

- Convulsions (rares).
- Hypokaliémie.

C. Traitement de l'alcalose métabolique

- Il est avant tout étiologique.
- Il repose aussi sur la correction des troubles métaboliques éventuellement associés (déshydratation, hypokaliémie).
- Dans les cas exceptionnels d'alcalose majeure (pH > 7,60, HCO_3^- > 60 mmol/L), associée à des signes cliniques menaçants, et un traitement étiologique inefficace, la perfusion d'acide chlorhydrique peut être proposée.

IV. ACIDOSE RESPIRATOIRE ITEM 193

A. Causes de l'acidose respiratoire

- Pathologies respiratoires chroniques obstructives ou restrictives, évoluées ou en décompensation (++) ITEM 277.
- Atteinte de la fonction neuromusculaire respiratoire ITEM 193 :
 - au niveau du tronc cérébral : intoxication médicamenteuse, accident vasculaire cérébral, tumeur ;
 - au niveau de la moelle épinière et au-dessus de C4 : traumatisme du rachis cervical, myélite aiguë, thrombose vasculaire ;
 - au niveau des afférences nerveuses : poliomyélite antérieure aiguë, polyradiculonévrite aiguë, sclérose latérale amyotrophique ;
 - au niveau de la plaque motrice : myasthénie ;
 - au niveau des muscles respiratoires : myopathies et épuisement respiratoire.
- Pathologies respiratoires évoluées obstructives ou restrictives.

B. Conséquences de l'acidose respiratoire

- Céphalées.
- Astérixis.
- Syndrome confusionnel.
- Coma.
- Tachycardie, hypertension artérielle.
- Sueurs.
- Hyperkaliémie.

C. Traitement de l'acidose respiratoire

Il est étiologique et repose dans la plupart des cas sur la ventilation artificielle ITEM 193.

Copyrighted material

V. ALCALOSE RESPIRATOIRE

A. Causes de l'alcalose respiratoire

- Alcalose respiratoire d'origine neurologique :
 - hyperventilation psychogène ;
 - encéphalopathie hépatique ;
 - intoxication salicylée.
- Alcalose respiratoire par stimulation hypoxique des centres respiratoires :
 - embolie pulmonaire ;
 - maladie pulmonaire hypoxémiante ;
 - séjour en altitude.

B. Conséquences de l'alcalose respiratoire

- Signes neuropsychiques : l'alcalose respiratoire entraîne des variations importantes des débits sanguins régionaux. Ainsi, le débit sanguin cérébral diminue de 2 % pour chaque diminution de $PaCO_2$ de 1 mmHg :
 - vertiges ;
 - tremblements, tétanie ;
 - convulsions.
- Hyperlactatémie modérée secondaire à une stimulation de la glycolyse anaérobie (activation de la phosphofructokinase).
- Hypokaliémie.

C. Traitement de l'alcalose respiratoire

Le traitement est celui de la cause.

Dysnatrémies

POUR COMPRENDRE...

- Le sodium est le principal constituant de l'osmolarité plasmatique. Toute modification de natrémie entraîne un mouvement d'eau entre les compartiments extracellulaire et intracellulaire, visant à égaliser les osmolalités des 2 compartiments.
- Une hyponatrémie est toujours associée à une hyperhydratation intracellulaire.
- Une hypernatrémie est toujours associée à une déshydratation intracellulaire.
- Les conséquences de l'hyperhydratation intracellulaire sont surtout graves au niveau cérébral, l'augmentation du contenu en eau du tissu cérébral étant directement responsable d'une hypertension intracrânienne.

Copyrighted material

I. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Sodium

■ Le sodium total de l'organisme est estimé à environ 4 000 mmol. La grande majorité du sodium (98 %) est extracellulaire. Ainsi, dans le plasma, sa concentration normale est comprise entre 138 et 142 mmol/L. Le sodium est un cation intracellulaire accessoire dont la concentration n'est que de 10 à 15 mmol/L. Cette différence de concentration est responsable d'un gradient électrochimique ayant tendance à faire rentrer le sodium dans la cellule.

■ Le sodium est maintenu dans le secteur extracellulaire par un mécanisme actif, une « pompe à sodium », faisant sortir de la cellule une quantité de sodium égale à celle que le gradient électrochimique fait pénétrer par diffusion.

■ Les entrées de sodium sont constituées exclusivement par les apports digestifs. L'élimination digestive est négligeable (10 mmol/j) et les pertes sudorales sont très faibles (1 mmol/j). La principale voie d'élimination est urinaire. Le contrôle du bilan du sodium est assuré donc essentiellement par le rein.

B. Eau

■ L'eau totale représente 60 % du poids corporel chez l'homme, 50 % chez la femme.

■ La membrane cellulaire est librement perméable à l'eau et à certains solutés. Les solutés non diffusibles sont responsables de la pression osmotique. Le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire dépend de la concentration des solutés non diffusibles de part et d'autre, l'eau se distribuant de part et d'autre de la membrane cellulaire de telle sorte que les osmolarités extra et intracellulaires soient identiques. La répartition se fait ainsi pour 2/3 dans le secteur intracellulaire et 1/3 dans le secteur extracellulaire.

■ **L'osmolalité** est égale à la somme des concentrations de toutes les molécules, diffusibles ou non, dissoutes dans 1 kg d'eau plasmatique. Elle est mesurée au laboratoire par l'abaissement du point de congélation du plasma (abaissement cryoscopique) et est **normalement comprise entre 280 et 295 mosmol/kg** d'eau

0 plasmatique. Elle peut être également mesurée = $2 \times [Na^+] + [urée] + [glucose]$. Le facteur 2 est lié au fait que chaque cation Na^+ s'accompagne d'un anion.

■ **L'osmolarité** est égale à la somme des concentrations de toutes les molécules, diffusibles on non, dissoutes dans 1 L d'eau plasmatique. En pratique clinique, la différence entre osmolalité et osmolarité n'est pas significative.

■ **L'osmolalité efficace, ou tonicité**, est la somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles dissoutes dans 1 L d'eau plasmatique. Les mouvements d'eau à travers la membrane cellulaire sont donc régis uniquement par l'osmolalité efficace. L'urée traverse librement la membrane cellulaire et ne participe donc pas à la tonicité sauf dans les situations de variations importantes

Copyrighted material

et rapides (épuration extra-rénale). Le glucose, en présence d'insuline, traverse également la membrane cellulaire et ne participe donc pas à la tonicité sauf dans les situations de carence en insuline (céto-acidose diabétique). En dehors de ces situations, l'osmolalité efficace est estimée par le produit : $2 \times [Na^+]$.

■ Osmolalité efficace = $2 \times [Na^+]$

C. Régulation du bilan de l'eau et du sodium

■ L'hydratation du secteur extracellulaire dépend du capital sodé de ce secteur.

■ L'hydratation du secteur intracellulaire, en revanche, est fonction de la concentration des électrolytes extracellulaires, le sodium essentiellement. La natrémie détermine donc l'hydratation intracellulaire.

■ Le contrôle du bilan de l'eau et du sodium fait intervenir 2 mécanismes différents : la balance hydrique et la balance sodée :

– la balance hydrique est contrôlée par l'osmostat hypothalamohypophysaire via le centre de la soif et le centre de sécrétion de l'hormone antidiurétique (HAD). L'HAD augmente la réabsorption d'eau au niveau du canal collecteur rénal. L'urine excrétée est alors de faible volume et est de forte osmolarité. La synthèse de l'HAD est déclenchée par la stimulation d'osmorécepteurs hypothalamiques lors de l'augmentation de l'osmolarité et/ou la stimulation de barorécepteurs carotidiens lors d'une diminution importante de la volémie ;

– la balance sodée est régulée par plusieurs systèmes : le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui lorsqu'il est stimulé augmente la réabsorption sodée au niveau des tubes contournés proximaux et distaux et du canal collecteur médullaire (l'urine excrétée est alors pauvre en sodium), et les peptides natriurétiques.

II. HYPONATRÉMIES

Elles sont définies par $[Na^+] < 138$ mmol/L.

A. Causes des hyponatrémies

On distingue les hyponatrémies non hypotoniques, au cours desquelles l'hyponatrémie n'est pas associée à une diminution de l'osmolarité, des hyponatrémies hypotoniques.

1. Hyponatrémies non hypotoniques

■ Pseudohyponatrémie : la tonicité du plasma est normale (la concentration en sel par litre d'eau plasmatique est normale), mais le contenu en eau du sérum est diminué par augmentation de la phase solide. Une mesure par électrode

Copyrighted material

spécifique directe (et non par spectrophotométrie de flamme ou électrode spécifique) permet de corriger cet artéfact. Cette situation s'observe au cours des :

– hyperlipidémies majeures ;

– hyperprotidémies importantes : dysglobulinémie, traitement par immunoglobuline polyvalente.

■ Hyponatrémie de redistribution : la tonicité du plasma est augmentée mais cette augmentation n'est pas liée au sodium. Cette augmentation de la tonicité est à l'origine d'un transfert d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Cette situation s'observe au cours des :

– hyperglycémies ;

– augmentations du trou osmolaire : le trou osmolaire, différence entre l'osmolalité plasmatique mesurée et l'osmolalité plasmatique calculée, est augmenté lorsqu'il est supérieur à 10 mosmol/L. Cette augmentation suggère la présence de substances osmotiquement actives mais non mesurées : alcool éthylique, éthylène glycol, méthanol.

2. Hyponatrémies hypotoniques

a) Hyponatrémies de dilution

■ Intoxication par l'eau : l'élimination rénale d'eau dépend de la capacité de dilution maximale des reins et de la quantité d'osmoles devant être excrétée. Ainsi, l'osmolarité urinaire peut descendre jusqu'à 50 mosm/L. Ici, la capacité maximale de dilution des urines est dépassée. L'osmolarité urinaire est basse (OsmU < OsmP) et est dite adaptée. Cette situation s'observe dans les contextes suivants :

– potomanie ;

– syndrome des buveurs de bière ;

– sujet âgé, dont la capacité de dilution des urines est réduite.

■ Sécrétion d'HAD : l'osmolarité urinaire est ici élevée (OsmU > OsmP), dite inadaptée. Cette situation s'observe dans les contextes suivants :

– hypovolémie relative : insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, insuffisance hépatocellulaire, hypoalbuminémie ;

– syndrome de sécrétion inappropriée d'HAD (SiHAD).

■ Traitement diurétique : l'osmolarité urinaire est élevée car la natriurèse est ici augmentée. L'hyponatrémie n'est pas expliquée par une perte rénale en sodium mais par une synthèse d'HAD du fait de l'hypovolémie et une interférence avec le segment cortical de dilution des urines.

■ Hypokaliémie : en cas de perte rénale ou digestive de potassium, le potassium intracellulaire sort vers le compartiment extracellulaire pour maintenir la kaliémie. L'entrée de sodium dans le compartiment intracellulaire permet de maintenir l'électroneutralité et peut provoquer une hyponatrémie.

Copyrighted material

■ Syndrome des membranes malades *(sick cell syndrome)* : entité dont l'existence est controversée et correspondrait aux situations d'agression sévère, un dysfonctionnement cellulaire entraînant la sortie de solutés intracellulaires vers le secteur extracellulaire, à l'origine d'un transfert d'eau et d'une hyponatrémie.

b) Hyponatrémies de déplétion

■ Pertes rénales (natriurèse haute > 20 mmol/L) :

– néphropathie tubulo-interstitielle ;

– polyurie osmotique ;

– insuffisance surrénale. ITEM 255

■ Pertes digestives (natriurèse basse < 20 mmol/L) :

– diarrhée ; ITEM 302

– vomissements ; ITEM 345

– fistules digestives ;

– 3^e secteur.

Il faut cependant noter que ces pertes rénales ou digestives sont souvent iso voire hypotoniques et ne peuvent expliquer à elles seules l'hyponatrémie, qui est liée au fait que le sujet compense ces pertes avec de l'eau sans reconstituer son capital sodé.

B. Manifestations de l'hyponatrémie

■ Les manifestations cliniques sont d'autant plus nettes que l'hyponatrémie est d'installation brutale : 0

– dégoût de l'eau ;

– signes digestifs : nausées et vomissements ;

– signes neurologiques : syndrome confusionnel, troubles du comportement, coma, comitialité.

■ Les conséquences de l'hyperhydratation intracellulaire sont surtout graves au niveau cérébral, l'augmentation du contenu en eau du tissu cérébral étant directement responsable d'une hypertension intracrânienne. Les cellules cérébrales ont cependant un comportement de défense, consistant dans une première phase (immédiate) à diminuer leur contenu en électrolytes (Na^+ et K^+) et dans un second temps (retardé de plusieurs heures ou jours) à diminuer leur contenu en osmolites (polyols, méthylamines, acides aminés). Cette adaptation secondaire est la plus efficace, expliquant la mauvaise tolérance neurologique des hyponatrémies aiguës et la bonne tolérance neurologique des hyponatrémies chroniques. À l'inverse, on comprend aussi qu'une correction trop rapide de la natrémie en cas d'hyponatrémie chronique aboutit à une diminution rapide de l'eau intracellulaire tandis que le contenu cellulaire en osmoles ne se 0

Copyrighted material

normalise qu'avec une certaine inertie, aboutissant à une rétraction des cellules cérébrales et à une surcharge ionique altérant leur fonctionnement.

■ La myélinolyse centropontine est le risque majeur d'une correction trop rapide de l'hyponatrémie. Elle correspond à des lésions symétriques du centre de la protubérance, pouvant être mises en évidence à l'IRM. La symptomatologie apparaît après un intervalle libre de 1 à 6 jours et associe : une somnolence, une dysarthrie, une paralysie faciale bilatérale, une quadriparésie spastique. L'amplitude de correction dans les 24 premières heures (plus que la vitesse horaire de correction) détermine la survenue de la myélinolyse centropontine. Les objectifs thérapeutiques recommandés sont : une augmentation de la natrémie < 12 mmol/L en 24 heures ou < 18 mmol/L en 48 heures. Le pronostic est grave, avec une absence de récupération motrice dans 70 % des cas. Pour certains, la réinduction d'une hyponatrémie après une correction trop rapide est à même de faire disparaître les symptômes neurologiques.

C. Traitement de l'hyponatrémie*

* Concours Internat 1998

L'utilisation de formules mathématiques pour l'aide au traitement n'est plus recommandée.

1. En cas d'hyponatrémie aiguë (< 48 h)

■ Une correction rapide n'est pratiquée qu'en cas de symptômes neurologiques graves (coma, comitialité).

■ On utilise du sérum salé hypertonique à 3 % : 1 mmol/kg/h, interrompu dès la disparition des symptômes, une faible augmentation de la natrémie pouvant faire disparaître les symptômes.

2. Traitement des hyponatrémies chroniques ou d'ancienneté indéterminée

■ La correction de la natrémie doit, dans cette situation, qui est la plus fréquente, être lente : augmentation de la natrémie < 12mmol/L en 24 heures ou < 18mmol/L en 48 heures.

■ La restriction hydrique seule est souvent suffisante quand le volume extracellulaire est élevé ou normal.

■ L'apport de sérum physiologique seul est souvent suffisant quand le volume extracellulaire est bas.

■ En cas de symptôme neurologique grave (coma, comitialité), une correction rapide par sérum salé hypertonique sous stricte surveillance doit être discutée.

Copyrighted material

III. HYPERNATRÉMIES

Elles sont définies par $[Na^+] > 145$ mmol/L.

A. Causes des hypernatrémies

- Hypernatrémie par perte d'eau sans perte de sodium :
 - diabète insipide neurogénique ;
 - diabète insipide néphrogénique ;
 - pertes respiratoires (hyperventilation) ;
 - pertes cutanées (brûlures étendues, hypersudation) ;
 - hypodypsie du sujet âgé.
- Hypernatrémie par perte d'eau et de sodium, le déficit hydrique excédant légèrement le déficit sodé (l'hypernatrémie y est moins prononcée) :
 - pertes cutanées ;
 - pertes digestives (vomissements, aspiration digestive, fistule digestive, diarrhées) ➤ ITEMS 302, 345 ;
 - pertes rénales (diurétiques de l'anse, diurèse osmotique, levée d'obstacle, reprise d'une diurèse après nécrose tibulaire).
- Hypernatrémie par surcharge en sodium : perfusion de bicarbonates de sodium.

B. Conséquences de l'hypernatrémie

Les manifestations cliniques sont d'autant plus nettes que l'hypernatrémie est d'installation rapide : 0

- soif ;
- sécheresse des muqueuses ;
- fièvre ;
- signes neuropsychiques : syndrome confusionnel, coma, comitialité ;
- hématomes sous-duraux chez l'enfant, thrombose vasculaire cérébrale.

C. Traitement de l'hypernatrémie*



- L'utilisation de formules mathématiques pour l'aide au traitement n'est plus recommandée. 0
- Une correction trop rapide est potentiellement dangereuse car la diminution de la natrémie peut être à l'origine d'un transfert d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire et donc d'un œdème cérébral. 0
- En cas de perte d'eau sans perte de sodium, le traitement consiste en l'administration d'eau par voie entérale et/ou de solution glucosée à 5 %.
- En cas de perte d'eau et de sodium, le traitement consiste à traiter en priorité l'hypovolémie par l'administration de sérum salé.

Copyrighted material

■ Dans le cas particulier du diabète insipide neurogénique, le traitement repose aussi sur l'administration d'un traitement substitutif par desmopressine (*Minirin*).

Dyskaliémies

POUR COMPRENDRE...

■ Le potassium est le principal cation intracellulaire et détermine le pouvoir osmotique intracellulaire.

■ Le gradient transcellulaire de potassium est le principal déterminant du potentiel de repos membranaire. Ainsi, le retentissement sur la polarisation de la membrane cellulaire myocardique fait toute la gravité des dyskaliémies, qui constituent des urgences thérapeutiques.

■ L'hyperkaliémie est un trouble hydroélectrolytique particulièrement grave, mettant en jeu le pronostic vital si la kaliémie est > 6,5 mmol/L.

■ Au cours des dyskaliémies, la réalisation d'un électrocardiogramme est indispensable : il confirme souvent le diagnostic positif et fait le diagnostic de gravité.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Potassium

■ L'organisme humain contient environ 3 500 mmol de potassium. La grande majorité du potassium (98 %) est intracellulaire, où sa concentration (kalicytie) atteint 120 mmol/L. Ainsi dans le plasma, la concentration en potassium n'est que de 3,5 à 5 mmol/L.

■ Les échanges de potassium entre milieux intra et extracellulaires sont gouvernés par différents mécanismes, en particulier l'activité de la pompe Na-K ATPase des membranes cellulaires, le métabolisme cellulaire, la formation des cations intracellulaires et le pH extracellulaire.

■ Dans la plupart des cas, une hypokaliémie correspond à une hypokalicytie profonde, sauf en cas d'acidose.

B. Régulation du stock potassique

■ Le bilan entrées-sorties du potassium est le résultat net d'une absorption digestive et d'une élimination essentiellement rénale.

■ Les apports alimentaires quotidiens varient de 50 à 150 mmol. L'absorption digestive du potassium est quasi complète. L'élimination se fait chez le sujet normal à raison de moins de 10 % par les selles et de 90 % par le rein. En cas d'insuffisance rénale chronique, l'élimination potassique augmente par voie

Copyrighted material

digestive. De même, l'élimination digestive peut être multipliée par dix en cas de diarrhées.

■ L'absorption digestive du potassium est rapide. Il existe une lenteur relative d'élimination. Les excès de charge de potassium dans le milieu extracellulaire sont tamponnés grâce au transfert du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire.

■ Ce transfert est sous l'influence de l'équilibre acido-basique, des catécholamines et de l'insuline. Au cours d'une acidose métabolique, la plupart des protons qui s'accumulent sont tamponnés dans la cellule. Cette entrée de protons s'accompagne d'une sortie de Na^+ et de K^+ pour préserver l'électroneutralité. L'insuline augmente l'entrée du potassium dans les cellules en stimulant directement la Na-K ATPase membranaire. Les catécholamines ont également un rôle dans ce transfert de potassium en stimulant l'ATPase membranaire.

■ Le rein permet l'adaptation des sorties du potassium à ses entrées. Dans la grande majorité des situations cliniques, la réabsorption du potassium est quasi complète (95 %) dans le tube contourné proximal et l'anse de Henlé. Le tube contourné distal tient sous sa dépendance l'extrusion de potassium par sécrétion. Cette sécrétion est multifactorielle. Elle dépend de la concentration plasmatique de potassium (une augmentation de la kaliémie de 0,5 mmol entraîne une multiplication par 10 de l'excrétion urinaire), et de l'aldostérone (et donc des apports sodés).

■ L'alcalose entraîne une hypokaliémie, par accroissement de l'influx du potassium dans le milieu intracellulaire et par fuite urinaire. En revanche, l'acidose entraîne une hyperkaliémie sans modifier de façon notable l'élimination urinaire.

II. HYPERKALIÉMIES

L'hyperkaliémie est définie par $[K^+] > 5$ mmol/L.

Il faut toujours penser à éliminer une fausse hyperkaliémie, liée à l'hémolyse du sang prélevé : garrot trop serré ou laissé trop longtemps, leucémie ou syndrome myélodysplasique avec une quantité importante de leucocytes ou de plaquettes fragiles.

A. Causes des hyperkaliémies

1. Excès d'apport exogène en K^+

■ Intraveineux (souvent iatrogénique).

■ Entéral (rarement à l'origine d'une hyperkaliémie, sauf en cas d'apports importants et rapides ou d'insuffisance rénale préalable).

Copyrighted material

2. Transfert cellulaire

- Acidoses.
- Déficit en insuline.
- Lyse cellulaire (syndrome de lyse tumorale, rhabdomyolyse, hémolyse, brûlures étendues) : situations à l'origine d'hyperkaliémies sévères et rapidement progressives*.

Concours Internat 1998

- Médicaments : bêtabloquants, digitaliques.
- Paralysie périodique hyperkaliémique.

3. Diminution de l'excrétion rénale

- Insuffisance rénale aiguë et chronique ITEM 252.
- Hypoaldostéronisme :
 - insuffisance surrénale aiguë et chronique ITEM 255 ;
 - syndrome hyporéninisme hypoaldostéronisme (néphropathie diabétique, néphropathies interstitielles) ;
 - médicaments : IEC, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, ciclosporine, tacrolimus, héparine, diurétiques antikaliurétiques (spironolactone, amiloride, triamtérène), triméthoprime (effet amiloride-*like*), AINS.

B. Manifestations des hyperkaliémies

0

- Toxicité cardiaque :
 - modifications électrocardiographiques diffuses, montrant progressivement :
 - ondes T, amples, pointues et symétriques ;
 - troubles de la conduction sinoauriculaire, auriculoventriculaire ;
 - troubles de la conduction intraventriculaire ;
 - troubles du rythme ventriculaire ;
 - l'hypocalcémie et l'acidose potentialisent la toxicité cardiaque de l'hyperkaliémie (*fig. 219.1*).
- Troubles neuromusculaires rares, dans les hyperkaliémies sévères :
 - paresthésies buccales et des extrémités ;
 - paralysie flasque, avec parfois atteinte de la musculature respiratoire.
- Troubles métaboliques :
 - acidose ;
 - hypoglycémie.

Concours Internat 1998

C. Traitement des hyperkaliémies*

0

Il s'agit d'une urgence thérapeutique, nécessitant une prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique dès que la kaliémie est > 6,5 mmol/L et/ou qu'il existe des signes électrocardiographiques. En plus du traitement de la cause, le traitement symptomatique a plusieurs objectifs.

Copyrighted material



Fig. 219-1. Hyperkaliémie
Source : *Les Troubles du rythme cardiaque dans la pratique médicale*, L. De Roy, D. El Allaf, M. Renard, Masson, 2006, 4e édition, 224 p.

1. Augmenter la pénétration cellulaire du potassium

- Bicarbonate de sodium : [0]
 - environ 1 meq/kg, soit 100 mL d'une solution semi-molaire (42 ‰) IVL sur voie veineuse périphérique ou 50 mL d'une solution molaire (84 ‰) IVL sur voie veineuse centrale ;
 - d'autant plus efficace qu'il existe une acidose.
- Insuline : 10 UI dans 500 mL de G10 % ou 30 UI dans 500 mL de G30 %.
- Bêtamimétiques : salbutamol, 10 mg en aérosol.

Ces 2 derniers traitements sont efficaces rapidement mais de façon transitoire.

2. Antagoniser les effets myocardiques du potassium

Gluconate de Ca^{2+} à 10 %, 10 mL IV, pouvant être répétés :

- efficace immédiatement mais pendant une durée brève (5 minutes) ;
- contre-indiqué en cas d'intoxication digitalique. [0]

3. Limiter l'absorption intestinale de potassium par l'utilisation d'une résine échangeuse d'ions

Kayexalate :

- 1 g échange 1 mEq de K^+ contre 1 mEq de Na^+ ;
- 30 à 60 g *per os* ou en lavement ;
- effet maximal en 4 h.

4. Épurer le potassium : épuration extra-rénale

- En cas d'hyperkaliémie menaçante (le traitement médical étant de toute façon réalisé, le temps de mettre en route cette épuration extra-rénale).
- Ou en l'absence d'efficacité du traitement médical.
- D'autant plus nécessaire que le patient est anurique.

III. HYPOKALIÉMIES

L'hypokaliémie est définie par $[K^+] < 3,5$ mmol/L.

A. Causes des hypokaliémies

1. Diminution des apports exogène en $[K^+]$

- Anorexie mentale.
- Dénutrition majeure.
- Alimentation parentérale mal équilibrée.
- Apport excessif d'une résine échangeuse d'ions.

2. Transfert cellulaire

- Alcalose.
- Insulinothérapie.
- Perfusion de solutés glucosés hypertoniques.
- Traitement bêtamimétiques.
- Paralysie périodique familiale hyperkaliémique.

3. Augmentation des pertes rénales

La kaliurèse est élevée (> 20 mmol/24 h).

- Alcalose.
- Diurétiques : diurétiques de l'anse, thiazidiques, acétazolamide.
- Hyperaldostéronisme primaire : syndrome de Conn.
- Hyperaldostéronisme secondaire :
 - avec HTA : sténose de l'artère rénale, HTA maligne, traitement œstroprogestatif, tumeur sécrétante de rénine ;
 - avec œdème : insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, insuffisance hépatocellulaire ;
 - sans HTA, ni œdème : syndrome de Bartter (hypercalciurique) et de Gitelman (hypocalciurique).
- Hypercorticisme et corticothérapie.
- Pseudohyperaldostéronisme : intoxication à l'acide glycyrrhizique (réglisses et dérivés, pastis sans alcool), qui entraîne un blocage de la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase et donc à un défaut du catabolisme du cortisol, qui, en excès, occupe les récepteurs minéralocorticoïdes.
- Hyper-réninisme : sténose de l'artère rénale, HTA maligne.
- Tubulopathie, notamment toxique (lithium, amphotéricine B, aminosides, cisplatine).

Copyrighted material

4. Augmentation des pertes digestives

La kaliurèse est basse (< 10 mmol/24 h) mais peut être normale ou élevée, stimulée par une alcalose métabolique et/ou une déshydratation extracellulaire avec hyperaldostéronisme secondaire. La chlorurie est basse (< 10 mmol/j).

- Diarrhée (alors associée à une acidose hyperchlorémique par pertes digestives de bicarbonates). ITEM 302
- Vomissements, aspirations digestives. ITEM 345
- Fistule digestive.

B. Manifestations des hypokaliémies

- Toxicité cardiaque : 0
 - modifications électrocardiographiques diffuses, montrant progressivement :
 - diminution de l'amplitude des ondes T, qui peuvent s'annuler ou se négativer ;
 - apparition d'une onde U ;
 - sous-décalage du segment ST ;
 - allongement du QT ;
 - troubles du rythme supraventriculaire (extrasystoles auriculaires, fibrillation atriale) ;
 - troubles du rythme ventriculaire (extrasystoles ventriculaires, torsades de pointe, fibrillation ventriculaire) ;
 - l'hypercalcémie, les digitaliques, les médicaments allongeant l'intervalle QT potentialisent la toxicité cardiaque (*fig. 219.2*).




Fig. 219-2. Hypokaliémie.

Source : *Les Troubles du rythme cardiaque dans la pratique médicale*, L. De Roy, D. El Allaf, M. Renard, Masson, 2006, 4e édition, 224 p.

- Troubles neuromusculaires, surtout si kaliémie < 2,5 mmol/L :
 - disparition des réflexes ostéotendineux et de la contractilité idiomusculaire ;
 - paralysie flasque ascendante prédominant aux racines, avec parfois atteinte de la musculature respiratoire ;
 - rhabdomyolyse ;
 - iléus paralytique ;
 - rétention aiguë d'urine.
- Troubles métaboliques : alcalose métabolique.
- Néphropathie interstitielle chronique : lors des hypokaliémies chroniques très prolongées.

C. Traitement des hypokaliémies

- Il s'agit d'une urgence thérapeutique, nécessitant une prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique dès que la kaliémie est < 2,5 mmol/L et/ou qu'il existe des signes électrocardiographiques.
- En plus du traitement de la cause, le traitement symptomatique repose sur l'administration de potassium. La quantité de potassium à administrer est cependant difficile à prédire, les variations de kaliémie n'étant pas le reflet des variations du stock potassique.
- Il faut se souvenir que le danger d'une hyperkaliémie est plus grand que celui d'une hypokaliémie et les sels de potassium doivent être administrés avec une vigilance particulière en cas d'insuffisance rénale associée.
- Dans tous les cas il faudra donc contrôler régulièrement la kaliémie et adapter le traitement en fonction des résultats.

1. En cas d'hypokaliémie sévère

Chlorure de potassium intraveineux (1 g KCL = 13 mmol de potassium-élément) :

- 0,5 g/h sur une voie veineuse périphérique IVSE ;
- 1 g/h sur une voie veineuse centrale IVSE ;
- en moyenne 8 g/24 h ;
- jusqu'à 4 g/h sur une voie veineuse centrale en cas de trouble du rythme ventriculaire.

2. En cas d'hypokaliémie peu sévère

Chlorure ou gluconate de potassium *per os* : en moyenne, 4 g en 24 h, par prise n'excédant pas 2 g.

Copyrighted material

Dyscalcémies

POUR COMPRENDRE...

- Le calcium joue dans l'organisme un rôle de messager intracellulaire et de messager entre les compartiments intra et extracellulaires.
- Le maintien d'une calcémie normale est donc un enjeu majeur, toute dyscalcémie étant responsable de complications cardiovasculaires, digestives, rénales et surtout neurologiques.
- L'hypercalcémie se définit comme une calcémie totale (corrigée) > 2,6 mmol/L ou une calcémie ionisée > 1,6 mmol/L. L'hypercalcémie grave se définit par une calcémie totale (corrigée) > 3,5 mmol/L ou comme une hypercalcémie symptomatique quelle que soit sa valeur.
- L'hypocalcémie se définit par une valeur de la calcémie totale (corrigée) < 2,2 mmol/L ou par une calcémie ionisée < 1,1 mmol/L.
- Au cours des dyscalcémies, la réalisation d'un électrocardiogramme est indispensable.
- La prise en charge d'une hypercalcémie sévère est une urgence vitale (risque cardiovasculaire), associant de façon parallèle la thérapeutique et le diagnostic étiologique. L'axe thérapeutique repose sur la réhydratation (préambule obligatoire) et les biphosphonates, parfois assistés de la calcitonine en cas d'urgence vitale immédiate.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Calcium

- Plus de 98 % du calcium de l'organisme est stocké dans l'os. La forme circulante plasmatique est sous forme ionisée à 50 %, sous forme liée aux protéines à 40 %, sous forme complexée à des anions à 10 %.
- La fraction ionisée est la fraction biologiquement active.
- La fraction liée aux protéines dépend directement du taux d'albumine (toute modification de 10 g de la protidémie entraîne une modification de 0,25 mmol/L dans le même sens de la calcémie totale) et de l'équilibre acido-basique (l'acidose diminue la liaison aux protides et augmente le calcium ionisé).
- La calcémie totale normale se situe entre 2,10 et 2,55 mmol/L et la calcémie ionisée entre 1,15 et 1,30 mmol/L.
- La calcémie totale corrigée peut être estimée en fonction de l'albuminémie selon la formule :
 - Ca totale corrigée = Ca totale mesurée + $\frac{1}{40}$ (40 – albuminémie) :
 - Ca en mmol/L, albuminémie en g/L.

Copyrighted material

B. Régulation de la calcémie

■ La régulation des flux calciques est sous la responsabilité du système osseux, du tube digestif, du rein, du foie, et d'un système hormonal comprenant : la parathormone (PTH), la vitamine D et la calcitonine.

■ Le calcitriol (1,25(OH)2D3), métabolite actif de la vitamine D, est synthétisé par le rein et le foie. La PTH stimule la synthèse de la vitamine D.

■ Au plan digestif, l'absorption du calcium est stimulée par le calcitriol et la PTH. Les glucocorticoïdes ont un rôle plus flou, probablement de frein à l'absorption digestive.

■ Au plan rénal, 98 % du calcium est réabsorbé. Cette réabsorption est essentiellement passive, influencée par des facteurs non hormonaux (volume extracellulaire, filtration du sodium, équilibre acido-basique, kaliémie) ainsi que des facteurs hormonaux : PTH, vitamine D, calcitonine.

■ Au plan osseux, la régulation du calcium est sous dépendance hormonale avec stimulation des ostéoclastes par la PTH, la vitamine D, les glucocorticoïdes et modulation par la calcitonine et les œstrogènes. Sur ce stock osseux, 1 % est rapidement mobilisable vers le milieu extracellulaire.

II. HYPERCALCÉMIES

A. Causes des hypercalcémies

Les étiologies des hypercalcémies sont représentées à 45 % par les hyperparathyroïdies et à 45 % par les hypercalcémies d'origine néoplasique.

Le bilan étiologique comporte un bilan biologique (calcémie, calcémie ionisée, phosphorémie, calciurie, phosphaturie, phosphatases alcalines, PTH, AMPc), ne devant pas retarder le traitement symptomatique.

■ Hyperparathyroïdie :

– primaire : adénome (90 % des cas) ;

– familiale ;

– secondaire : médicament (lithium), insuffisance rénale chronique.

0 ■ Néoplasie :

– hypercalcémie humorale des cancers : cancers épidermoïdes (poumon, œsophage, ORL, stomatologique) ; PTH intacte effondrée (adapté à l'hypercalcémie), PTH *related protein* (PTH rp : hormone apparentée à la PTH native, ayant les mêmes effets biologiques et sécrétée par la tumeur) souvent augmentée, AMPc et calciurie augmentées, phosphatémie diminuée. La PTH rp n'est pas toujours seule en cause et d'autres facteurs hormonaux peuvent être impliqués ;

Copyrighted material

– ostéolyse métastatique directe : métastases de tumeurs solides (sein, rein, prostate, vessie), hémopathies (myélomes ou lymphomes). Le profil biologique associe hypercalcémie, PTH intacte et PTH rp diminuée ➤ ITEMS 154, 166

- Granulomatose, par production de calcitriol par les cellules du granulome :
 – sarcoïdose ;
 – tuberculose ;
 – histoplasmose ;
 – coccydiodomycose.
- Insuffisance rénale aiguë. ➤ ITEM 252
- Médicaments :
 – vitamine D, vitamine A ;
 – thiazidiques ;
 – buveurs de lait (syndrome de Burnett).
- Endocrinopathies :
 – insuffisance surrénale ;
 – phéochromocytome ;
 – thyrotoxicose.
- Maladie de Paget.
- Immobilisation.

B. Manifestations des hypercalcémies

La sévérité de la présentation clinique est en relation avec l'intensité de l'hypercalcémie et surtout avec sa rapidité d'installation.

- Signes digestifs :
 – anorexie ;
 – nausées, vomissements ; ➤ ITEM 345
 – iléus paralytique ;
 – pancréatite aiguë (rare).
- Signes neurologiques :
 – syndrome confusionnel, troubles du comportement, agitation ;
 – coma ;
 – signes de localisation.
- Signes cardiovasculaires :
 – allongement du PR, élargissement du QRS, raccourcissement du QT ;
 – troubles du rythme ventriculaire (rares) ;
 – hypertension artérielle.
- Signes urinaires : polyurie.
- Déshydratation extracellulaire liée aux troubles digestifs et à la polyurie.

Copyrighted material

* Concours Internat 1997

C. Traitement*

0 La thérapeutique doit être envisagée en même temps que la mise en route du bilan étiologique et ce d'autant plus que la forme est sévère et symptomatique.

0 L'hypercalcémie grave est une urgence thérapeutique devant être prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique.

0 ■ Réhydratation :

– par sérum physiologique : 3 à 6 L/24 h ;

– la baisse de la calcémie assurée par réhydratation est d'environ 0,4 à 0,6 mmol/L.

0 ■ Biphosphonates :

– traitement de référence ;

– activité antiostéoclastique intense en se liant aux cristaux d'hydroxyapatite et en diminuant la durée de vie des ostéoclastes ;

– début d'action avant la 48e heure, nadir entre le 4e et le 9e jour ;

– baisse de la calcémie généralement située entre 0,8 et 1 mmol/L ;

– par voie intraveineuse en urgence : pamidromate *(Aredia)*, à la dose de 60 à 90 mg en perfusion unique de plus de 4 heures, zolédronate *(Zometa)*, à la dose de 4 mg en perfusion unique de 15 minutes.

■ Calcitonine :

– agit en inhibant la résorption osseuse et en favorisant l'excrétion urinaire ;

– réponse rapide dès la 2e heure, nadir entre la 6e et la 9e heure ;

– baisse de la calcémie proche de 0,5 mmol/L ;

– réactions allergiques locales au point d'injection ou générales ;

– efficacité transitoire et tachyphylaxie ;

– réservée aux hypercalcémies très sévères en attente de l'efficacité des biphosphonates.

■ Corticoïdes :

– dans les hypercalcémies néoplasiques ;

– dans les atteintes granulomateuses ;

– au cours des intoxications à la vitamine D.

III. HYPOCALCÉMIES

A. Causes des hypocalcémies

La présence d'une hypocalcémie résulte obligatoirement d'une insuffisance en sécrétion de PTH (hypoparathyroïdie) ou d'une résistance des organes cibles à la PTH.

1. Hypocalcémies parathyroïdiennes

PTH basse, AMPc bas, phosphorémie élevée, vitamine D diminuée, avec diminution de l'absorption digestive du calcium et diminution de la calciurie/24 h.

Copyrighted material

- Hypoparathyroïdisme postchirurgical après chirurgie sur les parathyroïdes, la thyroïde, chirurgie cervicale pour cancer.
- Infiltration des parathyroïdes : amylose, hémochromatoses, maladie de Wilson, cancer métastatique.
- Hypoparathyroïdisme idiopathique : état auto-immun polyglandulaire (insuffisance surrénale, hypothyroïdie).
- Hypoparathyroïdisme congénital (syndrome de Di Georges).
- Pseudohypoparathyroïdisme comme l'ostéodystrophie héréditaire d'Albright : hypocalcémie, hyperphosphorémie, mais PTH élevée (résistance à l'action de la PTH).
- Déplétion sévère en magnésium : lorsque la magnésémie est < 0,5 mmol/L, une hypocalcémie peut survenir du fait de la diminution de la sécrétion de PTH et de la résistance des organes cibles à la PTH. Les causes les plus fréquentes d'hypomagnésémie chronique sont l'alcoolisme, les malabsorptions, les traitements au cisplatine, diurétiques, aminoglycosides.

2. Déficits en vitamine D

Calcémie basse, calciurie diminuée, PTH augmentée, phosphorémie abaissée, concentration de 1,25(OH)2D3 abaissée, entraînant une certaine résistance osseuse à la PTH. L'activité phosphatasique alcaline est élevée et l'hydoxyprolinurie est élevé dans la quasi-totalité des cas, témoins d'une activité métabolique osseuse élevée.

- Carence d'apport alimentaire.
- Défaut d'exposition solaire.
- Malabsorptions intestinales : entéropathies exsudatives, insuffisance pancréatique externe, résection gastro-intestinale.
- Cholestase chronique.
- Syndrome néphrotique : perte urinaire de la protéine transportant la vitamine D et la 25(OH)D.
- Affections familiales : diminution primitive de la production rénale de 1,25(OH)2D3 (rachitisme vitaminorésistant) ou résistance à l'action de la 1,25(OH)2D3.

3. Insuffisance rénale

- Phosphorémie et PTH sont élevées, 1,25(OH)2D3 est abaissé. La diminution de production rénale de 1,25(OH)2D3 entraîne une diminution des entrées de calcium dans le plasma, une résistance osseuse à l'action de la PTH à l'origine en partie de l'hypocalcémie, et une diminution de la réabsorption tubulaire du calcium.
- L'hyperplasie parathyroïdienne secondaire maintient longtemps la calcémie à un taux normal.

Copyrighted material

■ Il existe une hypocalciurie, l'activité phosphatase alcaline est augmentée, la phosphatémie est normale ou élevée en fonction du degré de réduction néphronique.

4. Transfert de calcium ionisé

■ Dans les tissus mous en contexte d'hyperphosphorémie : insuffisance rénale aiguë ➤ ITEM 252, lyse tumorale, rhabdomyolyse.

■ Dans l'abdomen au cours des pancréatites aiguës.

■ Dans les os au cours des métastases ostéocondensantes (cancer du sein, prostate), ou du *hungry bone syndrome* après parathyroïdectomie pour hyperparathyroïdisme ou plus rarement thyroïdectomie.

■ Dans l'espace intravasculaire : au cours des transfusions de sang ou de plasma citraté massives ou chez un insuffisant hépatique métabolisant mal le citrate au cours d'un traitement par foscarnet.

B. Manifestations de l'hypocalcémie

Les manifestations cliniques sont en rapport avec l'intensité du trouble et surtout avec sa rapidité d'installation et sont observées pour des calcémies totales inférieures à 1,75 mmol/L.

■ Signes neuromusculaires :

– paresthésies, fasciculations ;

– tétanie ;

– signe de Chvostek : contraction péribuccale par percussion du nerf facial en regard de l'arcade zygomatique, souvent présent mais peu spécifique ;

– signe de Trousseau : un brassard gonflé au-dessus de la PAS induit une occlusion de l'artère brachiale avec secondairement flexion du poignet et des articulations métacarpophalangiennes ;

– comitialité ;

– manifestations psychiatriques : anxiété, dépression, manifestations psychotiques.

■ Signes cardiovasculaires :

– hypotension artérielle ;

– allongement du QT ;

– insuffisance cardiaque.

■ Manifestations cutanées des hypocalcémies chroniques :

– peau sèche ;

– chute des cheveux, ongles cassants ;

– eczéma, hyperpigmentation ;

– cataracte.

Copyrighted material

C. Traitement de l'hypocalcémie

1. Hypocalcémie modérée

Traitement oral par sels de calcium : 2 g de calcium-élément en 3 ou 4 prises par jour.

2. Hypocalcémie sévère et symptomatique

Traitement intraveineux ayant pour objectif de faire disparaître les signes neuromusculaires et de remonter la calcémie totale au-dessus de 2 mmol/L :

- gluconate de calcium à 10 % (894 mg pour 100 mL), ampoules de 10 mL ;
- chlorure de calcium à 10 % (1 830 mg pour 100 mL), ampoules de 10 mL ;
- 200 à 300 mg de calcium-élément IVL ;
- perfusions répétées jusqu'à disparition des signes de gravité ;
- suivie par des perfusions intraveineuses de 0,5 à 2 mg/kg/h de calcium-élément pendant 6 à 8 heures et jusqu'à amélioration de la calcémie ;
- recharge en magnésium en cas d'hypomagnésémie associée sévère (inférieure à 0,7 mmol/L).

3. Hypocalcémies chroniques

Poursuite de la supplémentation orale du calcium en association avec un métabolite de la vitamine D.

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydroélectrolytiques

Troubles de l'équilibre acido-basique

Valeurs normales

- pHa : 7,40 ± 0,05.
- HCO_3^- : 25 ± 3 mmol/L.
- $PaCO_2$: 40 ± 5 mmHg.
- Trou anionique (TA) = $[NA^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$ = 12 ± 4 mmol/L.

Acidose métabolique

- ↓ HCO_3^- (par consommation ou perte), ↑ $PaCO_2$ (par hyperventilation compensatrice) :
 - fuites de bicarbonates (TA normal) : digestives (diarrhée), rénales (acidoses tubulaires) ;
 - accumulation d'un acide (TA élevé) : insuffisance rénale, acidocétose diabétique, cétose de jeûne ou alcoolique, acidose lactique, intoxication à trou osmolaire élevé.
- Mesure du trou anionique indispensable au diagnostic de la cause 0.
- Conséquences :
 - polypnée, épuisement respiratoire ;
 - hyperkaliémie 0.
- Traitement : bicarbonates si pertes digestives ou rénales, hyperkaliémie, intoxication à stabilisant de membrane 0.

Alcalose métabolique

- ↑ HCO_3^- (par perte d'ions H^+), ↑ $PaCO_2$ (par hypoventilation compensatrice) :
 - hyperaldostéronisme primaire ou hyperaldostéronisme secondaire ;
 - hypokaliémie profonde ;
 - vomissements.
- Conséquences (si pH > 7,55) :
 - hypopnée ;
 - troubles de la conscience ;
 - crampes, myoclonies, tétanie, convulsions (rare) ;
 - hypokaliémie.
- Traitement : correction des troubles métaboliques (déshydratation, hypokaliémie).

Acidose respiratoire

- ↑ $PaCO_2$, ↑ HCO_3^- par compensation rénale :
 - atteinte de la fonction neuromusculaire respiratoire ;
 - toutes autres pathologies respiratoires obstructives ou restrictives évoluées ou en décompensation.
- Conséquences :
 - céphalées, sueurs, astérixis, syndrome confusionnel, coma ;
 - tachycardie, hypertension artérielle ;
 - hyperkaliémie.
- Traitement : ventilation artificielle 0.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Alcalose respiratoire

- ↓ $PaCO_2$, ↓ HCO_3^- par compensation rénale :
 - hyperventilation psychogène, encéphalopathie hépatique, intoxication salicylée ;
 - stimulation hypoxique des centres respiratoires.
- Conséquences :
 - vertiges, tremblements, tétanie, convulsions ;
 - hyperlactatémie (stimulation de la glycolyse anaérobie) ;
 - hypokaliémie.
- Traitement étiologique.

Dysnatrémies

Tonicité

- Osmolalité : somme des concentrations des molécules, diffusibles ou non, dissoutes dans 1 kg d'eau plasmatique = $2 \times [Na^+] + [urée] + [glucose]$ 0.
- Osmolarité : somme des concentrations des molécules, diffusibles on non, dissoutes dans 1 L d'eau plasmatique (≠ osmolalité).
- Osmolalité efficace ou tonicité : somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles dissoutes dans 1 L d'eau plasmatique = $2 \times [Na^+]$ 0.
- La tonicité régit les mouvements d'eau à travers la membrane cellulaire. L'urée n'y participe pas (sauf situations de variations importantes et rapides : épuration extra-rénale). Le glucose n'y participe pas (sauf situations de carence en insuline : céto-acidose diabétique).

Hyponatrémies

- $[Na^+] < 138$ mmol/L :
 - fausses hyponatrémies (hyponatrémies non hypotoniques) : hyperlipidémies, hyperprotidémies, hyperglycémies, augmentation du trou osmotique ;
 - hyponatrémie de dilution : intoxication par l'eau (potomanie, buveurs de bière, sujet âgé), sécrétion d'HAD (hypovolémie relative, syndrome de sécrétion inappropriée d'HAD), traitement diurétique, hypokaliémie, syndrome des membranes malades ;
 - hyponatrémie de déplétion : pertes rénales (NAu > 20 mmol/L : néphropathie tubulo-interstitielle, polyurie osmotique, insuffisance surrénale) ou pertes digestives (NAu < 20 mmol/L : diarrhée, vomissements, fistules digestives, 3e secteur).
- Manifestations :
 - dégoût de l'eau et signes digestifs : nausées et vomissements ;
 - signes neurologiques (gravité ++) : confusion, coma, comitialité 0 ;
 - myélinolyse centropontine : risque d'une correction trop rapide de l'hyponatrémie 0.
- Traitement :
 - objectif : élévation de [Na+] < 12 mmol/L en 24 h ou < 18 mmol/L en 48 h 0 ;
 - hyponatrémie aiguë (< 48 h) : correction rapide si symptômes neurologiques graves ; sérum salé hypertonique à 3 % jusqu'à disparition des symptômes ;
 - hyponatrémies chroniques ou de durée indéterminée : restriction hydrique si volume extracellulaire élevé ou normal, sérum physiologique si volume extracellulaire bas.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Hypernatrémies

- $[Na^+]$ < 138 mmol/L :
 - perte d'eau sans perte de sodium : diabète insipide neurogénique ou néphrogénique, pertes respiratoires ou cutanées, hypodypsie du sujet âgé ;
 - perte d'eau > perte de sodium : pertes cutanées, pertes digestives, pertes rénales ;
 - perfusion de bicarbonates de sodium.
- Conséquences :
 - soif, sécheresse des muqueuses, fièvre ;
 - signes neuropsychiques : syndrome confusionnel, coma, comitialité ;
 - hématomes sous-duraux chez l'enfant, thrombose vasculaire cérébrale.
- Traitement :
 - perte d'eau sans perte de sodium : eau par voie entérale et/ou glucosé à 5 % IV ;
 - perte d'eau et de sodium : sérum salé ;
 - diabète insipide neurogénique : traitement substitutif par desmopressine.

Dyskaliémies

Hyperkaliémie

- $[K^+]$ > 5 mmol/L :
 - fausse hyperkaliémie : prélèvement hémolysé ;
 - excès d'apport en K^+ : rare, sauf insuffisance rénale préalable ;
 - transfert cellulaire : acidoses, déficit en insuline, lyse cellulaire, digitaliques ;
 - diminution de l'excrétion rénale : insuffisance rénale, hypoaldostéronisme (insuffisance surrénale, IEC, ARA II, diurétiques hyperkaliémiants, triméthoprime, AINS).
- Manifestations :
 - cardiaques : ondes T amples, pointues et symétriques, troubles de conduction, troubles du rythme ventriculaire 0 ;
 - neuromusculaires (hyperkaliémies sévères) : paresthésies, paralysie flasque ;
 - troubles métaboliques : acidose, hypoglycémie.
- Traitement :
 - urgence thérapeutique : prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique si kaliémie > 6,5 mmol/L et/ou s'il existe des signes ECG 0 ;
 - bicarbonate de sodium IVL 0 : 100 mL d'une solution semi-molaire (42 ‰) sur voie périphérique ou 50 mL d'une solution molaire (84 ‰) sur voie centrale ;
 - insuline 0 : 10 UI dans 500 mL de G10 % ou 30 UI dans 500 mL de G30 % ;
 - bêtamimétique : salbutamol, 10 mg en aérosol ;
 - gluconate de Ca^{2+} à 10 % 0 : 10 mL IV pouvant être répétés ;
 - résine échangeuse d'ions : *Kayexalate*, 30 à 60 g *per os* ou en lavement (efficacité retardée) ;
 - épuration extra-rénale : si hyperkaliémie menaçante 0 (le traitement médical étant réalisé, le temps de la mettre en route), si absence d'efficacité du traitement médical 0 ; l'EER est d'autant plus nécessaire que le patient est anurique 0.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Hypokaliémie

- $[K^+] < 3,5$ mmol/L :
 - diminution des apports : anorexie, dénutrition, apport excessif de kayexalate ;
 - transfert cellulaire : alcalose, insuline, perfusion de solutés glucosés hypertoniques ;
 - pertes rénales ($[K^+]u > 20$ mmol/j) : alcalose, diurétiques, hyperaldostéronisme, hypercorticisme, intoxication à l'acide glycyrrhizique, tubulopathie toxique ;
 - pertes digestives ($[Cl^-]u < 10$ mmol/j, $[K^+]u < 10$ mmol/j sauf si alcalose métabolique et/ou déshydratation avec hyperaldostéronisme) : diarrhée, vomissements.
- Manifestations :
 - cardiaques : diminution des ondes T, onde U, sous-décalage de ST, allongement du QT, troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire (torsades de pointe) ;
 - neuromusculaires (si $[K^+] < 2,5$ mmol/L) : disparition des ROT, paralysie flasque, rhabdomyolyse, iléus paralytique, rétention aiguë d'urine ;
 - troubles métaboliques : alcalose métabolique ;
 - néphropathie interstitielle chronique lors des hypokaliémies chroniques très prolongées.
- Traitement :
 - urgence thérapeutique, prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique si kaliémie < 2,5 mmol/L ou s'il existe des signes ECG 0 ;
 - administration toujours prudente de potassium surtout si insuffisance rénale 0 ;
 - si hypokaliémie sévère, KCl IVSE (1 g = 13 mmol de potassium-élément) : 8 g/jour en moyenne, 0,5 g/h sur voie périphérique, 1 g/h sur voie centrale. Jusqu'à 4 g/h sur voie centrale en cas de trouble du rythme ventriculaire ;
 - si hypokaliémie peu sévère, KCl ou gluconate de potassium *per os* : en moyenne 4 g/j, chaque prise n'excédant pas 2 g.

Dyscalcémies

Hypercalcémie

- $[Ca^{2+}] > 2,6$ mmol/L ou $[Ca^{2+}]$ ionisée > 1,6 mmol/L :
 - hyperparathyroïdie : primaire (adénome ++) ou secondaire (lithium, insuffisance rénale chronique) ;
 - néoplasie 0 : hypercalcémie humorale (PTH rp) ou ostéolyse métastatique directe ;
 - granulomatose : sarcoïdose, tuberculose ;
 - insuffisance rénale aiguë ;
 - médicaments : vitamine D, vitamine A, thiazidiques, buveurs de lait (syndrome de Burnett) ;
 - endocrinopathies : insuffisance surrénale, phéochromocytome, thyrotoxicose ;
 - maladie de Paget, immobilisation.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

- Manifestations :
 - signes digestifs : anorexie, nausées, vomissements, iléus, pancréatite aiguë (rare) ;
 - signes neurologiques : syndrome confusionnel, coma, signes de localisation ;
 - signes cardiovasculaires : allongement PR, élargissement QRS, raccourcissement QT, troubles du rythme ventriculaire (rares), hypertension artérielle ;
 - signes urinaires : polyurie ;
 - déshydratation extracellulaire liée aux troubles digestifs et à la polyurie ++.
- Traitement :
 - l'hypercalcémie grave est une urgence, prise en charge en unité de surveillance continue pour suivi scopique 0 ;
 - réhydratation par sérum physiologique ++ 0 ;
 - biphosphonates ++, agissent avant la 48e h, nadir entre le 4e et le 9e jour 0 ;
 - calcitonine : agit dès la 2e h, nadir entre la 6e et la 9e h, réservée aux hypercalcémies très sévères en attente de l'efficacité des biphosphonates ;
 - corticoïdes : néoplasies, granulomatoses, intoxications à la vitamine D.

Hypocalcémie

- $[Ca^{2+}] < 2{,}2$ mmol/L ou $[Ca^{2+}]$ ionisée < 1,1 mmol/L :
 - hypoparathyroïdisme : postchirurgical surtout ;
 - déficits en vitamine D : carence d'apport, défaut d'exposition solaire, malabsorptions intestinales, syndrome néphrotique, affections familiales ;
 - insuffisance rénale chronique ;
 - dépôt de calcium : insuffisance rénale aiguë, lyse tumorale, rhabdomyolyse, pancréatites aiguës, métastases ostéocondensantes, *hungry bone syndrome*, transfusions massives de sang ou plasma citraté, foscarnet.
- Manifestations :
 - neuromusculaires : paresthésies, fasciculations, tétanie, signe de Chvostek, signe de Trousseau, comitialité ;
 - manifestations psychiatriques : anxiété, dépression, manifestations psychotiques ;
 - signes cardiovasculaires : hypotension, allongement QT, insuffisance cardiaque ;
 - manifestations cutanées (hypocalcémie chronique) : peau sèche, chute des cheveux, ongles cassants, eczéma, hyperpigmentation, cataracte.
- Traitement :
 - hypocalcémie modérée : sels de calcium *per os*, en moyenne 2 g/j ;
 - hypocalcémie sévère ou symptomatique : gluconate de calcium IV à 10 % (894 mg pour 100 mL) ou chlorure de calcium IV à 10 % (1 830 mg pour 100 mL) ; objectif : faire disparaître les signes neuromusculaires et remonter la calcémie au-dessus de 2 mmol/L ; en moyenne : 200 à 300 mg de calcium-élément IVL, puis 0,5 à 2 mg/kg/h de calcium-élément ;
 - hypocalcémie chronique : poursuite de la supplémentation orale du calcium en association avec un métabolite de la vitamine D.

Copyrighted material

ITEM 230

Coma non traumatique

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer un coma non traumatique.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 96 Méningites et méningo-encéphalites.

ITEM 123 Accidents vasculaires cérébraux.

ITEM 199 État confusionnel et trouble de conscience.

ITEM 206 Hypoglycémie.

ITEM 214 Principales intoxications aiguës.

CONSENSUS

- Prise en charge de l'état de mal épileptique – Conférence de consensus – SRLF, 23 juin 1995. www.srlf.org
- Prise en charge du sujet en état de mort encéphalique – Conférence d'experts – SRLF, SFAR, 2005. www.srlf.org

POUR COMPRENDRE...

- Le diagnostic de coma est clinique : altération de la vigilance (état de veille) et de la conscience (connaissance de soi et de son environnement).
- Le coma traduit une défaillance de la substance réticulée activatrice ascendante et/ou des hémisphères cérébraux.
- La prise en charge immédiate consiste à :
 - rechercher une défaillance respiratoire ou hémodynamique associée ;
 - assurer la liberté des voies aériennes supérieures ;
 - rechercher une hypoglycémie, qui justifierait l'administration immédiate de sérum glucosé à 30 %, le risque de séquelles neuropsychiques lourdes étant ici important ; 0
 - soupçonner une intoxication aux opiacés, justifiant l'administration immédiate de naloxone, le risque d'arrêt respiratoire étant ici important ; 0

Copyrighted material

0 – rechercher un purpura, justifiant l'administration immédiate d'une céphalosporine de 3e génération, le risque vital ou de séquelles neuropsychiques lourdes étant important dans le purpura fulminans ;

0 – reconnaître rapidement un engagement cérébral, justifiant une prise en charge neurochirurgicale urgente.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

■ **La vigilance** est un état de veille, évaluable par l'étude de l'ouverture des yeux aux stimuli douloureux. Son support neurophysiologique est la substance réticulée activatrice ascendante (SRAA) du tronc cérébral.

■ **La conscience** est la connaissance de soi et de son environnement, évaluable chez un sujet à la vigilance normale par l'analyse de la réponse verbale aux stimuli intellectuels et de la réponse motrice aux stimuli douloureux. Son support neurophysiologique est le cortex cérébral.

■ Physiologiquement, la formation réticulée a une fonction dite activatrice : elle « bombarde » le cortex d'informations qui maintiennent éveillé.

■ Le coma résulte :

– de lésions diffuses hémisphériques du cortex ou de la substance blanche, suffisantes pour léser les connexions entre cortex et formation réticulée : souffrance cérébrale diffuse fonctionnelle ou souffrance cérébrale focale sus-tentorielle étendue ;

– et/ou d'une lésion focale sous-tentorielle du tronc cérébral lésant le système d'activation de la formation réticulée.

II. CAUSES

À côté des **causes traumatiques** de coma (hématome extradural, hématome sous-dural, hématome intracérébral, contusion cérébrale, embolie graisseuse), les causes de coma sont diverses et parfois intriquées :

■ **coma toxique** ➤ ITEM 214 :

– médicaments sédatifs (benzodiazépines, barbituriques, carbamates, phénothiazines) ;

– opiacés ;

– alcool (l'intoxication pouvant être associée à une hypoglycémie et/ou un traumatisme crânien) ;

■ **coma métabolique** :

– anoxie cérébrale ;

– hypoglycémie : sueur, tachycardie, pâleur, signes d'irritation pyramidale, signes déficitaires localisés, comitialité ;

Copyrighted material

– hyponatrémie ;

– hyperosmolarité ;

– hypercalcémie, hypophosphorémie profonde ;

– alcalose métabolique ;

– encéphalopathie hépatique ;

– encéphalopathie rénale ;

– encéphalopathie respiratoire ;

– encéphalopathie de Gayet-Wernicke : par carence en vitamine B1, troubles de la vigilance avec paralysie oculomotrice, troubles de l'équilibre, syndrome cérébelleux. L'évolution vers le coma peut être précipitée par l'administration de sérum glucosé sans vitamine B1 ;

- **coma endocrinien** :

– coma myxœdémateux ;

– insuffisance surrénale aiguë ;

– décompensation diabétique : acidocétose diabétique et coma hyperosmolaire ;

- **épilepsie** :

– état de mal épileptique infraclinique ;

– coma postcritique ;

- **causes infectieuses** ITEM 96 :

– méningites ;

– encéphalites ;

– abcès cérébral et empyème ;

– neuropaludisme ;

– encéphalopathie des états septiques ;

- **causes vasculaires** ITEM 133 :

– hémorragie méningée ;

– hémorragie cérébrale ;

– infarctus cérébral ;

– thrombophlébite cérébrale ;

– vascularite cérébrale et microangiopathie thrombotique ;

– encéphalopathie hypertensive ;

- **causes tumorales** :

– tumeur primitive ;

– métastases.

Copyrighted material

III. DIAGNOSTIC

A. Diagnostic de coma

1. Diagnostic positif

- Altération de la vigilance (difficulté à l'ouverture des yeux).
- Altération de la conscience (difficultés aux réponses motrices et verbales).

2. Examen de la profondeur du coma

- Elle est appréciée le plus souvent par le score de Glasgow *(tableau 230-1)*, échelle allant de 3 à 15 (personne parfaitement consciente), et qui s'évalue sur trois critères : ouverture des yeux (O), réponse verbale (V), réponse motrice (M).

Tableau 230-1. Score de Glasgow.

O		V		M	
4	Spontanée	5	Orientée	6	À la parole
3	Au bruit	4	Confuse	5	Orientée : un mouvement de flexion du bras cherche à faire disparaître la cause de la douleur
2	À la douleur	3	Inappropriée : les mots restent compréhensibles	4	D'évitement : retrait rapide, éloignement face au stimulus douloureux
1	Aucune	2	Incompréhensible	3	En décortication : réponse en flexion lente aux membres supérieurs, en extension aux membres inférieurs
		1	Aucune	2	En décérébration : mouvement d'enroulement aux membres supérieurs, d'extension et flexion plantaire aux membres inférieurs
				1	Aucune

- On parle de coma pour les scores ≤ 7.
- L'évaluation est parfois rendue difficile par la présence de troubles phasiques ou sensitivomoteurs.
- La décortication, qui traduit une souffrance hémisphérique étendue souvent bilatérale, ou une souffrance diencéphalique, se manifeste par un mouvement de triple flexion des membres supérieurs et d'extension-flexion plantaire des membres inférieurs.
- La décérébration, qui traduit une souffrance du tronc cérébral à sa partie haute, se manifeste par un mouvement de pronation-extension des membres supérieurs (enroulement) et d'extension-flexion plantaire des membres inférieurs.

B. Diagnostic de localisation et de gravité neurologiques

1. Examen des yeux

Temps essentiel de l'examen neurologique, il permet de préciser le niveau lésionnel de l'atteinte neurologique et l'importance de la souffrance cérébrale :

Copyrighted material

■ **clignement à la menace** : traduit la persistance d'un certain degré d'activité corticale ;

■ **examen pupillaire** :

– myosis serré bilatéral : intoxications morphiniques, lésions protubérantielles ;

– myosis modéré bilatéral réactif : encéphalopathies toxiques ou métaboliques, lésion diencéphalique ;

– myosis unilatéral : souffrance du diencéphale (engagement central) ;

– pupilles intermédiaires aréactives : souffrance mésencéphalique ;

– mydriase bilatérale aréactive : souffrance irréversible du tronc cérébral (TC), encéphalopathie toxique ;

– mydriase unilatérale aréactive : atteinte du III homolatérale (engagement temporal) ;

■ **examen de la motricité oculaire** :

– position spontanée : strabisme externe (III), strabisme interne (VI), déviation oblique ou *squew deviation* (lésion du tronc cérébral), déviation conjuguée du regard (lésion hémisphérique : « le patient regarde sa lésion ») ;

– mouvements spontanés : errance du regard (le déplacement lent et conjugué des globes dans un sens puis l'autre traduit l'intégrité de la protubérance et du mésencéphale), mouvements alternatifs horizontaux ou verticaux, *ocular bobbing* (abaissement rapide, pause puis élévation lente des globes, qui traduit une atteinte protubérantielle), opsoclonies (mouvements rapides et anarchiques des globes : « bille de flipper », traduit une souffrance du tronc cérébral ou du cervelet), déviation forcée des yeux vers le bas (atteinte thalamique ou sous-thalamique) ;

– mouvements réflexes :

• réflexe oculocéphalique : réflexe normal (déplacement conjugué des globes en sens contraire d'un mouvement passif imprimé à la tête : phénomène des yeux de poupée). L'abolition du réflexe oculocéphalique horizontal traduit une lésion protubérantielle ou une atteinte fonctionnelle majeure (encéphalopathie toxique ou métabolique), l'abolition du réflexe oculocéphalique vertical traduit une lésion mésencéphalique ou une atteinte fonctionnelle majeure (encéphalopathie toxique ou métabolique) ;

• réflexe vestibulo-oculaire : réflexe normal (déviation horizontale du regard à la stimulation ipsilatérale du conduit auditif externe par irrigation d'eau froide). Une stimulation bilatérale à l'eau froide entraîne un abaissement des globes, une stimulation bilatérale à l'eau chaude entraîne une élévation. L'analyse des réflexes vestibulo-oculaires apporte les mêmes informations que celle des réflexes oculocéphaliques ;

Copyrighted material

• réflexe cornéen : réflexe normal (clignement de la paupière, le limbe cornéen étant effleuré). Son abolition unilatérale traduit une atteinte protubérantielle ipsilatérale. Son abolition bilatérale est un signe de profondeur du coma (dépression sévère du tronc cérébral) ;

• réflexe cornéoptérygoïdien : mouvement de diduction de la mâchoire vers le côté opposé à la stimulation cornéenne. Il signe une souffrance de la partie haute du tronc cérébral.

2. Examen de la motricité

■ Force segmentaire des membres et de la face à la demande ou à la stimulation douloureuse (pression du lit unguéal et manœuvre de Pierre Marie et Foix : compression du nerf facial derrière les maxillaires inférieurs).

■ Tonus de repos (mobilisation passive des membres), tonus postural (recherche d'une hypotonie en laissant tomber le membre supérieur ou inférieur sur le plan du lit), tonus axial par mobilisation de la nuque (recherche d'un syndrome méningé).

3. Examen des réflexes

■ Ostéotendineux.

■ Cutanés plantaires (recherche du signe de Babinski).

■ Du tronc cérébral *(tableau 230-2)* ; leur disparition progressive est étagée : ciliospinal puis fronto-orbiculaire, oculocéphalique vertical, photomoteur, cornéen, massétérin, oculocéphalique horizontal, oculocardiaque. Parmi ces réflexes, 5 ont été retenus pour une cotation, permettant lorsqu'elle est additionnée au score de Glasgow de déterminer le score de Glasgow-Liège sur une échelle de 3 (Glasgow = 3 et aucun réflexe du tronc) à 20.

4. Autres signes à rechercher

■ Recherche de mouvements anormaux :

– clonies des paupières (état de mal infraclinique) ;

– myoclonies (encéphalopathie postanoxique, médicamenteuse) ;

– mouvements tonicocloniques.

■ Recherche d'un syndrome méningé.

5. Examen de la respiration

■ Dyspnée de Cheyne-Stockes (respiration périodique faisant alterner des phases de polypnée croissante puis décroissante puis d'apnée) : souffrance diencéphalique ou hémisphérique bilatérale.

■ Hyperventilation neurogène centrale : souffrance protubérantielle haute ou mésencéphalique.

■ Respiration apneustique : pauses en inspiration traduisant une souffrance protubérantielle.

Copyrighted material

■ Respiration ataxique : rythme irrégulier et pauses précédant les « gasps » et l'arrêt respiratoire, et traduisant une souffrance bulbaire.

■ Syndrome d'ondine : perte complète de la respiration automatique traduisant une souffrance bulbaire.

■ La dyspnée de Küssmaul (respiration à 4 temps : inspiration-pause en inspiration-expiration-pause en expiration) s'observe dans les acidoses métaboliques et n'est pas particulièrement associée aux causes de coma en dehors de l'acidocétose diabétique.

Tableau 230-2. Réflexes du tronc cérébral.

Huit réflexes physiologiques du tronc cérébral		Score de Liège
Ciliospinal	Dilatation pupillaire après stimulation sus-claviculaire	
Fronto-orbiculaire	Fermeture palpébrale après percussion glabellaire	5
Oculocéphalique vertical	Mouvement conjugué des yeux dans le sens vertical, dans le sens inverse du mouvement imprimé de flexion/extension de la tête	4
Photomoteur	Contraction pupillaire par stimulation lumineuse	3
Cornéen	Fermeture de la paupière par stimulation cornéenne (arc réflexe V, VII)	
Massétérin	Contraction du masséter par percussion mentonnière	
Oculocéphalique horizontal	Mouvement conjugué des yeux dans le sens horizontal, dans le sens inverse du mouvement imprimé de rotation de la tête	2
Oculocardiaque	Ralentissement cardiaque après compression des globes oculaires	1
Deux réflexes pathologiques du tronc cérébral		
Palmomentonnier	Contraction de la houpe du menton par stimulation de l'éminence thénar homolatérale	
Cornéomandibulaire	Mouvement de diduction de la mandibule après stimulation de la cornée	

6. Mort encéphalique

Cette démarche peut aboutir au diagnostic de mort encéphalique.

CONSENSUS

Prise en charge du sujet en état de mort encéphalique
SRLF, SFAR, 2005

■ La mort encéphalique est définie comme la destruction irréversible de l'ensemble des fonctions cérébrales chez un sujet à cœur battant.

■ Elle est la conséquence d'un arrêt complet de la circulation cérébrale, qui supprime la commande centrale de la respiration, la régulation de l'homéostasie circulatoire (tachycardie, vasoplégie, dysfonction myocardique), thermique (hypothermie) et endocrinienne (diabète insipide, hyperglycémie).

Copyrighted material

■ En l'absence de facteurs confondants (hypothermie < 35 °C, imprégnation médicamenteuse ou toxique susceptible d'interférer avec l'examen clinique), le diagnostic repose sur :
– un coma non réactif ;
– une abolition des réflexes du tronc cérébral ;
– l'absence de ventilation spontanée, vérifiée par une épreuve d'hypercapnie (mise en évidence de l'absence de mouvements respiratoires et d'une hypercapnie lors du débranchement du ventilateur).
■ Dans l'optique du don d'organe, le diagnostic clinique de ME doit être confirmé soit par 2 EEG nuls et non réactifs, effectués à 4 heures d'intervalle, soit par une angiographie cérébrale objectivant l'arrêt de perfusion des quatre axes.
■ En cas de ME clinique, les méthodes de réanimation doivent être adaptées sans délai et la coordination hospitalière contactée, car ce patient est un « donneur potentiel ».
■ Un don d'organe est alors possible en l'absence de contre-indication générale (tumorale, infectieuse) et en l'absence d'opposition du vivant du patient (notion de consentement présumé).

IV. PRISE EN CHARGE

A. Procéder systématiquement aux premières mesures d'urgence

■ **Libération des voies aériennes :** nécessaire du fait d'une perte du tonus musculaire, et des réflexes de toux et de déglutition. Les voies aériennes peuvent être obstruées par la langue, les mucosités, les aliments, les corps étrangers :
– dégrafer les vêtements pouvant gêner la ventilation ;
– basculer la tête en surélevant le menton ;
– inspecter la cavité buccale et retirer les corps étrangers (aliments, prothèse dentaire) ;
– mettre en position latérale de sécurité ;
– l'intubation et la ventilation sont parfois nécessaires d'emblée.

0 ■ **Éliminer une hypoglycémie :** mesure de la glycémie capillaire à la recherche d'une hypoglycémie et le cas échéant administration de 20 mL de sérum glucosé à 30 % en IV (administration systématique en l'absence de moyens disponibles pour mesurer la glycémie capillaire) ➤ ITEM 206.

0 ■ **Éliminer une intoxication aux opiacés :** recherche de traces de piqûres et d'un syndrome opioïde (bradypnée et apnées, myosis serré bilatéral, nausées, vomissements, iléus, prurit, bradycardie, hypotension), justifiant l'administration d'un traitement antagoniste par naloxone.

0 ■ **Rechercher un purpura :** fait suspecter le diagnostic de purpura fulminans et justifie l'administration immédiate d'une céphalosporine de 3^{e} génération.

0 ■ **Éliminer un traumatisme crânien :** recherche systématique d'une plaie du scalp, d'un traumatisme de la face (ecchymose, otorragie, rhinorrhée), d'un intervalle libre. Un scanner cérébral avec fenêtres osseuses est toujours justifié en cas de doute.

■ Traiter un état de mal épileptique.

Copyrighted material

CONSENSUS

Prise en charge de l'état de mal épileptique (EME)
SRLF, 1995

- État caractérisé par une crise d'épilepsie qui persiste suffisamment longtemps ou qui se répète à des intervalles suffisamment brefs pour créer une condition fixe et durable.
- Il peut être :
 - convulsif (constatation de 3 crises successives sans reprise de conscience ou activité convulsive > 5-10 minutes) et mettre alors rapidement en jeu le pronostic vital et fonctionnel ;
 - ou non convulsif (infraclinique) et se présenter sous la forme d'un état confusionnel.
- L'objectif du traitement est d'atteindre rapidement des concentrations cérébrales adéquates d'antiépileptique (AE), et de les maintenir jusqu'à cessation des crises.
- La voie veineuse et la voie rectale (chez l'enfant) sont les seules adaptées.
- Premier temps de prise en charge (0-30 min) :
 - AE de courte durée : diazépam 10 mg ou clonazépam 1 mg IV ;
 - associé à un AE d'action prolongée : phénytoïne, 18 mg/kg IV (CI si insuffisance coronarienne, bradycardie, BAV) ou phénobarbital, 15 mg/kg IV (dépresseur respiratoire) ;
 - et des mesures générales : prévention des traumatismes, liberté des voies aériennes, oxygénothérapie, lutte contre l'hyperthermie, contrôle glycémique. L'intubation, non systématique, s'impose si détresse respiratoire, altération profonde et prolongée de la conscience.
- Deuxième temps (30 à 50 min) : si l'EME persiste, augmentation de la posologie de l'AE d'action prolongée initialement choisi.
- Troisième temps (50 à 80 min) : l'échec des AE d'action prolongée fait envisager l'anesthésie barbiturique par thiopental sous ventilation mécanique. En raison de son retentissement cardiocirculatoire, des alternatives sont proposées : administration de l'AE d'action prolongée (phénytoïne, phénobarbital) non utilisé au préalable ; utilisation d'autres AE comme le clométhiazole ou d'autres anesthésiques non barbituriques.

B. Mettre le patient en condition

- Oxygénothérapie.
- Mise en place d'une voie veineuse (et administration de 100 mg de vitamine B1 IV dans l'hypothèse d'une encéphalopathie de Wernicke). [0]
- Mise en place d'une sonde nasogastrique en aspiration douce.
- Monitorage des constantes vitales.
- Débuter tôt les mesures préventives :
 - des complications de décubitus : nursing, matelas anti-escarres, anticoagulation préventive ;
 - des complications cornéennes : soins des yeux ;
 - des complications buccales : soins de bouche ;
 - sondage urinaire, évacuation d'un fécalome ;
 - de l'ulcère de stress.

Copyrighted material

C. Faire le diagnostic de la cause et la traiter spécifiquement

- **Bilan d'anamnèse poussé auprès de l'entourage** (antécédents, circonstances, mode d'installation).
- **Examen clinique général.**
- **Examens biologiques** :
 - ionogramme sanguin, urée et créatinine plasmatiques, glycémie, calcémie, phosphorémie, uricémie, CPK ;
 - gaz du sang et lactates artériels ;
 - numération-formule sanguine ;
 - alcoolémie, dosage de toxiques, de l'HbCO ;
 - ammoniémie ;
 - bilan thyroïdien, cortisolémie.
- **Bilan radiologique** :
 - **scanner cérébral :** devant tout coma sans cause retrouvée, dès qu'il existe un doute sur un traumatisme, dès qu'il existe des signes de localisation, chez l'alcoolique dont l'état neurologique ne s'améliore pas ;
 - **radiographie thoracique :** à la recherche d'une pneumopathie d'inhalation.
- **Électroencéphalogramme :** apprécie la profondeur du coma, recherche une comitialité (pointes-ondes permanentes). Il oriente parfois le diagnostic étiologique : encéphalopathie métabolique ou médicamenteuse (ondes lentes diffuses), hépatique (éléments triphasiques périodiques), herpétique (pointes-ondes périodiques frontotemporales). Il fait le diagnostic de mort encéphalique (EEG plat). L'asymétrie fait suspecter une lésion focale.
- **Ponction lombaire :** en cas de fièvre et/ou de syndrome méningé et/ou de signes encéphalitiques préalables au coma.
- **Potentiels évoqués :** peuvent avoir un intérêt pronostique notamment au cours d'encéphalopathie postanoxique et du traumatisme crânien.

D. Rechercher un diagnostic différentiel

- ***Locked-in syndrome*** ou syndrome de désafférentation motrice : quadriplégie avec diplégie faciale, paralysie labio-glosso-laryngo-pharyngée et paralysie de la latéralité du regard. Il est lié à un infarctus protubérantiel : la partie haute du tronc cérébral est respectée, les mouvements de verticalité du regard et les mouvements d'ouverture des yeux sont conservés. Les hémisphères étant respectés, la vigilance et la conscience sont normales.
- **Aphasie.**
- **Aréactivité psychogène :** conversion hystérique, simulation, mélancolie, catatonie.
- **Syndrome de Gélineau :** narcolepsie (accès de sommeil), catalepsie (chute du tonus).

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Coma non traumatique

■ Le **diagnostic** de coma est clinique : altération de la vigilance (état de veille : évalué par l'ouverture des yeux) et de la conscience (connaissance de soi et de son environnement : évaluée par les réponses verbales et motrices).
■ Les **causes**, en dehors du traumatisme crânien, sont : toxiques, métaboliques, endocriniennes, liées à une épilepsie, liées à une infection neuroméningée, vasculaires, tumorales.
■ Le **bilan neurologique** complet comprend :
– la détermination du score de Glasgow 0 ;

Tableau 230-3. Score de Glasgow.

Ouverture des yeux		Réponse verbale		Réponse motrice	
4	spontanée	5	orientée	6	à la parole
3	au bruit	4	confuse	5	orientée
2	à la douleur	3	inappropriée	4	d'évitement
1	aucune	2	incompréhensible	3	en décortication
		1	aucune	2	en décérébration
				1	aucune

– l'examen pupillaire 0 : mydriase unilatérale (engagement temporal), mydriase bilatérale (souffrance irréversible du TC), myosis serré bilatéral (intoxication morphinique) ;
– la recherche d'une disparition des réflexes du tronc cérébral 0 : d'abord ciliospinal puis fronto-orbiculaire, oculocéphalique vertical, photomoteur, cornéen, massétérin, oculocéphalique horizontal, oculocardiaque ;
– l'examen du tonus, de la force motrice segmentaire testée par un stimulus douloureux (pression du lit unguéal et manœuvre de Pierre Marie et Foix), des réflexes, la recherche de mouvements anormaux ;
– la recherche d'un syndrome méningé 0 ;
– l'examen de la respiration.
■ Ce bilan peut aboutir au diagnostic de mort encéphalique : coma non réactif, abolition des réflexes du tronc cérébral, absence de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie, EEG plat.
■ Les mesures d'urgence comprennent :
– la libération et protection des voies aériennes ;
– la recherche d'une hypoglycémie 0 ± G30 % IV, 20 mL ;
– la recherche d'une intoxication aux opiacés 0 ± *Naloxone* IV ;
– la recherche d'un purpura 0 ± C3G IV ;
– la recherche d'un traumatisme crânien 0 ± TDM cérébrale et avis neurochirurgical ;
– la recherche d'un état de mal épileptique : BZP d'action courte IV + antiépileptique d'action prolongée IV (phénytoïne ou phénobarbital).
■ Les autres mesures sont :
– oxygénothérapie ;
– mise en place d'une voie veineuse et administration de 100 mg de vitamine B1 ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– mise en place d'une sonde nasogastrique, d'une sonde urinaire ;
– monitorage des constantes vitales ;
– prévention des complications de décubitus, cornéennes, de l'ulcère de stress.

■ Le bilan comprend :
– une TDM cérébrale si coma sans cause retrouvée, doute sur un traumatisme, signes de localisation, chez un alcoolique dont l'état neurologique ne s'améliore pas 0 ;
– une radiographie thoracique : à la recherche d'une pneumopathie d'inhalation ;
– un électroencéphalogramme : recherche surtout une comitialité infraclinique ;
– une ponction lombaire en cas de fièvre et/ou de syndrome méningé 0.

Copyrighted material

ITEM 252

Insuffisance rénale aiguë – Anurie

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIFS

- Diagnostiquer une insuffisance rénale aiguë et une anurie.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 200 État de choc.

ITEM 216 Rétention aiguë d'urine.

ITEM 218 Syndrome prééclamptique.

ITEM 219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydroélectrolytiques.

ITEM 264 Néphropathie glomérulaire.

ITEM 310 Élévation de la créatininémie.

ITEM 328 Protéinurie et syndrome néphrotique chez l'enfant et chez l'adulte.

Sujets tombés aux concours de l'Internat et aux ECN : 1995, 1996, 2004

Sujets tombés

- 1995, interrégion Nord, dossier 9 :

Un sujet de 66 ans présente l'histoire clinique suivante : - en 1974, découverte d'une hypertension artérielle (ses deux parents directs sont hypertendus) ; - cette même année, néphrectomie droite d'un rein atrophique alors que le rein gauche présente une jonction pyélo-urétérale dite " limite " avec un bassinet et des tiges calicielles dilatées : - résection en 1982 de cette jonction pyélo-urétérale, la créatinine plasmatique est alors à 96 µmol/L. L'hypertension artérielle persiste non modifiée par les deux interventions, elle est parfaitement corrigée par une association diurétique-bêtabloquant ; - en décembre 1994, le sujet se présente avec une tension artérielle qui n'est plus normalisée. La minima varie entre 100 et 105 mm de mercure. Le fond d'œil montre des signes importants de sclérose artérielle, des signes du croisement, sans hémorragie ni exsudat. L'échographie montre l'absence de calcul rénal, une dilatation modérée du bassinet, l'absence de résidu vésical après miction. Le diamètre vertical du rein gauche est de 110 mm. La créatinine plasmatique est à 170 µmol/l ; clairance insuline : 50 mL/min ; clairance PAH : 210 mL/min ; fraction filtrée : 0,24. Une artériographie rénale est pratiquée le 18 décembre 1994 (l'iconographie était fournie). Des clichés tardifs visualisent la voie excrétrice. Le 10 janvier 1995, le sujet revient dans le service. La pression artérielle est à 130/72, le sujet reçoit depuis décembre 1994 furosémide (*Lasilix*) 80 mg/j et énalapril (*Rénitec*) 10 mg/j. La créatinine plasmatique est alors à 550 µmol/L, l'acide urique à 570 µmol/L, potassium 5,4, calcium 2,47, phosphore 1,29 mmol/L.

1) Quels sont les deux éléments du résumé d'observation qui pouvaient faire prévoir l'absence d'amélioration de la pression artérielle par la néphrectomie en 1974 ?

2) Quelles sont les causes anatomiques possibles de dégradation de la fonction rénale qui ont été recherchées en décembre 1994 par l'imagerie ? L'une de ces causes est-elle confirmée par cette imagerie ?

3) Quelles sont les causes possibles de dégradation de la fonction rénale entre décembre 1994 et janvier 1995 ?

4) Par quels moyens peut-on tenter de les mettre en évidence (en tenant compte du contexte) ?

5) En l'absence de réversibilité de l'insuffisance rénale, quelles sont les mesures générales à visée thérapeutique à entreprendre ?

Copyrighted material

- 1996, interrégion Sud, dossier 3 :

Un patient âgé de 63 ans présente depuis plusieurs mois une détérioration de l'état général avec nausées fréquentes. Il se plaint également de douleurs osseuses principalement rachidiennes. Il ne prend aucun traitement particulier. Sa tension artérielle est à 140/80 mm de Hg. Le patient est légèrement déshydraté. Dans ce contexte, un bilan biologique est réalisé : numération formule sanguine : globules rouges 2,5 millions/mm^3, hémoglobine 8,2 g/dL, globules blancs 9 500/mm^3, plaquettes sanguines 180 000/mm^3. Ionogramme sanguin : kaliémie 4,7 mEq/L, natrémie 142 mEq/L. Créatininémie 486 µmol/L, urée sanguine 23,6 mmol/L, protidémie 80 g/L, albuminémie 42 g/L, calcémie 2,52 mmol/L, phosphorémie 1,78 mmol/L. Dans les urines : protéinurie des 24 heures : 1,4 g/24 h. Radiographie de thorax : normale.

1) Que penser de la calcémie ?

2) Quel diagnostic évoquez-vous ?

3) Quels sont les examens à demander pour confirmer votre diagnostic ?

4) Quels sont les différents mécanismes possibles de l'atteinte rénale ?

5) Quelles sont les mesures thérapeutiques à prendre dans l'immédiat ?

- 2004, dossier 8 :

Patiente de 80 ans, apparition progressive d'œdèmes des membres inférieurs, prise de poids, pression artérielle à 100/65 mmHg ; pas de diabète, aucun médicament sauf furosémide depuis 8 jours. Échographie rénale : 2 reins de 14 cm de grand axe sans dilatation. Échographie cardiaque : discrète dilatation, fonction systolique normale. Examens biologiques : glucose = 4,4 mmol/L, Na = 129 mmol/L, K = 3,7 mmol/L, Cl = 94 mmol/L, HCO_3 = 24 mmol/L, Ca = 1,84 mmol/L, P = 1,94 mmol/L, protéines = 60 g/L, albumine = 10 g/L, urée = 34 mmol/L, créatinine = 322 µmol/L, uricémie = 840 µmol/L, bilirubine totale = 15 µmol/L, ASAT = 27 UI/mL, ALAT = 15 UI/mL, phosphatases alcalines = 106 UI/mL, CPK = 24 UI/mL, CRP = 24 mg/L, cholestérol total = 11,5 mmol/L, triglycérides = 1,43 mmol/L. L'électrophorèse des protéines plasmiques était fourniz. Dans les urines : protéinurie à 3,5 g/24 h, hématies = 3 000/mm^3, leucocytes = 4 000/mm^3.

1) Quel est le mécanisme des œdèmes dans ce cas ?

2) Quel diagnostic syndromique les anomalies du bilan biologique vous permettent-elles d'évoquer ?

3) Comment interpréter la calcémie ?

4) Interprétez l'électrophorèse des protéines urinaires et l'électrophorèse des protéines plasmatiques.

5) Quelle prescription médicamenteuse lui proposez-vous ?

6) Devant ces anomalies est réalisée une ponction-biopsie rénale. Quelles sont les contre-indications à rechercher et quelles complications peut-on en craindre ?

7) La biopsie rénale ne montre pas de prolifération cellulaire glomérulaire ou interstitielle, mais des dépôts intraglomérulaires et intra-artériels positifs pour le rouge Congo et la thioflavine. L'immunofluorescence met en évidence des dépôts de chaînes légères de type Lambda. Quel est le type histologique de l'atteinte rénale ?

8) Quelles sont les autres localisations possibles de cette affection ?

9) Quel traitement symptomatique proposez-vous ?

CONSENSUS

- Protection rénale péri-opératoire – Conférence de consensus – SFAR, 14 septembre 2004. www.sfar.org

- Prévention de l'insuffisance rénale induite par les produits de contraste iodés – Recommandations pour la pratique clinique – SFR, CIRTACI, 16 décembre 2004. www.sfrnet.org

POUR COMPRENDRE...

■ L'insuffisance rénale aiguë (IRA) se définit comme l'incapacité brutale du rein à éliminer des déchets métaboliques et à maintenir l'homéostasie hydroélectrolytique. En pratique, l'IRA est décrite comme la baisse brutale de la filtration glomérulaire.

■ L'IRA est une pathologie fréquente (1 % des admissions hospitalières, 20 % des admissions en réanimation). Les sujets âgés y sont particulièrement susceptibles. La mortalité de l'IRA varie beaucoup selon le mécanisme à son origine.

Copyrighted material

- On distingue 3 mécanismes d'IRA pouvant parfois être intriqués :
 - l'IRA prérénale, la plus fréquente (50 %), liée à une diminution du flux sanguin rénal sans lésion histologique ;
 - l'IRA rénale (45 %), liée à une atteinte organique : tubulaire, interstitielle, glomérulaire, vasculaire, l'atteinte tubulaire étant la plus fréquente ;
 - l'IRA postrénale (5 %), liée à une obstruction des voies urinaires.
- Toute insuffisance rénale chronique peut être aggravée par un facteur de décompensation prérénal, rénal ou postrénal.
- La conduite à tenir est urgente et repose sur :
 - la recherche de signes de gravité (hyperkaliémie, acidose métabolique, œdème pulmonaire hydrostatique), pouvant justifier une admission en unité de soins intensifs et la réalisation d'une expuration extra-rénale (EER) immédiate ;
 - la recherche d'une obstruction, justifiant une évacuation urinaire rapide ;
 - la recherche d'arguments cliniques et biologiques pour une hypovolémie, justifiant une expansion volémique ;
 - la recherche d'arguments cliniques, biologiques et parfois histologiques pour une néphropathie, pour laquelle la mise en route d'un traitement spécifique en urgence diminue le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique.
- Ces urgences étant éliminées, un interrogatoire minutieux doit rechercher l'exposition à un traitement néphrotoxique, cause majeure d'IRA.

I. PHYSIOPATHOLOGIE

Le débit de filtration glomérulaire (DFG) dépend :

- de la différence de pression efficace entre le capillaire et la chambre urinaire du glomérule ;
- du coefficient de filtration glomérulaire (Kf), qui intègre la perméabilité et la surface de la membrane glomérulaire.

La relation entre ces paramètres est exprimée par :

- DFG = Kf [(Pcap – Pu) – (πcap)] ;
- où : Pcap = pression capillaire glomérulaire, Pu = pression de la chambre urinaire de Bowman, πcap = pression oncotique capillaire glomérulaire.

Le capillaire glomérulaire est très particulier : situé entre 2 artérioles, la pression (Pcap) qui y règne dépend du débit sanguin rénal et de la différence de pression entre l'artériole afférente et l'artériole efférente.

On distingue ainsi trois grands types d'IRA : prérénale, rénale et postrénale.

Copyrighted material

A. IRA fonctionnelle ou prérénale

■ La diminution du DFG est liée à :

– une diminution de la Pcap par diminution du débit sanguin rénal et/ou augmentation des résistances artériolaires afférentes et/ou diminution des résistances artériolaires efférentes ;

– une augmentation de la πcap.

■ L'hypoperfusion capillaire glomérulaire qui en résulte active la sécrétion de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire (cellules myoépithéliales de l'artériole afférente). L'angiotensinogène (d'origine hépatique) est transformé en angiotensine I par la rénine. L'angiotensine I est convertie en angiotensine II par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone par la corticosurrénale.

■ Parallèlement, l'hypotension artérielle et/ou l'hypovolémie, souvent présentes dans ces situations, activent la libération d'hormone antidiurétique (ADH) par la posthypophyse.

■ L'urine est donc peu abondante, pauvre en sodium, riche en potassium et acide, très concentrée en osmoles. La réabsorption d'eau par le tubule collecteur s'accompagne d'une réabsorption passive d'urée, expliquant l'augmentation plus importante de l'urée plasmatique que de la créatininémie.

B. IRA obstructive ou postrénale

■ La diminution du DFG est liée à une augmentation de la Pu.

■ L'IRA apparaît pour un obstacle bilatéral ou unilatéral sur rein unique.

■ L'obstacle entraîne une anurie.

■ Une diurèse peut cependant persister du fait d'un obstacle incomplet ou plus rarement d'un diabète insipide néphrogénique en cas d'obstacle incomplet chronique à l'origine d'une atteinte tubulaire distale.

C. IRA parenchymateuse ou intrarénale

Elle est liée à des lésions anatomiques des différentes structures du rein :

■ nécrose tubulaire aiguë (NTA) : la réduction du DFG s'explique par diminution de la Pcap (vasoconstriction des artérioles afférentes) et par une augmentation de la Pu (accumulation intratubulaire de débris cellulaires). La réduction du DFG est souvent majeure, responsable d'une anurie ;

■ néphropathie interstitielle aiguë : la réduction du DFG est liée à un œdème interstitiel responsable d'une augmentation de la Pu, le rein étant situé dans un espace clos limité par une capsule ;

■ néphropathie glomérulaire aiguë : la réduction du DFG est liée à la réduction de Kf (essentiellement par réduction de la surface de filtration) ;

Copyrighted material

■ néphropathie vasculaire aiguë : la réduction du DFG est liée à une diminution de la Pcap par réduction du débit sanguin rénal.

II. CAUSES

A. Causes de l'IRA prérénale ITEM 200

■ **Hypovolémie vraie :** hémorragie, pertes hydrosodées digestives, rénales, cutanées, 3e secteur, hypoalbuminémie.

■ **Hypovolémie relative** (vasoplégie) : choc septique, choc anaphylactique, traitements antihypertenseurs, traitements anesthésiques.

■ **Diminution du débit cardiaque :** insuffisance cardiaque, choc cardiogénique, choc hypovolémique.

■ **Vasoconstriction des artérioles afférentes :** anti-inflammatoires non stéroïdiens (inhibant la production rénale des prostaglandines vasodilatatrices), ciclosporine, tacrolimus, produits de contraste iodés, amphotéricine B, syndrome hépatorénal.

SYNDROME HÉPATORÉNAL (SHR)

■ IRA fonctionnelle compliquant une cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire et hypertension portale, en l'absence d'état de choc, de pertes digestives ou rénales, de traitement néphrotoxique, et ne s'améliorant pas après expansion volémique.

■ Le mécanisme est une vasodilatation splanchnique induite par l'hypertension portale, responsable d'une réponse neuro-hormonale vasoconstrictrice s'exprimant au niveau rénal.

■ On distingue 2 types de SHR : le SHR de type 1, défini par une IRA sévère et rapidement évolutive (< 15 jours) et dont la médiane de survie spontanée est de 15 jours, et le SHR de type 2, caractérisé par une IRA moins sévère et d'évolution plus lente, dont la médiane de survie spontanée est de 6 mois.

■ Le seul traitement est la transplantation hépatique ; les autres thérapeutiques (épuration extra-rénale, techniques de shunt portosystémiques pour réduire l'hypertension portale, traitement vasoconstricteur splanchnique par analogues de la vasopressine associé à une expansion volémique par albumine) sont des traitements d'attente.

■ **Vasodilatation des artérioles efférentes :** inhibiteurs de l'enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine par inhibition de la production d'aldostérone vasoconstrictrice ; une IRA se produit en cas de sténose bilatérale des artères rénales, de sténose unilatérale sur rein unique, de déshydratation préalable, d'utilisation concomitante d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Copyrighted material

■ **Augmentation de la pression oncotique capillaire :** situation rare rencontrée lors de l'administration de molécules osmotiquement actives (mannitol, macromolécules), et au cours du syndrome d'hyperviscosité du myélome.

Les patients âgés sont particulièrement susceptibles à l'IRA fonctionnelle du fait d'une prédisposition à l'hypovolémie (diminution de la sensation de soif, diminution de l'accès à l'eau, traitement diurétique, régime sans sel) et de la fréquence élevée de l'athéromatose de l'artère rénale. L'utilisation de médicaments modifiant l'hémodynamique rénale doit être prudente chez eux.

0 Lorsqu'elle n'est pas prise en charge, l'IRA fonctionnelle évolue en IRA organique par nécrose tubulaire aiguë ischémique.

B. Causes de l'IRA postrénale ITEM 216

L'IRA est liée à une obstruction du système collecteur à n'importe quel niveau (bassinet, uretère, vessie, urètre), par :

■ une lithiase ;

■ un caillotage lors d'une hématurie ;

■ une tumeur : hypertrophie bénigne et cancer prostatique, cancer des voies urinaires, cancer colique, cancer génital chez la femme, adénopathies rétropéritonéales compressives ;

■ une fibrose rétropéritonéale, idiopathique ou secondaire : médicaments (dérivés de l'ergot de seigle, bêtabloquant), néoplasie (carcinome colique, rectal, gastrique, mammaire, prostatique, tumeur carcinoïde du grêle), inflammation (anévrisme inflammatoire de l'aorte abdominale, colopathie inflammatoire), traumatisme rétropéritonéal, radiothérapie, infection (tuberculose, actinomycose, histoplasmose), maladie systémique (maladie de Wegener, polyarthrite rhumatoïde) ;

■ une nécrose papillaire : pyélonéphrite chez un diabétique, drépanocytose ;

■ une bilharziose ou une tuberculose des voies urinaires.

C. Causes de l'IRA intrarénale

1. Nécrose tubulaire aiguë

Elle est le plus souvent ischémique mais peut être toxique :

■ ischémie : secondaire à une IRA fonctionnelle prolongée. Le flux sanguin rénal représente 25 % du débit cardiaque et est principalement dirigé vers le cortex afin de préserver la filtration glomérulaire. Une baisse du flux sanguin rénal expose fortement la médullaire rénale à l'hypoxie ;

■ précipitation tubulaire de cristaux insolubles :

– médicaments : produits de contraste, méthotrexate, aciclovir, sulfamides, indinavir, triamtérène ;

Copyrighted material

– acide urique : syndrome de lyse tumorale ;

– oxalate de calcium : intoxication à l'éthylène glycol ;

■ précipitation tubulaire de chaînes légères d'immunoglobulines : myélome.

INSUFFISANCE RÉNALE AU COURS DU MYÉLOME*

* Concours Internat 1997 ; ECN 2004

■ Prérénale, par déshydratation fréquente au cours du myélome : vomissements lors d'une hypercalcémie, tubulopathie avec perte de sel (dont le syndrome de Toni-Debré-Fanconi), insuffisance surrénalienne par infiltration amyloïde des surrénales, syndrome d'hyperviscosité responsable d'une augmentation significative de la pression oncotique.

■ Rénale, essentiellement par : précipitation intratubulaire de cylindres myélomateux, composés de chaînes légères d'immunoglobulines (kappa ou lambda) et de la protéine tubulaire de Tamm-Horsfall, les conditions favorisantes étant l'hypovolémie, un pH urinaire acide, une hypercalciurie, l'injection de produits de contraste iodés ; plus rarement par : dépôt sur les membranes basales glomérulaires et tubulaires de chaînes légères et/ou de chaînes lourdes (maladie de Randall), amylose AL caractérisée par le dépôt glomérulaire extracellulaire d'agrégats de protéines insolubles organisés en feuillets δ-plissés, cryoglobulinémie de type II responsable d'une glomérulonéphrite membranoprolifération, syndrome de lyse tumorale.

■ Postrénale : rares lithiases calciques.

■ La prévention et le traitement reposent sur la correction de toute hypovolémie, l'éviction des médicaments néphrotoxiques, l'alcalinisation des urines et l'éviction des produits de contraste iodés en cas d'excrétion d'une protéinurie de Bence-Jones (protéine composée de monomères et de dimères de chaînes légères précipitant à 56 °C et se redissolvant à ébullition), la correction de l'hypercalcémie, l'épuration extra-rénale transitoire ou définitive, la prévention du syndrome de lyse tumorale.

■ La dysfonction rénale n'altère pas la survie au cours du myélome.

■ précipitation tubulaire de pigments :

– rhabdomyolyse : précipitation de myoglobine ;

– hémolyse intravasculaire : précipitation d'hémoglobine ;

■ médicaments néphrotoxiques par lésions tubulaires directes : aminosides, produits de contraste, amphotéricine B, méthotrexate, cisplatine, foscarnet, pentamidine, métaux lourds, immunoglobulines intraveineuses, inhibiteurs de la protéase du VIH ;

■ coagulation intravasculaire disséminée.

Copyrighted material

L'évolution habituelle de l'IRA par nécrose tubulaire, lorsque la cause a été traitée, est celle d'une reprise progressive de la fonction rénale après un délai de 1 à 3 semaines nécessaire à la restitution *ad integrum* de l'épithélium tubulaire. La créatininémie diminue alors progressivement pour revenir à sa valeur normale en 4 à 6 semaines. La phase de reprise de diurèse est souvent polyurique.

2. Néphropathie interstitielle aiguë

- Immunoallergique : pénicilline, céphalosporine, allopurinol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, sulfamides, diurétiques, rifampicine, ciprofloxacine, cimétidine, tétracycline, phénytoïne.
- Infectieuse : pyélonéphrite bilatérale ou unilatérale sur rein unique, septicémie avec greffe rénale, leptospirose, légionellose, infection à mycoplasme, brucellose, fièvre hémorragique (virus Hantaan), CMV, EBV.
- Infiltrative : hémopathie, maladie de système.

3. Néphropathie glomérulaire aiguë ➤ ITEM 264

Les étiologies sont nombreuses. L'IRA au cours des glomérulopathies est surtout le fait des prolifération endocapillaires ou des dépôts endomembraneux (responsables d'un syndrome néphritique) et des prolifération extracapillaires (responsables d'un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive). Les autres atteintes glomérulaires (à l'origine d'un syndrome néphrotique) sont plus rarement associées à une IRA (le syndrome néphrotique est alors dit impur).

a) Syndrome néphrotique impur

Il associe un syndrome néphrotique (protéinurie > 3 g/24 h, hypoalbuminémie < 30 g/L, hypoprotidémie < 60 g/L) et un élément clinique définissant le caractère impur et pouvant être une IRA (mais aussi une HTA, une hématurie). Il est lié à des glomérulonéphrites non prolifératives :

- néphropathie à lésions glomérulaires minimes, le plus souvent primitive, rarement secondaire à un contexte atopique, la maladie de Hodgkin, les AINS ; sa présentation classique est le syndrome néphrotique pur sans insuffisance rénale ;
- hyalinose segmentaire et focale (HSF), le plus souvent primitive, rarement secondaire : VIH, héroïnomanie ;
- glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM), le plus souvent primitive, parfois secondaire : néoplasie (poumon, côlon, sein, lymphome), infection (HBV, syphilis, filariose, bilharzioze), inflammation (lupus), toxique (sels d'or, D-pénicillamine, captopril, lithium) ;

Copyrighted material

- amylose rénale immunoglobulinique AL ou AA des maladies inflammatoires ou infectieuses* ;
- néphropathie diabétique ;
- maladie de Berger (dépots mésengiaux d'IgA).

b) Syndrome néphritique

Il est caractérisé par un début brutal, une IRA, une hypertension artérielle, des œdèmes périphériques, parfois un œdème pulmonaire hydrostatique et un œdème cérébral, et une protéinurie parfois néphrotique. Il est lié à des glomérulonéphrites avec prolifération endocapillaire :

- glomérulonéphrite membranoproliférative primitive ou secondaire à une infection (HCV, endocardite bactérienne), une maladie systémique (lupus), une hémopathie (lymphome, leucémie lymphoïde chronique) ;
- glomérulonéphrite aiguë postinfectieuse, le plus souvent post-infection ORL à streptocoque β-hémolytique ;
- lupus érythémateux systémique et autres connectivites ;
- cryoglobulinémie mixte essentielle.

c) Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressif

Il associe une hématurie macroscopique, l'absence habituelle d'hypertension artérielle, une insuffisance rénale d'aggravation rapide. C'est une urgence médicale, une indication impérative à la ponction-biopsie rénale (PBR), à la recherche d'une prolifération extracapillaire réalisant des croissants cellulaires. L'analyse en immunofluorescence oriente le diagnostic et permet de diagnostiquer :

- le type I : glomérulonéphrite à dépôt linéaire d'immunoglobulines IgG (Ac antimembrane basale glomérulaire) ou syndrome de Goodpasture (syndrome pneumorénal associant une hémorragie intra-alvéolaire et une IRA) ;
- le type II : dépôt granuleux d'immunoglobulines (IgG et C3), qui peut compliquer une glomérulonéphrite postinfectieuse, lupique, un purpura rhumatoïde, une cryoglobulinémie, une glomérulonéphrite primitive (GEM, GMP, néphropathie à dépots mésangiaux d'IgA) ;
- le type III (glomérulonéphrite pauci-immune) :
 – granulomatose de Wegener : atteinte des voies aériennes supérieures (sinusite, ulcérations de la muqueuse nasale, trachéite), pulmonaire (nodules excavés, infiltrats, hémoptysies). Présence de c-ANCA anti-PR3 (fluorescence cytoplasmique) ;
 – polyangéite microscopique : hémoptysies, IRA. Présence de p-ANCA anti-MPO (fluorescence périnucléaire).

Copyrighted material

INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË ET VIH

■ Néphropathie du VIH ou HIVAN *(HIV-associated nephropathy)* : maladie rénale progressive du glomérule et du tissu tubulo-interstitiel affectant principalement les sujets masculins de race noire au stade Sida ; évolution en quelques semaines ou quelques mois vers l'insuffisance rénale terminale. La protéinurie est parfois néphrotique. L'échographie montre des reins d'échogénicité normale et de grande taille. La PBR confirme le diagnostic en montrant une forme sévère de hyalinose segmentaire et focale. Le traitement repose sur les IEC, les associations d'antirétroviraux et les corticoïdes.

■ Microangiopathie thrombotique : un syndrome hémolytique et urémique (SHU) peut survenir chez des sujets profondément immunodéprimés, souvent associé à une infection à cytomégalovirus.

■ IRA médicamenteuse : nécrose tubulaire aiguë par toxicité tubulaire (aminosides, pentamidine, ténofovir ou aciclovir) ou cristallurie (sulfanomides, indinavir, aciclovir en bolus et ciclosporine), néphrite interstitielle (triméthoprime-sulfaméthoxazole). L'indinavir précipite dans les urines alcalines et la symptomatologie fonctionnelle de la cristallurie induite par l'indanavir est bruyante, à type d'obstacle urinaire.



4. Néphropathie vasculaire aiguë*

Elle est liée à une atteinte des vaisseaux de gros calibre ou de moyen et petit calibre :

■ atteinte des vaisseaux de gros calibre :

– thromboses et embolies des artères rénales (lombalgies, fièvre, HTA, hématurie) : embolies cruoriques, embolies de cholestérol, thrombose d'un anévrisme de l'aorte étendue aux artères rénales, dissection aortique étendue aux artères rénales ;

– thrombose des veines rénales (lombalgies, gros rein douloureux, hématurie) : syndrome néphrotique, thrombophilie, glomérulonéphrite extramembraneuse, déshydratation aiguë du nourrisson ;

■ atteinte des vaisseaux de moyen et petit calibre :

– microangiopathie thrombotique ;

– crise aiguë sclérodermique ;

– vascularite : PAN, Wegener.

Copyrighted material

MICROANGIOPATHIES THROMBOTIQUES

- Syndrome associant une anémie hémolytique mécanique, une thrombopénie périphérique et, selon le tableau clinique, une insuffisance rénale et/ou des manifestations neurologiques.
- On distingue essentiellement le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) ou maladie de Moschowitz, caractérisé par les manifestations neurologiques, et le syndrome hémolytique et urémique (SHU), caractérisé par l'insuffisance rénale.
- L'éclampsie ITEM 218, le *HELLP syndrome*, l'hypertension artérielle maligne, la CIVD, le syndrome catastrophique des antiphospholipides, la thrombopénie immunoallergique à l'héparine, la maladie veino-occlusive sont également des microangiopathies thrombotiques.
- Histologiquement, cette maladie est caractérisée par la formation de microthrombi plaquettaires au niveau des artérioles terminales et des capillaires, pouvant aboutir à une défaillance multiviscérale.
- Les physiopathologies du PTT et du SHU sont en fait distinctes : le PTT est associé à un déficit en protéase du facteur Willebrand (ADAMTS 13), une protéine qui régule la taille du facteur Willebrand. Ce déficit est constitutionnel ou acquis (anticorps anti-ADAMTS 13). La physiopathologie du SHU est moins bien comprise : on distingue le SHU postdiarrhéique (*E. coli* 0157 :H7, notamment) surtout chez l'enfant, lié à une shiga-toxine et le SHU dit atypique, associé à un déficit en une protéine régulatrice du complément, le facteur H, facteur I…
- Les causes ou les facteurs déclenchants sont : les infections virales (VIH, CMV), bactériennes (shigelle, *E. coli, Yersinia*, pneumocoque, légionelle, *Listeria*, *Mycobacterium tuberculosis*), les médicaments (ticlodipine, clopidogrel, cyclosporine A, tacrolimus, œstroprogestatifs, cisplatine, mitomycine C, bléomycine, gemcitabine), les causes néoplasiques (estomac, sein, poumon, prostate, pancréas, hémopathies), les maladies systémiques, les transplantations d'organe, les vaccinations, la grossesse.
- Le traitement repose sur la perfusion de fortes doses de plasma viro-inactivé (qui apporte de l'ADAMTS 13 dans le PTT) ou la réalisation d'échanges plasmatiques avec de fortes doses de plasma viro-inactivé (qui apporte de l'ADAMTS 13 et épurerait en anticorps anti-ADAMTS 13 dans le PTT).

III. DIAGNOSTIC

A. Diagnostic de l'insuffisance rénale

1. Anurie ou oligurie

- Anurie : diurèse < 100 mL/24 h.
- Oligurie : diurèse < 400 mL/24 h.

Copyrighted material

■ La diurèse peut cependant être normale (insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée).

2. Syndrome biologique d'insuffisance rénale

■ La réduction du débit de filtration glomérulaire est quantifiée indirectement par :

– une réduction de la clairance de la créatinine > 50 % par rapport à la valeur initiale ;

– ou une augmentation de la créatinine plasmatique > 50 µmol/L par rapport à la valeur initiale.

■ La clairance de la créatinine (Clcréat) peut être mesurée par la formule : Clcréat = Ucréat x V/Pcréat, où :

– Ucréat = créatinine urinaire ;

– Pcréat = créatinine plasmatique ;

– V = volume urinaire des 24 heures.

– le DFG est un peu surestimé du fait d'une faible sécrétion tubulaire distale de créatinine.

■ La clairance de la créatinine peut être estimée par la formule de Cockroft et Gault :

– Clcréat (mL/min) = [(140 – âge en années) x poids (kg) x a]/Pcréat ;

– a = 1,05 chez la femme et 1,25 chez l'homme.

■ Il existe une relation hyperbolique entre le DFG et la créatininémie. Ainsi une réduction importante du DFG n'induit au départ qu'une augmentation faible de la créatininémie du fait de la diffusion de la créatinine dans son volume de distribution et d'une élimination intestinale de la créatinine. L'installation d'une IRA peut être reconnue à ce stade par la diminution du débit urinaire (sauf insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée).

3. Diagnostic du caractère aigu de cette insuffisance rénale

■ Les critères permettant d'affirmer le caractère aigu et non chronique de l'insuffisance rénale *(tableau 252-I)* sont :

– une fonction rénale normale auparavant : critère majeur ;

– des reins de taille normale, sauf insuffisance rénale chronique à « gros reins » (diabète, amylose, VIH, polykystose rénale, myélome, infiltration lymphomateuse) : critère majeur ;

– l'absence d'anémie (sauf hémolyse ou choc hémorragique) ;

– l'absence d'hypocalcémie (sauf rhabdomyolyse, pancréatite aiguë, intoxication à l'éthylène glycol) ;

– l'absence d'ostéodystrophie rénale.

■ La réversibilité de l'atteinte rénale est un caractère rétrospectif majeur.

Copyrighted material

■ Enfin, toute insuffisance rénale chronique peut être aggravée par un facteur de décompensation prérénal, rénal ou postrénal.

Tableau 252-1. Critères en faveur du caractère aigu d'une insuffisance rénale.

- Chiffres antérieurs de créatinine normaux +++.
- Reins de taille normale (sauf insuffisance rénale chronique à « gros reins ») +++.
- Absence d'anémie (sauf hémorragie et hémolyse).
- Absence d'hypocalcémie (sauf rhabdomyolyse, pancréatite aiguë, intoxication à l'éthylène glycol).
- Absence d'ostéodystrophie rénale.
- Réversibilité de l'atteinte rénale.

4. Diagnostic du caractère fonctionnel de l'IRA

■ Des indices urinaires sont proposés pour distinguer une IRA prérénale d'une IRA rénale (et en particulier de la NTA). Ces critères ont pour justification la conservation dans l'IRA fonctionnelle des fonctions tubulaires (réabsorption du sodium, concentration des urines), ce qui se traduit par une natriurèse basse et des rapports urinaires/plasmatiques (U/P) élevés pour l'osmolalité, l'urée et la créatinine. Parmi ces indices, la fraction excrétée du sodium (FENA) est le plus discriminatif. Il s'agit du rapport de la clairance du sodium sur la clairance de la créatinine, ce qui permet de corriger la concentration de sodium urinaire pour la réabsorption d'eau et la fonction rénale résiduelle :

– FENA = (UNA x Pcréat)/(PNA x Ucréat) ;

– UNA et Ucréat = concentrations urinaires en sodium et en créatinine ;

– PNA et Pcréat = concentrations plasmatiques en sodium et en créatinine.

■ Ces critères *(tableau 252-2)* doivent être utilisés avec précaution. Il existe des situations d'interprétation difficile, par exemple :

– dans les IRA fonctionnelles par perte urinaire de sel (traitement diurétique, hypoaldostéronisme), la natriurèse persiste ;

– dans certaines glomérulonéphrites (rapidement progressives notamment) ou néphropathies interstitielles, la fonction tubulaire est normale au début, le profil urinaire étant alors celui d'une IRA fonctionnelle.

Tableau 252-2. Critères permettant de distinguer IRA fonctionnelle et IRA par NTA.

	Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle	Insuffisance rénale aiguë par NTA
Osmolarité urinaire	> 500 mOsmol/L	< 350 mOsmol/L
Na urinaire	< 20 mmol/L	> 40 mmol/L
FeNa	< 1 %	> 1 à 2 %
Na/K urinaire	< 1	> 1
U/P urée	> 8	entre 3 et 8
U/P créatinine	> 40	< 20
U/P osmolaire	> 1,5	< 1,2
Urée/Créatinine plasmatique	> 100	50
Sédiment urinaire	Normal	Cylindres granuleux

Copyrighted material

B. Diagnostic de la cause de l'IRA

1. Examen clinique

- L'anamnèse doit notamment préciser :
 - les conditions prédisposantes (HTA, diabète) ;
 - l'ensemble des traitements ;
 - l'éventuelle injection d'iode ;
 - les épisodes d'hypotension artérielle.
- L'examen clinique doit notamment préciser la diurèse et rechercher :
 - des signes urologiques (examen lombo-abdomino-pelvien) ;
 - des signes de déshydratation extracellulaire ;
 - des signes d'insuffisance cardiaque ;
 - des signes d'insuffisance hépatocellulaire ;
 - une hypertension artérielle ;
 - des signes d'artériopathie ;
 - des signes extrarénaux (cutanés, articulaires, neurologiques, otorhinolaryngologiques, pulmonaires), évocateurs d'une pathologie systémique ;
 - des signes évocateurs d'une maladie des emboles de cholestérol.
- La bandelette urinaire recherche une hématurie, une albuminurie, une leucocyturie.

2. Bilan biologique

- Sanguin :
 - ionogramme sanguin, urée et créatinine plasmatique, calcémie, phosphorémie, uricémie, CPK ;
 - protidémie, albuminémie, électrophorèse des protéines plasmatiques ;
 - gaz du sang et lactates artériels ;
 - numération-formule sanguine ;
 - selon le contexte :
 - bilan d'hémolyse : LDH, bilirubines, haptoglobine, schizocytes ;
 - bilan immunologique : anticorps antinucléaires (FAN), anticorps anticytoplasme des polynucléaires (ANCA) et anticorps antimembrane basale glomérulaire (Ac anti-MBG), complément (C3, C4, CH50), anticorps antistreptolysine (ASLO), cryoglobulinémie.
- Urinaire :
 - ionogramme urinaire et protéinurie (sur échantillon et sur 24 h) ➤ ITEM 328 ;
 - examen cytobactériologique des urines ;
 - recherche d'une éosinophilurie : néphrite interstitielle aiguë immunoallergique mais aussi embolies de cholestérol, pyélonéphrite bactérienne ;
 - recherche de cylindres :
 - érythrocytaires : glomérulonéphrite aiguë ou rapidement progressive ;

Copyrighted material

- granuleux : nécrose tubulaire aiguë ;
- leucocytaires : néphrite interstitielle aiguë (dont la pyélonéphrite) ;

– analyse cristallurique parfois : cristaux d'acide urique, d'oxalate ou de phosphate de calcium, médicamenteux.

3. Bilan radiologique

■ Abdomen sans préparation : contour et taille des reins (normale = 11 à 13 cm, soit 3 vertèbres et demi), recherche d'une lithiase radio-opaque, recherche de calcifications vasculaires (athéromatose).

■ Échographie rénale : taille des reins, échogénicité, différenciation corticomédullaire, dilatation des cavités pyélocalicielles, globe vésical, cône d'ombre postérieur d'une lithiase, adénopathies rétropéritonéales.

■ Selon le contexte :

– écho-Doppler des artères rénales, angio-IRM des artères rénales : recherche d'une sténose artérielle ;

– scanner rénal non injecté : apporte une information plus précise que l'échographie sur l'origine d'un obstacle.

4. Fond d'œil

Rétinopathie diabétique ou hypertensive (permet de déterminer le caractère éventuellement chronique de l'insuffisance rénale, de rechercher des signes d'HTA maligne), cristaux de cholestérol.

5. Ponction-biopsie rénale

■ Elle doit être pratiquée chaque fois que le tableau clinicobiologique diffère d'une IRA fonctionnelle, d'une NTA, d'une insuffisance rénale obstructive ou que le diagnostic de NTA est fait mais que l'on n'observe pas de récupération de la fonction rénale 4 à 5 semaines après l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë.

■ Parmi les signes incitant à la ponction-biopsie rénale, on retient particulièrement :

– la présence de signes extrarénaux orientant vers une pathologie systémique ;

– la présence d'anomalies biologiques orientant vers une glomérulonéphrite (protéinurie et/ou hématurie) ou une néphropathie interstitielle (éosinophilie sanguine ou urinaire) ;

– une microangiopathie (hémolyse intravasculaire, schizocytose) ou une maladie des emboles de cholestérol, bien que dans ces deux dernières situations la biopsie rénale ne soit pas systématique, le diagnostic étant alors fait sur un faisceau d'arguments.

Copyrighted material

ECN 2004

INDICATIONS DE LA PONCTION-BIOPSIE RÉNALE (PBR)*

- Pas de cause évidente à une IRA fonctionnelle, une nécrose tubulaire aiguë, une obstruction.
- Symptômes extrarénaux orientant vers une pathologie systémique.
- Anomalies biologiques évoquant une glomérulonéphrite (protéinurie > 1 g/24 h, hématurie).
- Anomalies biologiques (éosinophilie, éosinophilurie) ou médicament orientant vers une néphropathie immunoallergique.
- Suspicion de maladie des emboles de cholestérol*.
- Suspicion de microangiopathie thrombotique*.
- Oligurie ou anurie persistant au-delà de la 4e semaine.

** Dans ces situations la PBR n'est pas systématique.*

- Les contre-indications habituelles de la ponction-biopsie rénale percutanée sont :
 - les troubles de l'hémostase non corrigés ;
 - l'hypertension artérielle non contrôlée ;
 - la dilatation des cavités pyélocalicielles ;
 - l'infection urinaire ;
 - la tumeur rénale ;
 - le rein unique (fonctionnel ou anatomique) ou malformatif (en fer à cheval) ;
 - la mauvaise visualisation échographique.

0

- Les complications de la ponction-biopsie rénale sont :
 - l'hématurie macroscopique et l'obstruction rénale par caillotage ;
 - l'hématome périrénal ou sous-capsulaire rénal ;
 - la plaie de la voie excrétrice ;
 - la plaie splénique, hépatique ou digestive ;
 - la fistule artérioveineuse ;
 - l'abcès du rein.
- La présence de troubles de la coagulation peut justifier la réalisation d'une ponction-biopsie rénale par voie transjugulaire : en cas d'hémorragie, la spoliation sanguine y est limitée (hémorragie intraveineuse et hémostase mécanique par la graisse périrénale).

IV. PRISE EN CHARGE

Elle consiste essentiellement en :

- la recherche de signes de gravité justifiant une épuration extra-rénale (EER) urgente ;
- l'appréciation des conséquences cliniques et biologiques de l'IRA ;

Copyrighted material

- la recherche d'un obstacle et d'une hypovolémie ;
- le traitement de la cause.

A. Recherche de signes de gravité

Ces signes doivent faire discuter une admission en unité de soins intensifs et la réalisation urgente d'une EER.

1. Hyperkaliémie ITEM 219 [0]

- Liée à la baisse de la sécrétion tubulaire du potassium, à l'acidose métabolique, à l'hypercatabolisme cellulaire.
- Fréquente dans les formes anuriques et en cas de lyse cellulaire (lyse tumorale, hémolyse, rhabdomyolyse), où son aggravation est souvent rapide.
- Favorisée par la prise de certains médicaments : antialdostérone, IEC, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine, AINS, trimétoprime-sulfamétoxazole.
- On parle d'hyperkaliémie menaçante lorsqu'elle est associée à des signes électrocardiographiques : ondes T amples, pointues et symétriques, troubles de la conduction. Le traitement de l'hyperkaliémie doit alors être immédiatement débuté, relayé par la réalisation d'une EER.
- Il existe de rares hypokaliémies en cas de pertes digestives.

2. Acidose métabolique [0]

- Liée à l'accumulation de sulfates et de phosphates (responsable d'un trou anionique) et, en cas d'acidose tubulaire, à la diminution de l'acidurie.
- Généralement modérée, elle peut être importante en cas de :
 - acidose lactique associée (état de choc) ;
 - céto-acidose associée (céto-acidose diabétique) ;
 - perte digestive de bicarbonate (diarrhée aiguë) ;
 - acidose oxalique associée (intoxication à l'éthylène glycol).
- Les risques de l'acidose métabolique sont essentiellement liés à l'hyperkaliémie. L'acidose métabolique a également comme conséquences propres une diminution de la contractilité myocardique, un effet arythmogène, le risque d'épuisement respiratoire par hyperventilation compensatrice.
- Le traitement par bicarbonate de sodium n'est justifié qu'en cas d'hyperkaliémie menaçante, de perte de bicarbonate (diarrhée), d'intoxication par molécule à effet stabilisant de membrane ITEM 214 et est souvent suivi de la réalisation rapide d'une épuration extra-rénale.
- L'alcalose métabolique est possible en cas de vomissements abondants.

3. Œdème pulmonaire hydrostatique [0]

Le traitement fait appel aux diurétiques de l'anse lorsqu'il existe une diurèse, aux dérivés nitrés, et à l'épuration extra-rénale avec ultrafiltration.

Copyrighted material

B. Appréciation des conséquences cliniques et biologiques de l'IRA

Elles font discuter la réalisation rapide d'une EER :

- **symptômes urémiques** :
 - anorexie, nausées, vomissements ;
 - encéphalopathie ;
 - syndrome hémorragique (hémorragies digestives, notamment) ;
- **troubles métaboliques** :
 - hyponatrémie : le plus souvent liée aux apports en eau ;
 - hyperuricémie : généralement asymptomatique (sauf syndrome de lyse tumorale) ;
 - hyperphosphorémie : surtout en cas de lyse tumorale ;
 - hypocalcémie : rapidement en cas de pancréatite aiguë, de rhabdomyolyse, d'intoxication à l'éthylène glycol, et après quelques jours dans les autres cas.

C. Rechercher une obstruction susceptible d'être levée en urgence par la réalisation d'une échographie rénale

0 ➤ ITEM 216

- L'obstruction peut-être asymptomatique ou accompagnée de signes urologiques évocateurs : lombalgies, dysurie, pollakiurie, cystalgie, hématurie macroscopique.
- L'échographie rénale est l'examen essentiel : dilatation des cavités pyélocalicielles.
- En cas d'obstruction très aiguë, de fibrose rétropéritonéale, de blindage pelvien, la dilatation des cavités pyélocalicielles peut manquer.
- Le traitement repose sur :
 - le sondage urinaire par sonde vésicale ou cathéter sus-pubien en cas d'obstacle vésical ou sous-vésical ;
 - le sondage par néphrostomie percutanée, sonde urétérale, sonde double-J en cas d'obstacle urétéral.
- Le drainage peut être suivi d'un syndrome de levée d'obstacle (polyurie et natriurèse massive), qu'il faut dépister et traiter (compensation des pertes urinaires par un soluté adapté, en général : sérum physiologique supplémenté en potassium).

D. Rechercher des arguments pour une hypovolémie

0 Sa présence motive la réalisation d'une expansion volémique :

- au cours de l'IRA, quelle que soit sa cause, la volémie doit être appréciée et toute hypovolémie doit être corrigée de façon à prévenir la constitution de

0 lésions tubulaires supplémentaires ;

- cette expansion volémique est le plus souvent réalisée par la perfusion de sérum physiologique et/ou transfusion sanguine en cas d'hémorragie ➤ ITEM 280 ;

Copyrighted material

■ une hypovolémie est probable en cas de signes cliniques de déshydratation extra-cellulaire (soif, perte de poids, tachycardie, hypotension artérielle, pli cutané), de signes biologiques d'hémoconcentration.

E. Réaliser une nutrition satisfaisante

■ La diminution des apports protidiques dans le but de réduire la cinétique d'augmentation de l'urée a un temps été proposée.

■ Cette pratique est aujourd'hui proscrite car un hypercatabolisme est souvent associé à l'IRA.

■ Les apports protidiques doivent être maintenus et ne pas être inférieurs à 1 g/kg/24 h.

■ Le traitement d'une cinétique rapide d'augmentation de l'urée repose sur le rapprochement des séances de dialyse.

F. Prévenir l'ulcère de stress

■ Il existe un lien entre le degré d'IRA et le risque ulcéreux.

■ La prévention passe avant tout par la mise en route d'une alimentation entérale dès que possible, pouvant être associée à un traitement antisécrétoire, ce d'autant qu'il existe d'autres facteurs de risque (intubation, coagulopathie, choc, coma, antécédents d'ulcère gastroduodénal, usage de corticoïdes ou d'AINS).

G. Adapter les traitements médicamenteux

■ La posologie des médicaments à élimination rénale doit être adaptée. 0

■ Les médicaments néphrotoxiques doivent être évités. 0

H. Réaliser une EER

L'épuration extra-rénale est le traitement symptomatique essentiel de l'IRA sévère.

1. Objectifs

■ Réduction des symptômes d'urémie.

■ Contrôle de la kaliémie.

■ Contrôle des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques.

■ Contrôle de l'équilibre phosphocalcique.

■ Maintien d'un état nutritionnel en permettant de respecter les besoins caloriques et protidiques.

Copyrighted material

2. Indications

0 ■ Épuration extra-rénale urgente :
– hyperkaliémie menaçante ;
– acidose métabolique sévère ;
– œdème pulmonaire hydrostatique ;
– certaines intoxications : éthylène glycol, lithium.

0 ■ Épuration extra-rénale rapide :
– urée ≥ 35 mmol/L ;
– signes d'urémie sévère.

3. Modalités

■ Dialyse conventionnelle : l'épuration extra-rénale se fait selon le principe de diffusion (c'est-à-dire selon un gradient de concentration entre le sang et le liquide de dialyse), au cours d'une séance de 4 à 6 heures répétée tous les jours ou tous les 2 jours tant que l'insuffisance rénale persiste.

■ Hémofiltration continue : l'épuration extra-rénale se fait selon le principe de convection (c'est-à-dire selon un gradient de pression entre le sang et le liquide d'ultrafiltration), au cours d'une période continue se prolongeant tant que l'insuffisance rénale persiste.

■ Plus rarement, dialyse péritonéale.

Le principal avantage allégué de l'hémofiltration continue par rapport à la dialyse conventionnelle est sa meilleure tolérance hémodynamique, avantage pouvant être utile au cours de la prise en charge d'une IRA associée à un état de choc ; le choix de l'une ou l'autre des techniques reste une affaire de spécialiste.

I. Ne pas tenter de restituer une diurèse par un traitement diurétique

■ L'IRA à diurèse spontanément conservée présente un meilleur pronostic que l'IRA anurique.

■ La restitution d'une diurèse par un traitement diurétique faciliterait la prise en charge nutritionnelle du patient chez qui les apports énergétiques ne déséquilibrent pas le bilan entrées/sorties.

■ Cependant, cette pratique n'a pas montré d'amélioration du pronostic dans l'IRA. Surtout, le risque d'hypovolémie (et donc de retard à la reprise de la fonction rénale) lié au traitement diurétique doit la faire abandonner.

J. Ne pas traiter par dopamine à dose dopaminergique

La dopamine à doses dites dopaminergiques (2 à 3 µg/kg/min) a été proposée par son effet sur les récepteurs dopaminergiques rénaux. Ce traitement, s'il entraîne une diurèse, n'améliore pas la fonction rénale, ni le pronostic vital : il est aujourd'hui proscrit.

Copyrighted material

K. Traiter la cause

Certaines mesures spécifiques doivent être connues car leur application en urgence favorise la récupération de la fonction rénale. Parmi ces mesures, citons :

- traitement hémodynamique d'un état de choc : une pression artérielle moyenne de 60 mmHg (ou plus chez le patient hypertendu) est nécessaire à la perfusion rénale ; cet objectif doit être rapidement atteint en cas d'hypotension artérielle, par expansion volémique si hypovolémie et/ou traitement vasopresseur et/ou inotrope positif dans les états de choc ITEM 200 ;
- éradication du foyer infectieux s'il est encore évolutif dans la glomérulonéphrite postinfectieuse ;
- corticoïdes, cyclophosphamide et échanges plasmatiques dans le syndrome de Goodpasture ;
- corticoïdes et cyclophosphamide dans la granulomatose de Wegener, la polyangéite microscopique, le lupus érythémateux systémique ;
- perfusion de plasma frais congelé ou échanges plasmatiques dans la microangiopathie thrombotique.

L. Prévention de l'IRA

- La prévention de la NTA passe par le maintien d'une volémie satisfaisante chez les patients à risque (sujets âgés, hypertendus, diabétiques, athéromateux, insuffisants rénaux chroniques) soumis à une chirurgie à risque (chirurgie cardiaque et aortique, notamment).

CONSENSUS

Protection rénale péri-opératoire
SFAR, 2004

- Une augmentation même modérée de la créatininémie postopératoire augmente significativement la morbidité et la mortalité postopératoires.
- Les facteurs prédictifs d'IRA postopératoire sont : l'insuffisance rénale chronique, l'âge > 75 ans, le diabète, le régime sans sel, les diurétiques, les troubles digestifs, la fièvre, un jeûne préopératoire prolongé, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique.
- Les molécules favorisant l'IRA postopératoire sont : les AINS, les aminosides (administrés de façon prolongée), les produits de contraste iodés (dont l'administration doit être encadrée par des apports hydrosodés, l'intérêt de la protection rénale par N-acétylcystéine restant controversé), les IEC et les ARA II (qui doivent être interrompus transitoirement 48 h avant une intervention chirurgicale à risque).
- L'angiographie par voie aortique chez des patients âgés et souffrant d'athérosclérose expose à un risque d'embolies rénales de cristaux de cholestérol menaçant le pronostic vital.
- L'innocuité des solutés de remplissage type HEA de dernière génération n'a pas été affirmée.

Copyrighted material

■ Pour les patients à risque opérés d'une chirurgie exposant à l'IRA, la mesure invasive de la pression artérielle est recommandée. La PAM doit être maintenue ≥ 70 mmHg.
■ La correction de l'hypovolémie relative inhérente aux techniques d'anesthésie générale ou rachidienne est un prérequis obligatoire.
■ La normalisation glycémique en réanimation permet de diminuer l'incidence de l'IRA.
■ La noradrénaline ne peut être recommandée à titre systématique, en dehors des états de choc.
■ La dopamine à faible dose, l'utilisation des diurétiques de l'anse, le mannitol, le facteur atrial natriurétique, les antagonistes du thromboxane, de l'adénosine et des endothélines, les inhibiteurs calciques, les antagonistes du facteur d'activation plaquettaire, les *scavengers* des radicaux libres de l'oxygène, la N-acétylcystéine ne doivent pas être utilisés pour la protection rénale.
■ Concernant l'épuration extra-rénale, il existe un consensus pour affirmer que l'hémofiltration continue est mieux tolérée par les patients dont l'hémodynamique est instable.

■ La prévention de la tubulopathie à l'iode a fait l'objet de recommandations récentes.

CONSENSUS

Prévention de l'IRA induite par les produits de contraste iodés SFR, CIRTACI, 2004

■ L'IRA liée aux produits de contrastes iodés (PCI) est un événement rare en l'absence de facteurs de risque mais concerne 20 % des patients présentant les facteurs de risque suivants :
– *insuffisance rénale préexistante :* lorsque la clairance de la créatinine est < 30 mL/min et/ou la créatininémie > 200 µmol/L, l'injection de PCI est récusée en l'absence de nécessité absolue ;
– *diabète avec insuffisance rénale* ;
– *hypoperfusion rénale* (déshydratation, hypotension, hypovolémie, syndrome néphrotique, cirrhose décompensée, hémodynamique précaire, insuffisance cardiaque…) ;
– *prise de médicaments néphrotoxiques* ou modifiant la fonction rénale (diurétiques, AINS, coxib, dérivés du platine…) ;
– *myélome avec protéinurie* ;
– *injection de PCI dans les 3 jours précédents*.
■ Un âge supérieur à 65 ans rend plus probable la présence de facteurs de risque.
■ Chez ces patients : dosage de la créatininémie (si non-disponibilité d'un dosage ≤ 3 mois) avant l'injection de PCI et 2 à 3 jours après. En l'absence de ces facteurs de risque, le dosage de la créatininémie n'est pas nécessaire.
■ L'arrêt des médicaments néphrotoxiques est souhaitable quand il est possible. La metformine expose à l'acidose lactique par diminution de sa clairance rénale. Le traitement par les dérivés de la metformine doit être interrompu pour une durée de 48 heures après l'injection de PCI. Le traitement est réintroduit après vérification de l'absence de dégradation de la fonction rénale.
■ Un intervalle de 3 jours au minimum et si possible de 5 jours doit séparer 2 injections de PCI, sauf nécessité spécifique.

Copyrighted material

■ L'hydratation, au mieux à composante salée et bicarbonatée, est recommandée pour tous les patients :
– soit *per os* : 2 litres d'eau riche en sodium et bicarbonates pendant les 24 heures précédant et suivant l'injection de PCI ;
– soit parentérale : 100 mL/h de sérum salé isotonique ou de sérum bicarbonaté isotonique pendant les 12 h précédant et suivant l'injection de PCI.
■ En cas d'insuffisance cardiaque sévère, de cirrhose décompensée, de syndrome néphrotique, les diurétiques peuvent être conservés pour maintenir la natriurèse, et l'hydratation doit être adaptée à la fonction cardiaque.
■ Le bénéfice de l'administration de N-acétylcystéine en cas de facteurs de risque est controversé. Sa prescription ne dispense en aucun cas de l'hydratation.
■ L'utilisation de chélates de gadolinium en imagerie par rayons X à la place des PCI n'est pas indiquée, car leur néphrotoxicité n'est pas moindre à pouvoir opacifiant égal, et la qualité de l'examen n'est pas meilleure à néphrotoxicité égale.
■ Chez les patients dialysés, l'injection de PCI est programmée indépendamment des séances de dialyse, et il n'est pas nécessaire de prévoir une séance de dialyse supplémentaire, sauf indication spécifique, en particulier d'ordre volémique et/ou cardiovasculaire.

■ La prescription d'un traitement par IEC ou ARA II doit être prudente chez les patients âgés et/ou ayant des facteurs de risque cardiovasculaires, pratiquée après avoir recherché un souffle abdominal et une sténose des artères rénales au moindre doute, et suivie d'une surveillance de la fonction rénale.

Copyrighted material

Fiche **Dernier tour**

Insuffisance rénale aiguë (IRA)

L'IRA, baisse brutale de la filtration glomérulaire, est liée à 3 mécanismes :

- fonctionnel (IRA prérénale), très fréquent, par diminution du flux sanguin rénal ;
- organique (IRA rénale), par atteinte souvent tubulaire, plus rarement interstitielle, glomérulaire, ou vasculaire ;
- obstructif (IRA postrénale) par obstruction des voies excrétrices.

Le **diagnostic** associe :

- un syndrome biologique d'insuffisance rénale :
 - réduction de la clairance de la créatinine > 50 % par rapport à la valeur initiale 0 ;
 - ou augmentation de la créatinine plasmatique > 50 µmol/L par rapport à la valeur initiale 0 ;
- une anurie (diurèse < 100 mL/24 h) ou oligurie (diurèse < 400 mL/24 h), la diurèse pouvant cependant être normale 0 ;
- des critères permettant d'affirmer le caractère aigu :
 - chiffres antérieurs de créatinine normaux ;
 - reins de taille normale (sauf insuffisance rénale chronique à « gros reins ») ;
 - absence d'anémie (sauf hémorragie et hémolyse) ;
 - absence d'hypocalcémie (sauf rhabdomyolyse, pancréatite aiguë, intoxication à l'éthylène glycol) ;
 - absence d'ostéodystrophie rénale ;
 - réversibilité de l'atteinte rénale ;
- des indices urinaires permettant de distinguer une IRA prérénale d'une NTA :

	Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle	Insuffisance rénale aiguë par NTA
Osmolarité urinaire	> 500 mOsmol/L	< 350 mOsmol/L
Na urinaire	< 20 mmol/L	> 40 mmol/L
FeNa	< 1 %	> 1 à 2 %
Na/K urinaire	< 1	> 1
U/P urée	> 8	entre 3 et 8
U/P créatinine	> 40	< 20
U/P osmolaire	> 1,5	< 1,2
Urée/Créatinine plasmatique	> 100	50
Sédiment urinaire	Normal	Cylindres granuleux

La **prise en charge** consiste en :

- rechercher des signes de gravité devant faire discuter une admission en unité de soins intensifs et la réalisation urgente d'une EER :
 - **hyperkaliémie** 0 ;
 - **acidose métabolique** 0 ;
 - **œdème pulmonaire hydrostatique** 0 ;

Copyrighted material

Hidden page

Fiche Dernier tour

- on aura toujours à l'esprit la recherche d'arguments pour une microangiopathie thrombotique (hémolyse mécanique) ou une glomérulonéphrite rapidement progressive et notamment une maladie de Wegener et un syndrome de Goodpasture.

Copyrighted material

ITEM 91

Infections nosocomiales

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

Remarque : ce chapitre se focalise sur les infections nosocomiales rencontrées en réanimation.

OBJECTIFS

- Reconnaître le caractère nosocomial d'une infection.
- Savoir appliquer et expliquer les mesures de prévention des infections nosocomiales.

LIENS TRANSVERSAUX

- ITEM 6 Le dossier médical. L'information du malade. Le secret médical.
- ITEM 75 Épidémiologie et prévention des maladies transmissibles : méthodes de surveillance.
- ITEM 86 Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- ITEM 93 Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte. Leucocyturie.
- ITEM 104 Septicémie.
- ITEM 173 Prescription et surveillance des antibiotiques.

CONSENSUS

- Prévention des infections à bactéries multirésistantes en réanimation – Conférence de consensus (SRFL, SFISI, SPILF, 21 novembre 1996) – www.slf.org
- Risque et maîtrise des infections nosocomiales en réanimation – Texte d'orientation pour la réanimation (SRLF, SFAR 1er octobre 2004) – www.srlf.org
- Infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation - Réactualisation de la 12e conférence de consensus de la SRLF (SRLF décembre 2002) – www.srlf.org
- Diagnostic des pneumopathies nosocomiales en réanimation – Conférence de consensus (SRLF, 13 octobre 1989) – www.srlf.org
- Infections urinaires nosocomiales de l'adulte – Conférence de consensus (SPILF, AFU 27 novembre 2002) - www.infectiologie.com
- Actualisation de la définition des infections nosocomiales – Texte de recommandation - (Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, 11 mai 2007) – www.sante.gouv.fr
- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales - Texte de recommandation - (Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, 1999) – www.sante.gouv.fr

Copyrighted material

POUR COMPRENDRE…

- L'infection nosocomiale est une infection acquise dans un établissement de soins.
- L'infection nosocomiale est fréquente : son taux de prévalence est en moyenne de 10 % et atteint environ 25 % dans les services de réanimation.
- En réanimation, on observe par ordre décroissant :
 - les infections respiratoires ;
 - les infections urinaires ;
 - les bactériémies et les infections liées aux cathéters veineux centraux (CVC) ;
 - les infections du site opératoire.
- Le taux de prévalence des bactéries multirésistantes (BMR : *Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas*, staphylocoque doré résistant à la meticilline) est particulièrement élevé.
- Les infections nosocomiales constituent un problème majeur de santé publique, à l'origine d'un accroissement du risque de morbidité, d'un possible accroissement du risque de mortalité, d'une augmentation de la durée de séjour, d'un surcoût hospitalier.
- La prise en charge se heurte à :
 - des difficultés diagnostiques : multiplicité des sources possibles, distinction entre colonisation et infection souvent complexe ;
 - des difficultés thérapeutiques : caractère peu prévisible des résistances aux antibiotiques.
- La proportion d'infections d'origine manuportée est particulièrement importante du fait de la densité des soins. Le respect de l'hygiène des mains est donc une mesure majeure permettant de réduire significativement l'incidence des infections nosocomiales en réanimation.

I. INFECTION NOSOCOMIALE EN RÉANIMATION

A. Définitions et notions fondamentales[1]

1. Infection associée aux soins (IAS)

L'IAS désigne tout événement infectieux en rapport avec un processus, une structure, une démarche de soins dans un sens très large, et qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient.

2. Infection nosocomiale

L'infection nosocomiale fait partie des IAS et désigne une infection acquise dans un établissement de soins.

1. Actualisation de la définition des infections nosocomiales – Texte de recommandation – www.sante.gouv.fr.

Copyrighted material

Hidden page

- le tube endotrachéal qui court-circuite les défenses de la sphère ORL ;
- le sondage urinaire qui court-circuite le sphincter vésical et l'urètre ;
- les cathéters vasculaires qui court-circuitent la peau.

2. La maladie initiale

Toute affection aiguë grave s'accompagne d'une immunodépression transitoire dite « post-agressive ».

3. L'origine des germes en cause

Comme dans tout secteur de soins, deux voies de contamination sont possibles, la voie endogène et la voie exogène.

- **La voie endogène** est à l'origine de la majorité des infections. Elle est liée à la contamination puis à la colonisation de sites normalement stériles par la flore du patient à la faveur d'une rupture des barrières de défense. Cette flore est cependant en réanimation souvent modifiée par rapport à celle des sujets sains du fait des fréquentes prescriptions antibiotiques. On observe en particulier une augmentation de la fréquence des bactéries à Gram négatif résistantes et des staphylocoques dorés résistants à la méticilline.
- **La voie exogène** est liée à la contamination puis à la colonisation du patient par des bactéries provenant d'autres malades (transmissions croisées) ou de l'environnement, et transmises essentiellement par manuportage, mais aussi des instruments de travail, du matériel médical, de l'eau, de l'air, de l'alimentation. En réanimation, cette voie est relativement plus importante qu'ailleurs compte tenu de la densité des soins et de la fréquence des procédures.

4. Résistance aux antibiotiques

La grande fréquence de prescription d'antibiotiques en réanimation explique la fréquence des infections nosocomiales à bactéries résistantes ou multirésistantes (BMR). Parmi les BMR on retient surtout :

- les *Staphylococcus aureus* résistants à la méticilline (SARM) ;
- les entérobactéries résistants aux céphalosporines de 3^{e} génération selon deux mécanismes : production de bétalactamase à spectre élargi (BLSE) ou par hyperproduction de céphalosporinases ;
- les *Pseudomonas aeruginosa* résistants à la ceftazidime ;
- les *Acinetobacter baumanii* résistants à la ticarcilline ou à l'imipénème.

Et plus rarement :

- les *Staphylococcus aureus* résistants aux glycopeptides (GISA) ;
- les entérocoques résistants à la vancomycine (VRE).

5. Facteurs organisationnels

Deux facteurs organisationnels contribuent au développement des infections nosocomiales en réanimation :

Copyrighted material

Hidden page

– procédures d'isolement géographique spécifiques chez les patients colonisés ou infectés à BMR : chambre seule, regroupement des patients colonisés ou infectés et personnels dédiés en cas d'épidémie ;

– signalisation systématique des patients colonisés ou infectés à BMR ;

– information au patient du risque nosocomial et de la survenue le cas échéant d'une colonisation ou d'une infection à BMR ➤ ITEM 6 ;

■ Un choix raisonné des antibiotiques prescrits ➤ ITEM 122 :

– politique antibiotique d'établissement ;

– équipe opérationnelle de conseils en antibiothérapie ;

– prescription encadrée nominative par un médecin senior ;

– suivi de la consommation en antibiotiques et corrélation avec les taux de bactéries multirésistantes.



D. Surveillance des infections nosocomiales[1] ➤ ITEM 75

Elle repose sur :

■ La surveillance standardisée au plan national des principales infections (pneumonies nosocomiales, infections sur sonde urinaire, infections du site opératoire, bactériémies, infections liées aux CVC, portage de BMR) permettant de déterminer :

– les taux de prévalence : fréquence de tous les cas à un instant t, calculé en rapportant le nombre de patients infectés au nombre de patients présents ;

– les taux d'incidence : fréquence d'apparition de nouveaux cas sur une période donnée rapportée à une durée d'hospitalisation.

■ La surveillance de l'environnement (air, eau, surfaces, alimentation).

■ La réalisation d'enquête d'incidence longitudinale, sur une durée définie permettant de déterminer :

– la densité d'incidence : nombre de nouveaux cas rapportés au total des durées d'exposition ;

– le taux d'attaque : nombre de nouveaux cas rapportés au nombre de patients admis pendant la même période (surtout utilisé en cas d'épidémie).

■ Les signalements :

– signalement interne au comité local de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et à l'équipe opérationnelle d'hygiène (EOH) ;

– signalement externe au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (C.CLIN) et à la DDASS obligatoire en cas de :

• décès lié à une infection nosocomiale ;

1. 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales – Texte de recommandation – www.sante.gouv.fr.

Copyrighted material

Hidden page

La contamination du patient sondé se fait selon 2 voies : endoluminale par l'urine contaminée (75 %) et trans-urétral entre la muqueuse urétrale et la sonde urinaire.

B. Facteurs de risque

1. Facteurs de risque liés au patient

- Âge avancé.
- Sexe féminin.
- Immunodépression.
- Diabète.
- Diarrhée.

2. Facteurs de risque liés à la prise en charge

0 - Durée du sondage urinaire.

0 - Antibiothérapie préalable.

C. Germes responsables

Par ordre décroissant de fréquence :

0 - *E. Coli* ;
- entérocoques ;
- *Pseudomonas Aeruginosa* ;
- *Proteus sp.* ;
- *Klebsiella sp.* ;
- *Enterobacter sp.* ;
- *Serratia sp.* ;
- *Candida sp.* ;
- staphylocoques résistants à la méticilline.

D. Diagnostic

- Fièvre et/ou signes fonctionnels urinaires.
- Uroculture positive ($\geq 10^5$ UFC/mL) avec au plus 2 micro-organismes différents.
- La sonde vésicale est encore en place ou a été retirée dans la semaine précédente.

Remarques :

- en l'absence de sonde urinaire, l'infection urinaire nosocomiale se définit par :
 - une fièvre et/ou la présence de signes fonctionnels urinaires ;
 - une leucocyturie ($\geq 10^4$/mL) et une uroculture positive ($\geq 10^3$ UFC/mL) avec au plus 2 micro-organismes différents ;
- la bactériurie asymptomatique ne constitue pas une IAS et est définie par :
 - l'absence de signes cliniques ;

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

- Présence d'une sinusite (favorisée en réanimation par l'intubation nasotrachéale et/ou la présence d'une sonde naso-gastrique).

2. Facteurs de risque liés à la prise en charge

- Durée de la ventilation mécanique, le risque augmentant de 1 à 3 % pour chaque jour de ventilation. [0]
- Position couchée à plat, par augmentation du risque de régurgitation gastrique. [0]
- Utilisation d'antiacide et d'anti-H_2 (par diminution du pH gastrique et risque de pullulation microbienne).
- Sédation profonde et curarisation par diminution du réflexe de toux.
- Sonde nasogastrique.
- Transports fréquents en dehors du service.
- Réintubation.
- Changements trop fréquents des circuits de ventilateur.

C. Germes en causes :

Les germes en cause dépendent du délai de survenue. [0]

1. Avant le 6e jour

On parle de pneumopathie précoce (*early-onset pneumonia*). L'épidémiologie est alors proche des pneumopathies communautaires : pneumocoques, *Haemophilus sp*, entérobactéries sensibles, staphylocoque doré sensible à la méticilline. [0]

2. Après le 6e jour

On parle de pneumopathie tardive (*late-onset pneumonia*). Les germes responsables sont alors des bacilles à gram négatif : *Pseudomonas sp, Acinetobacter,* entérobactéries résistantes (*Klebsiella, Enterobacter, Serratia*) ou des cocci à gram positifs : staphylocoque doré résistant à la méticilline. [0] [0]

D. Diagnostic de PAVM

1. Signes cliniques

Le diagnostic peut-être suspecté cliniquement en présence :

- d'une hyperthermie $\geqslant$ 38,3 °C ;
- d'une hypothermie $\leqslant$ 36,5 °C ;
- de la présence de secrétions purulentes lors des aspirations trachéales ;
- de l'apparition d'une image radiologique ou d'une aggravation des images antérieures ;
- d'une hyperleucocytose.

Ces signes n'ont cependant qu'une médiocre spécificité dans le contexte de réanimation.

Copyrighted material

2. Aspiration trachéale

C'est un prélèvement simple et peu coûteux. Il est positif au seuil de 10^6 UFC/mL. Les sensibilités et spécificités de cet examen ont été cependant trouvées très variables d'une étude à une autre, le risque principal étant de faire le diagnostic de pneumopathie par excès chez un patient simplement colonisé.

3. Prélèvements per-endoscopiques

L'endoscopie bronchique permet la réalisation de prélèvements au niveau distal par brossage ou lavage bronchoalvéolaire :

- brosse distale protégée : une brosse protégée au sein d'un double cathéter dont l'extrémité distale est obturée par un bouchon de polyéthylène glycol est introduite dans le fibroscope dont l'extrémité est placée en distalité dans le territoire choisi. La brosse permet le prélèvement d'un volume calibré de sécrétions distales dans le territoire présumé de la pneumopathie. Un prélèvement est considéré comme positif quand il ramène ≥ 10^3 UFC/mL (sensibilité et spécificité de l'ordre de 70 %) ;
- lavage bronchoalvéolaire : il est obtenu après instillation de 120 mL de sérum physiologique après avoir bloqué le fibroscope dans une bronche segmentaire ou sous-segmentaire, puis aspiration du liquide qui sera analysé au laboratoire de bactériologie. L'examen direct est considéré comme positif quand plus de 5 % des cellules sont infectées. La culture est considérée comme positive à partir de 10^4 UFC/mL.

4. Démarche diagnostique

Deux approches sont possibles pour faire le diagnostic de PAVM. Une approche « non invasive », utilisant une simple aspiration trachéale, permet d'identifier les malades atteints de PAVM en prenant le risque de traiter un certain nombre de malades par excès, qui ne seraient que colonisés. Cette approche n'étant pas compatible avec un contrôle rationnel de la prescription des antibiotiques, une stratégie microbiologique « invasive » fondée sur une antibiothérapie guidée par le résultat d'un examen direct d'un prélèvement per-endocopique (brosse ou LBA) permet sûrement de limiter le nombre de malades traités par excès tout en adaptant la thérapeutique aux résultats des cultures.

E. Prise en charge

0 Une antibiothérapie empirique doit être débutée le plus tôt possible, dès réalisation des prélèvements. Elle tient compte du délai de survenue de la PAVM, des résultats de prélèvements microbiologiques antérieurs, de l'antibiothérapie préalable, de l'écologie microbienne locale et de la sévérité du tableau. Elle sera secondairement adaptée aux résultats des cultures des prélèvements réalisés et aux antibiogrammes.

Copyrighted material

1. PAVM précoce sans antibiothérapie préalable

Amoxicilline – acide clavulanique ou céphalosporine de 3e génération (*Cefotaxime Ceftriaxone*).

2. PAVM tardive

Bithérapie avec une bétalactamine ayant une activité anti-pyocyanique (pipéracilline-tazobactam ou ceftazidine ou imipénème) associée pendant 3 à 5 jours à un aminoside ou une fluoroquinolone (ciprofloxacine, compte tenu de son activité anti-pyocyanique). Si le staphylocoque est suspecté (patient colonisé ou préalablement infecté, antibiothérapie préalable) ou si le tableau est grave un traitement par glycopeptide est associé (vancomycine).

F. Mesures préventives

La prévention comporte :

- des mesures générales :
 - mesures habituelles d'hygiène hospitalière ;
 - sevrage le plus précoce possible de la ventilation ; 0
 - préférer la ventilation non invasive quand elle est possible ;
- des mesures visant à limiter le risque infectieux exogène :
 - lavage des mains ; 0
 - port de gants lors des aspirations bronchiques et oropharyngées ;
 - utilisation d'eau stérile pour l'aérosolisation et l'humidification ;
 - utilisation de circuits de ventilation à usage unique ;
- des mesures visant à limiter le risque infectieux endogène :
 - maintien en position semi-assise afin de diminuer le risque de reflux gastro-oesophagien ; 0
 - éviter la sédation profonde qui inhibe la motilité gastrique et le réflexe de toux ;
 - utilisation de sondes gastriques de petite taille ;
 - toilette antiseptique régulière de l'oropharynx ;
 - aspirations bronchiques à la demande ;
 - bien évaluer l'indication d'une prophylaxie de l'ulcère de stress.

IV. INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX (CVC)[1]

ITEM 104



Elles représentent 10 % des infections nosocomiales en réanimation et sont à l'origine de 30 % des bactériémies en réanimation. Elles sont responsables en réanimation d'une prolongation de la durée de séjour estimée entre 5 et 20 jours, et d'un risque de décès estimé à 20 %.

1. Infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation – Conférence de consensus (SRLF) – www.srlf.org.

Copyrighted material

A. Physiopathologie

Après sa mise en place, se forme autour du CVC un manchon de thrombine, riche en fibrine et fibronectine facilitant l'adhésion des micro-organismes. Il existe 3 voies de contamination d'un CVC.

1. Voie extraluminale cutanée

- La plus fréquente.
- Survient lors de la pose du CVC ou lors de la colonisation secondaire du site d'insertion.
- Les bactéries migrent depuis le point d'entrée cutanée et remontent le long de la surface externe du cathéter.

2. Voie endoluminale

- Le plus souvent secondaire à une manipulation septique des raccords.
- Exceptionnellement liée à la contamination du liquide de perfusion.

3. Voie hématogène

- Rare.
- Liée à la contamination du cathéter à partir d'un foyer à distance.

B. Facteurs de risque

1. Facteurs de risque liés au patient

- Âge avancé.
- Sexe masculin.
- Immunodépression.
- Neutropénie.
- Grande densité en soins.

2. Facteurs de risque liés au site d'insertion du CVC

- Les voies fémorale et jugulaire interne semblent associées à un risque d'infection similaire mais présentent un risque d'infection supérieur à la voie sous-clavière.
- La voie sous-clavière devrait être donc préférée dès que la durée prévue de cathétérisation dépasse 5-7 jours.
- Le risque de pneumothorax ou de ponction accidentelle de l'artère non compressible lors de la pose en voie sous-clavière doit cependant faire discuter son indication chez les patients de réanimation présentant une altération de l'état respiratoire et/ou hémodynamique et/ou des troubles de l'hémostase.
- La tunnélisation, qui diminuerait le taux d'infection liée au CVC, est recommandée pour les voies fémorale ou jugulaire interne, mais est en pratique peu réalisée en réanimation.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

V. INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE

L'infection du site opératoire est la 3e cause d'infection nosocomiale et la 1re cause de morbidité et de mortalité en chirurgie. La mortalité attribuable est très variable selon le type de chirurgie et le terrain mais pourrait atteindre 5 %.

A. Physiopathologie

Les infections du site opératoire résultent de 2 types de contamination.

1. Contamination peropératoire

- Le plus souvent.
- À partir de bactéries endogènes d'un patient colonisé ou mal préparé, ou à partir de bactéries exogènes par manuportage.

2. Contamination postopératoire

- Très rarement.
- À partir de bactéries exogènes, le plus souvent par manuportage lors des soins postopératoires (pansement, drains).

B. Facteurs de risque

1. Facteurs de risque liés au patient

- Âge avancé.
- Immunodépression.
- Diabète.
- Obésité.
- Tare associée.
- État général du patient au moment de l'intervention défini par la classe ASA (*tableau 91.1*).

Tableau 91–1. Classe ASA (*American Society of Anesthesiologists*).

Classe	Type de patient
ASA 1	Pas d'autre affection que celle nécessitant l'acte chirurgical
ASA 2	Perturbation modérée d'une grande fonction
ASA 3	Perturbation grave d'une grande fonction
ASA 4	Risque vital imminent
ASA 5	Patient moribond

2. Facteurs de risque liés à la prise en charge

- Caractère d'urgence (non programmé) de la chirurgie.
- Type de chirurgie défini selon la classification d'Alteimer (voir *tableau 91.2*).
- Durée de séjour préopératoire.
- Qualité de préparation de l'opéré : hygiène corporelle, dépilation.
- Qualité de l'intervention chirurgicale : expérience de l'équipe chirurgicale, durée de l'intervention, qualité du champage, de l'hémostase, qualité du drainage.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Fiche **Dernier tour**

Infections nosocomiales

Généralités

- L'infection nosocomiale (IN) désigne une infection acquise dans un établissement de soins.
- Si l'état infectieux n'est pas connu à l'admission, un délai de survenue ≥ 48 heures est nécessaire pour définir une IN.
- Les IN entraînent une augmentation de la morbidité, de la mortalité, de la durée de séjour et un surcoût.
- Les germes responsables sont endogènes (malade infecté à partir de sa flore à l'occasion d'une diminution des défenses), ou exogènes (manuportage, contamination d'un matériel médical ou de l'environnement).
- La forte prévalence en réanimation est liée :
 - aux dispositifs invasifs ;
 - à la prise en charge de patients présentant une affection grave responsable d'une diminution des défenses immunitaires ;
 - à la densité des soins ;
 - au caractère d'urgence (risque de rupture d'asepsie).
- La « pression antibiotique » en réanimation explique la fréquence des BMR : SARM, entérobactéries résistantes aux C3G (BLSE ou hyperproduction de céphalosporinases), *P. aeruginosa* résistants à la ceftazidime, *A. baumanii* résistants à la ticarcilline ou à l'imipénème, entérocoques résistants à la vancomycine (VRE), *S. aureus* résistants aux glycopeptides (GISA).
- La proportion d'infections d'origine manuportée est importante en réanimation du fait de la densité des soins. L'hygiène des mains est une mesure majeure permettant de réduire significativement l'incidence des IN.

Prévention

- Application de mesures d'hygiène strictes [0] : lavage des mains, frictions hydroalcooliques.
- Adoption de conduites à tenir rigoureuses [0] : dépistage de la colonisation nasale et rectale, procédures d'isolement technique et géographique, signalisation des patients colonisés ou infectés à BMR.
- Choix raisonné lors de la prescription d'antibiotiques [0]

Surveillance

- Surveillance nationale des principales infections (calculs de prévalence et d'incidence).
- Surveillance de l'environnement (eau, air, matériel, surfaces).
- Réalisation d'enquête d'incidence sur une durée définie (calculs de densité d'incidence, de taux d'attaque).
- Signalement interne au CLIN [0].
- Signalement externe C. CLIN [0] et à la DDASS obligatoire en cas de décès, d'IN ayant un caractère particulier, d'IN suspecte d'être causée par un germe de l'eau ou l'air environnant, d'IN par une maladie à déclaration obligatoire, d'épidémie .

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Infections urinaires sur sonde

- 40 % des infections nosocomiales et 0,1 % des décès par infection nosocomiale.
- **Facteurs de risque** : sondage vésical prolongé [0], antibiothérapie préalable [0].
- **Germes** : *E. Coli* [0], entérocoques, *P. Aeruginosa*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Serratia sp.*, *Candida sp.*, SARM.
- **Diagnostic** : fièvre et/ou signes fonctionnels urinaires et uroculture positive ($\geq 10^5$ UFC/mL) avec au plus 2 micro-organismes différents, la sonde vésicale étant en place ou retirée dans la semaine précédente.
- **Prise en charge** :
 - rechercher une pyélonéphrite ou une prostatite [0] (échographie, uro-scanner) ;
 - monothérapie antibiotique (quinolone) ; en présence de signes de gravité et/ou d'infection à *Acinetobacter sp.*, *Pseudomonas sp.* ou *Enterobacter sp.* : bithérapie antibiotique par une béta-lactamine anti-pyocyanique (piperacilline-tazobactam, ceftazidine, imipénène) et un aminoside ;
 - la bactériurie asymptomatique d'un patient sondé n'est pas traitée [0].
- **Prévention** :
 - imiter les indications et la durée du sondage vésical [0] ;
 - respecter une asepsie stricte lors de la pose de la sonde urinaire (procédure écrite) [0] ;
 - utiliser un système clos de drainage [0].

Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (pavm)

- 40 % des patients placés sous ventilation mécanique ; 1re cause de décès par infection nosocomiale (mortalité estimée entre 30 et 50 %).
- Facteurs de risque :
 - ventilation mécanique prolongée [0] ;
 - position couchée à plat [0].
- **Germes en causes** :
 - ≤ 6 J (PAVM précoce) : pneumocoques, *Haemophilus spp*, entérobactéries sensibles, SASM [0] ;
 - > 6 J (PAVM tardive) : *Pseudomonas spp*, *Acinetobacter*, entérobactéries résistantes (*Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*), SARM [0].
- **Diagnostic** : il repose sur la réalisation de prélèvements distaux per-endoscopiques :
 - brosse distale protégée : culture ≥ 10^3 UFC/mL ;
 - lavage bronchoalvéolaire : direct ≥ 5% des cellules infectées, culture ≥ 10^4 UFC/mL.
- **Prise en charge** : antibiothérapie empirique débutée dès réalisation des prélèvements [0] :
 - PAVM précoce : amoxicilline – acide clavulanique ou C3G ;
 - PAVM tardive : bithérapie avec une bétalactamine antipyocyanique associée pendant 3 à 5 jours à un aminoside ou ciprofloxacine. Si le staphylocoque est suspecté (colonisation, infection, antibiothérapie préalables) ou si le tableau est grave un traitement par vancomycine est associé.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche Dernier tour

■ **Prévention** :

– limiter les indications du cathétérisme veineux central [0] ;

– avoir une procédure de pose (asepsie chirurgicale [0]) et d'entretien (pansement et changement stériles des tubulures/72 h) du CVC ;

– respecter l'asepsie lors du maniement des tubulures et lors de la préparation des solutés de perfusion ;

– préférer l'abord sous-clavier, plutôt que jugulaire interne ou fémoral.

Infection du site opératoire

■ 3e cause d'infection nosocomiale, la mortalité attribuable atteint 5 %.

■ Facteurs de risque :

– état général du patient (classe ASA) ;

– type de chirurgie (classe d'Alteimer). Au total, l'évaluation du risque infectieux est possible par le calcul du score NNISS (*National nosocomial infections survey system*)

Calcul du score NNISS	Calcul du risque infectieux	
trois facteurs de risque indépendants sont retenus : – classe ASA 3, 4 ou 5 : 1 point – classe d'Altemeier III ou IV : 1 point – durée d'intervention > à un temps "t" prédéfini : 1 point	score NISS (points)	Risque infectieux (%)
	0	1,5
	1	3,5 à 4
	2	9 à 13
	3	20 à 30

■ **Germes** :

– chirurgie ostéo-articulaire, cardio-vasculaire ou neurochirurgie : staphylocoques ++ ;

– chirurgie abdominale : entérobactéries et anaérobies stricts ++.

■ **Diagnostic** (survenue dans les 30 jours suivant l'intervention, ou dans l'année si matériel étranger) :

– **infection superficielle** :

• affectant : peau ou muqueuses, tissus sous-cutanés, tissus au-dessus de l'aponévrose ;

• avec un écoulement purulent de l'incision ou l'isolement d'un germe et de PNN sur le liquide produit par l'incision ou la présence d'un des signes suivants : douleur à la palpation, tuméfaction, rougeur, chaleur et isolement d'un germe lors de l'ouverture de l'incision par le chirurgien ;

– **infection profonde** :

• affectant : tissus ou organes ou espaces situés au-dessous de l'aponévrose ;

• avec un écoulement purulent provenant d'un drain ou une déhiscence spontanée de l'incision ou l'ouverture par le chirurgien et au moins un des signes suivants : fièvre, douleur à la palpation et isolement d'un germe à la culture d'un prélèvement de l'organe ou de l'espace ou un abcès ou un autre signe d'infection observé lors d'une réintervention ou d'un examen d'imagerie.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Anesthésie

Marie-Pierre BONNET
Koceila BOUFERRACHE
Julien JOSSERAND

Copyrighted mater

Copyrighted material

Hidden page

3) Symptomatologie des complications de la noramidopyrine.
4) Prescription antalgique.

• 1997, zone Nord :

Homme de 50 ans, cancer du poumon, douleurs à type de brûlure permanente au niveau de la face interne du bras et avant-bras droits, jusqu'aux 2 dernières phalanges, non calmées par paracétamol + codéine. Deux adénopathies dures sus-claviculaires droites + Claude-Bernard-Horner œil droit.
1) Argumenter une prescription de buprénorphine en association au paracétamol + codéine.
2) Causes des douleurs du membre supérieur droit.
3) Autres médicaments utiles pour traiter cette douleur en dehors des analgésiques purs.

• 2001, zone Sud :

Homme de 65 ans, cancer du rectum, métastases multiples, douleurs pelviennes, automédication par paracétamol 500 mg *PO* à la demande, d'efficacité modeste.
1) Commenter le traitement.
2) Risque principal de cette automédication.
3) Traitement par *Di-antalvic* pendant 48 h, douleur inchangée. Rédiger l'ordonnance du nouveau traitement et l'expliquer au patient.
4) Durée de traitement sur l'ordonnance ? Expliquez.
5) Moyens d'évaluation de la douleur à la nouvelle consultation.

• 2007, dossier 4, question 7 :

Évaluer l'intensité de la douleur. Traitements symptomatiques préconisés pour la douleur intense, non calmée après l'administration de 1 gramme de paracétamol.

CONSENSUS



• Anti-inflammatoires non stéroïdiens – ANAES, 1996.

• Prise en charge de la douleur postopératoire chez l'adulte et l'enfant – SFAR, ANAES, 1997.

• Prise en charge de la douleur chronique de l'adulte en médecine ambulatoire – ANAES, 1999.

• Standards, options et recommandations 2002 pour les traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l'adulte. Mise à jour du rapport original de 1996 (rapport abrégé) – *Bull Cancer* 2002 ; *89* (12) : 1067-74.

• Mise au point sur le bon usage des opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses – Recommandations pour la pratique clinique – Afssaps, 2004 (http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/opioide/mapopio.pdf).

POUR COMPRENDRE...

- L'analyse sémiologique fine de la douleur conditionne la qualité de sa prise en charge thérapeutique.
- La douleur persistante est une situation clinique fréquente, impliquant dans sa genèse de nombreux facteurs et nécessitant une évaluation multifactorielle et une prise en charge multidisciplinaire, au mieux au sein d'une structure spécialisée.
- Une bonne gestion des traitements impose une parfaite connaissance des données physiopathologiques les plus récentes. La gestion des traitements médicamenteux doit être rigoureuse, méthodique et réévaluée régulièrement.
- Le traitement chirurgical comporte des possibilités de plus en plus sélectives, dont les résultats sont essentiellement liés à l'indication en fonction du type de douleur.

Copyrighted material

Hidden page

a) Acide acétylsalicylique (aspirine)

0 ■ Action anti-inflammatoire directe périphérique sur le foyer lésionnel (inhibi-
0 tion de la synthèse des prostaglandines) et effet antiagrégant plaquettaire.

■ Pharmacologie : résorption rapide (pic de concentration 40 à 60 min après) et presque complète ; forte liaison protéique (80 à 95 %) ; volume de distribution faible (0,16 L/kg) ; demi-vie de 15 à 30 min ; hydrolyse totale par les estérases plasmatiques en acide salicylique (demi-vie de 3 à 9 h), métabolite également actif et élimination rénale sous forme conjuguée.

■ Voie *per os* (PO) :

– formes à libération rapide : *Aspégic, Catalgine, Solupsan* ;

– forme à libération prolongée : *Aspirine pH 8* ;

– les formes solubles ou effervescentes sont mieux et plus rapidement résorbées que les comprimés.

■ Voie intraveineuse (IV) : *Aspégic*.

■ Posologie : 2 à 3 g/j.

■ Effet antiagrégant plaquettaire : 100-150 mg/j ; effet antalgique : 1-2 g/j ; effet anti-inflammatoire : 3 g/j.

0 ■ Effets secondaires nombreux : digestifs (nausées, douleurs abdominales,
0 ulcères, hémorragies), hématologiques (syndrome hémorragique), allergiques (hypersensibilité, œdème de Quincke), syndrome de Reye, neurologiques (céphalées, vertiges, baisse de l'acuité auditive, bourdonnements d'oreille), hyperuricémie.

*Concours Internat 2001, ECN 2007

*b) Paracétamol**

■ Action centrale : métabolite actif de substances dérivées de la phénacétine et de l'acétaminophène.

■ Activité analgésique comparable à celle de l'acétylsalicylique mais sans les effets anti-inflammatoires et antiagrégants.

■ Pharmacologie : résorption digestive rapide et presque complète (pic de concentration 30 à 90 min après) ; 80 % de biodisponibilité orale ; pas de liaison aux protéines plasmatiques (peu d'interférences médicamenteuses) ; volume de distribution de 0,9 L/kg ; demi-vie de 2 h, prolongée chez l'insuffisant hépatocellulaire et le nourrisson ; métabolisme hépatique principal en dérivés gluco et sulfoconjugués + voie secondaire par la N-acétyl-p-benzoquinone, responsable de nécrose hépatique en cas de surdosage massif.

■ Voie PO : *Dafalgan, Efferalgan*.

■ Voie IV : *Perfalgan*.

■ Posologie : 0,5 à 1 g par prise, 1 à 4 g par 24 h, intervalle minimal de 4 h entre les prises.

■ Bonne tolérance gastrique, allergie rare.

Copyrighted material

■ Toxicité hépatique avec insuffisance hépatique aiguë à partir de 10-15 g en dose unique chez l'adulte et 150 mg/kg chez l'enfant. Facteurs favorisants : insuffisance hépatique préexistante, variabilité métabolique. Antidote : N-acétylcystéine. [0]

c) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ITEM 174

■ Action anti-inflammatoire, antipyrétique et antalgique par l'inhibition des cyclo-oxygénases (COX-1 et 2) et de la lipo-oxygénase, inhibiteurs spécifiques de la COX-2 : célécoxib *(Celebrex)*. [0]

■ Pharmacologie : résorption rapide et quasi complète, Cmax = 1-2 h, liaison protéines à 90 %, métabolites hépatiques et surtout rénaux inactifs, élimination biliaire avec cycle entéro-hépatique (indométacine, diclofénac, piroxicam), demi-vie d'élimination variable d'une molécule à l'autre.

■ Voie PO, prise en cours de repas : kétoprofène *(Bi-profénid)*, 150 mg × 2/j, *Celebrex*, 100 à 200 mg × 1 à 2/j.

■ Voie rectale : morniflumate (*Nifluril* suppositoires), 1 suppositoire × 2/j.

■ Voie IM : kétoprofène *(Profénid)*, 100 mg × 2-3/j.

■ Voie IV lente : kétoprofène *(Profénid)*, 100 mg × 2/j.

■ Voie cutanée : acide niflurique (*Nifluril* pommade 3 %), 1 application × 3/j.

CONSENSUS

Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Recommandations ANAES, 1996

Sujets > 70 ans :
■ réduire les doses en fonction du poids ;
■ éviter les molécules à demi-vie longue ;
■ éviter les indoliques qui augmentent le risque de chutes ;
■ s'assurer impérativement que la clairance de la créatinine est supérieure à 30 mL/min avant de commencer le traitement ;
■ prescrire un protecteur gastroduodénal efficace (misoprostol) ;
■ surveiller la pression artérielle si le sujet est hypertendu, ainsi que la prise de poids et la survenue d'œdèmes des membres inférieurs.

■ Indications en particulier dans le cadre des douleurs secondaires à des pathologies inflammatoires.

■ Effets secondaires digestifs (nausées, douleurs abdominales, ulcère), allergiques (rash, syndrome de Lyell), rénaux (insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, troubles hydroélectrolytiques, néphropathies interstitielles), hématologiques (syndrome hémorragique), neurologiques (céphalées, vertiges), effets cardiovasculaires des coxibs. [0] [0]

Copyrighted material

d) Antalgiques en arrêt de commercialisation



- Floctafénine : n'est plus commercialisée suite à des réactions allergiques graves (choc anaphylactique).
- Noramidopyrine* : arrêt de commercialisation du fait de la survenue possible d'agranulocytose immunoallergique indépendante de la dose, ainsi que de collapsus et bronchospasme.

2. Analgésiques de palier 2 : opioïdes faibles

Les indications sont les douleurs aiguës ou chroniques, rebelles aux antalgiques non opioïdes, relais d'un traitement opioïde.

a) Codéine

- Morphinique faible.
- 30 mg de codéine PO sont équianalgésiques à 650 mg d'aspirine.
- Pharmacologie : absorption intestinale (70 %), métabolisme hépatique rapide soit en dérivés glycuronés, soit en morphine (10 %), durée d'action de 4 h.
- Voie orale uniquement :
 - en association avec le paracétamol : *Efferalgan codéiné, Dafalgan codéiné, Codoliprane** (1 à 6 cp/j). Il existe une synergie d'action potentialisatrice entre les 2 molécules en cas de dosage optimal (paracétamol 500 mg + codéine 30 mg).



 - formes orales LP : dihydrocodéine *(Dicodin)* : 60 mg/12 h.
- Effets secondaires fréquents : nausées, somnolence, constipation.

b) Dextropropoxyphène

- Morphinique faible.
- Pharmacologie : absorption par voie orale, durée d'action de 4 h, demi-vie de 8-10 h.



- En association au paracétamol par voie orale : *Di-antalvic** (dextropropoxyphène 30 mg + paracétamol 400 mg).
- Posologie : voie PO uniquement, 2 gélules/8 h au maximum.
- Effets secondaires de type morphinique : nausées, vomissements, constipation, somnolence, vertiges.

c) Tramadol

- Action centrale avec un effet opioïde par fixation aux récepteurs μ et un effet monoaminergique par inhibition du recaptage de la noradrénaline, ce dernier mécanisme étant impliqué dans le contrôle de la transmission nociceptive centrale (intérêt potentiel dans le traitement des douleurs neuropathiques).
- Puissance : 1/6 de celle de la morphine, effets dépresseurs respiratoires et sur le tractus gastro-intestinal plus faibles que ceux de la morphine, potentiel de tolérance et de dépendance plus faible.

Copyrighted material

Hidden page

– prescription simultanée sur ordonnance bizone sécurisée (ALD) ;
– rédaction conformément aux articles R5194 et R5213 du Code de la santé publique.

■ Modalités d'administration particulières aux opioïdes :

– titration : pour débuter un traitement morphinique. Débuter par 10 mg/4 h de morphine PO à libération immédiate. Puis ajuster le traitement par modification des doses de 30 à 50 % de la dose totale quotidienne par paliers de 24 h, mais pas par modification de l'intervalle. Une fois la dose déterminée, passer à une forme LP ;

– administration autocontrôlée (PCA) : permet au patient d'adapter l'analgésie à ses besoins dans les limites autorisées par la programmation en déterminant la fréquence des réinjections. Après chaque injection programmée, l'appareil est réfractaire à toute nouvelle demande si celle-ci se produit avant l'intervalle de temps programmé. En général, sont prescrits des bolus de 1 mg IV avec une période réfractaire de 7 min ;

– rotation des opioïdes (concept discuté) : définie par le changement d'un opioïde par un autre en cas de diminution du rapport bénéfice/risque. Objectif : réduction des effets indésirables.

CONSENSUS

Du bon usage des opïoides forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses
Afssaps, 2004
Traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l'adulte
Standards, options et recommandations, 2002

0 Effets secondaires communs à tous les morphiniques : digestifs (nausées, vomissements, constipation), à prévenir systématiquement par la prescription d'antiémétiques et de laxatifs ; dépression respiratoire antagonisée par l'injection de naloxone, prurit, rétention aiguë d'urines. La dépendance psychologique reste exceptionnelle.

■ **Morphine** :

– opioïde de 1re intention ;

– pharmacologie : absorption rapide par voie orale, biodisponibilité de 30 %, résultant d'une importante inactivation lors du 1er passage hépatique. Métabolisme en morphine-3-glycuronide (M3G), métabolite actif, et morphine-6-glycuronide (M6G), métabolite présentant des propriétés agonistes supérieures à celles de la morphine. Élimination sous forme de M3G et M6G, retardée en cas d'insuffisance rénale. Demi-vie de 2 à 4 h. Résorption complète par

Copyrighted material

voie SC ou IM. Apparition des effets analgésiques en 10 min par voie IV, 20 min par voie IM et 30 à 60 min PO. Durée d'action de 4 h ;

– voies d'administration et posologie *(tableau 66-1)* :

• voie PO à libération immédiate (6 prises par jour) : solution buvable de chlorhydrate de morphine (1 mg/mL), *Sévrédol* (sulfate de morphine, cp de 10 et 20 mg), *Actiskénan* (sulfate de morphine, gélules de 5, 10, 20 et 30 mg). Intérêt en interdose, à l'approche de stimulations douloureuses (soins…). Si un recours est très fréquent, réévaluer la dose totale ;

• voie PO à libération différée (2 prises par jour) : *Moscontin LP* (sulfate de morphine, cp de 10, 30, 60, 100, 200 mg), *Skénan LP* (sulfate de morphine, microgranules en gélules de 10, 30, 60, 100 et 200 mg) ;

• voie PO à libération prolongée (1 prise par jour) : *Kapanol LP* (sulfate de morphine, gélules de 20, 50 et 100 mg) ;

• voies IV, IM, SC : chlorhydrate de morphine. La voie IV peut être continue, discontinue, ou en mode PCA ;

Tableau 66-1. Tableau d'équivalence.

Morphine	IV	SC	PO
Équivalence (exemples)	PO/3 (20 mg/j)	PO/2 (5 mg x 6/j)	SC x 2, IV x 3 (10 mg x 6/j)

– le traitement par morphine est arrêté progressivement après prescription prolongée pour éviter la survenue d'un syndrome de sevrage : diminution par paliers de 30 à 50 % de la dose par semaine.

■ **Hydromorphone** :

– agoniste sélectif des récepteurs mu ;

– 7,5 fois la puissance de la morphine ;

– métabolite de la morphine et de la codéine ;

– pharmacologie : biodisponibilité de 22-62 %, métabolisme et excrétion urinaires ;

– voie PO : *Sophidone LP* ;

– indiquée dans les douleurs intenses d'origine cancéreuse en cas de résistance ou d'intolérance à la morphine ;

– effets secondaires : dépendance, accoutumance, sevrage.

■ **Oxycodone** :

– agoniste pur des récepteurs mu et kappa ;

– 2 fois la puissance de la morphine ;

– pharmacologie : délai d'action de 45-60 min, pic d'action de 2-4 h, durée d'action de 12 h ;

– voie PO : *Oxycontin LP* ;

Copyrighted material

Hidden page

• voie PO : délai d'action de 15 à 60 min, activité maximale obtenue en 2 h, durée d'action de 6-8 h ;

• voie parentérale : délai d'action de 10-20 min ;

– indiquée dans le cadre de la douleur chronique ;

– intérêt de la galénique : *Temgésic*, glossettes sub-linguales, 0,4 mg/4-6 h ; également IV, IM ou SC, 0,3 mg par dose ;

– inconvénients : effet plafond, dépression respiratoire non antagonisée par la *Naloxone*, somnolence.

CONSENSUS

Traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l'adulte
Standards, options et recommandations, 2002

Tableau 66-2. Durée de prescription des morphiniques ITEM 167

Médicaments	Formes	Durée maximale de prescription
Morphine injectable	Amp. de 10, 20, 50, 100 mg Sans système actif pour perfuser	7 jours 28 jours
Morphine solution buvable	Amp. de 10, 20 mg Flacon préparé en officine	14 jours
Sévredol	Cp de 10, 20 mg	14 jours
Actiskénan	Gél. de 5, 10, 20, 30 mg	14 jours
Sophidone LP	Gél. de 4, 8, 16, 24 mg	28 jours
Temgésic	Glossettes de 0,2 mg	28 jours
Moscontin LP	Cp de 10, 30, 60, 100, 200 mg	28 jours
Skénan LP	Gél. de 10, 30, 60, 100 mg	28 jours
Kapanol LP	Gél. de 20, 50, 100 mg	28 jours
Durogésic	Patch de 25, 50, 100 µg/h	28 jours (14 x 2)

B. Autres traitements médicamenteux

1. Antidépresseurs

a) Mécanisme d'action

■ L'effet antalgique est indépendant des effets thymoanaleptiques : régression de la douleur plus précoce, même chez les patients non déprimés, non corrélée à une amélioration de l'humeur, et analgésie obtenue avec des doses plus faibles que pour l'effet antidépresseur.

■ Leur mécanisme d'action reste imparfaitement élucidé : action centrale par blocage de la recapture de la sérotonine/noradrénaline ; autres mécanismes

Copyrighted material

évoqués : action sur les systèmes opioïdes endogènes, effet antihistaminique, blocage des récepteurs NMDA, effet sur le métabolisme de la substance P.

■ L'analgésie est observée après 5 à 10 jours de traitement.

b) Choix de la molécule

– Les différentes spécialités, toutes de voie d'administration orale, sont présentées au *tableau 66-3*.

CONSENSUS

Prise en charge de la douleur chronique de l'adulte en médecine ambulatoire
ANAES, 1999

Tableau 66-3. Antidépresseurs utilisés dans le traitement de la douleur.

Classe	Médicament	Posologie (mg/j)
Antidépresseurs tricycliques	Amitriptyline *(Laroxyl)* Clomipramine *(Anafranil)* Imipramine *(Tofranil)* Désipramine *(Pertofran)*	75-150
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine	Paroxétine *(Deroxat)* Fluvoxamine *(Floxyfral)* Citalopram *(Seropram)* Sertraline *(Zoloft)* Venlafaxine *(Effexor)*	20-40 100-300 20-60 50-200 75-150

c) Indications

0 ■ Douleurs neuropathiques (neuropathies diabétiques, postzostériennes).

■ Céphalées, migraines, céphalées de tension chroniques, algies vasculaires de la face.

■ Douleurs rhumatologiques (arthrites inflammatoires, fibromyalgies, douleurs lombaires chroniques).

0 ■ Douleurs cancéreuses.

d) Effets secondaires

■ Sédation, hypotension orthostatique, troubles du rythme, effets anticholinergiques.

2. Antiépileptiques

a) Mécanismes d'action

■ Blocage des canaux sodiques avec effet stabilisant des membranes ; fixation sur les récepteurs GABA-ergiques (barbituriques et benzodiazépines) entraînant une modification de perméabilité des canaux sodiques ; facilitation du transport du GABA avec inhibition de la recapture ou augmentation de la libéra-

Copyrighted material

Hidden page

- Psychotropes :
 - sédatifs, anxiolytiques, tranquillisants, hypnotiques *(Lexomil, Urbanyl, Tranxène)* ;
 - pas d'action antalgique propre ;
 - utiles pour traiter certains effets indirects de la douleur (anxiété, insomnie) ;
 - potentialisation des effets dépresseurs respiratoires et sédatifs des morphiniques.
- Myorelaxants et antispasmodiques :
 - traitement des contractures musculaires douloureuses : benzodiazépines (tétrazépam : *Myolastan*, diazépam : *Valium*) mais somnolence importante ; thiocolchicoside *(Coltramyl)* ;
 - contractures spastiques de la SEP, des affections du SNC : baclofène *(Liorésal)* ;
 - traitement des spasmes digestifs, utérins ou urinaires : phloroglucinol *(Spasfon)*.
- Traitements divers :
 - biphosphonates *(Clastoban, Didronel, Actonel, Aredia)* : indiqués dans la maladie de Paget, l'ostéoporose, les hypercalcémies malignes, les métastases osseuses ;
 - calcitonine *(Cibacalcine, Calsyn, Calcitar)* : indiquée dans les algodystrophies, l'ostéoporose, les hypercalcémies, les syndromes post-fracturaires ;
 - corticothérapie locale et générale +++.

III. TRAITEMENTS NON MÉDICAMENTEUX

A. Traitements neurochirurgicaux

Indiqués dans les algies chroniques, rebelles aux traitements antalgiques usuels. Les techniques sont différentes selon la physiopathologie, en particulier en fonction de la distinction entre douleur par excès de nociception et douleur neuropathique.

1. Méthodes d'interruption des voies de la nociception

Elles sont indiquées en cas de douleurs par excès de nociception, en général liées à une évolutivité néoplasique et mal contrôlée par les substances morphiniques :

- interruption au niveau de la jonction radicellomédullaire : radicellotomie postérieure sélective (section pluriétagée des fibres sensitives de petit calibre). Réalisée en cas d'algies cancéreuses limitées (exemple : syndrome de Pancoast-

Copyrighted material

Tobias), où il convient de respecter la sensibilité profonde, nécessaire au fonctionnement moteur d'un membre ;

- interruption au niveau du faisceau spinothalamique : cordotomie spinothalamique cervicale ou dorsale ou tractotomie pédonculaire stéréotaxique. Réalisée en cas de douleurs cancéreuses strictement unilatérales du fait du risque d'atteinte de la commande respiratoire centrale (ostéosarcome fémoral, cancer ORL) ;
- interruption au niveau du nerf trijumeau : thermocoagulation du nerf trijumeau par voie percutanée. Réalisée en cas de névralgie du trijumeau essentielle ou de névralgie symptomatique (SEP).

2. Méthodes augmentatives

Elles sont indiquées en cas de douleurs neuropathiques exclusivement :

- neurostimulation transcutanée à visée analgésique :
 - en cas de douleur de topographie limitée, mono ou biradiculaire ;
 - elle consiste en une stimulation à haute fréquence et faible intensité au moyen d'électrodes fixées sur la peau et reliées aux bornes d'un générateur, provoquant des paresthésies dans le territoire des douleurs ;
- stimulation médullaire :
 - en cas d'algies neuropathiques sévères, secondaires à une lésion tronculaire ou radiculaire chronique, dans certaines douleurs postamputation ou certaines algies chroniques en rapport avec une dystrophie réflexe sympathique ;
 - elle consiste en l'implantation d'une électrode quadripolaire dans l'espace péridural postérieur, reliée à un *pacemaker* neurologique implanté au niveau du flanc et programmé par télémétrie ;
- stimulation cérébrale profonde :
 - en cas de douleurs neuropathiques sévères ;
 - elle consiste en l'implantation stéréotaxique d'une électrode au contact du noyau ventro-postéro-latéral du thalamus, reliée à un *pacemaker* neurologique implanté en région sous-claviculaire ;
- stimulation du gyrus moteur : elle consiste en l'implantation d'une électrode dans l'espace extradural, immédiatement en regard du cortex moteur, reliée à un *pacemaker* neurologique.

3. Pharmacothérapie locale

Elle consiste à apporter la substance antalgique directement au contact de ses récepteurs, afin d'augmenter l'action thérapeutique et de diminuer les effets secondaires :

- morphinothérapie intrathécale : indiquée en cas de douleurs néoplasiques intenses, en particulier intéressant la moitié inférieure du corps et rebelles à la

Copyrighted material

morphine par voie orale à doses suffisantes, ou en cas d'effets secondaires indésirables majeurs ;

- morphinothérapie intracérébroventriculaire :
 - indiquée en cas d'algies cervicofaciales diffuses, liées aux cancers de la sphère ORL et/ou stomatologiques ;
 - elle consiste à administrer la morphine au contact direct des récepteurs opioïdes périventriculaires, à la faveur d'un geste neurochirurgical simple.

B. Traitements non médicamenteux et non chirurgicaux

Il s'agit de techniques utilisant un agent physique délivrant de l'énergie et des prises en charge psychothérapeutiques.

Elles peuvent trouver leur place avant la pharmacologie ou à la suite d'une intervention chirurgicale ou en association à l'une de ces méthodes :

1. Thermothérapie

C'est l'analgésie par la chaleur. Par exemple, enveloppement dans des serviettes chaudes, Fango, para-Fango, emplâtres, lampes à infrarouges, courants à ondes courtes ou ultrasons, faisant mieux pénétrer la chaleur en profondeur.

2. Cryothérapie

C'est l'analgésie par le froid. Elle est utilisée dans les douleurs ostéoarticulaires (entorses, contusions).

3. Vibrothérapie

C'est l'analgésie par les vibrations électriques. Des ultrasons produits par des émetteurs piézoélectriques provoquent des vibrations mécaniques et agissent à la fois par leurs effets thermiques profonds et par les effets mécaniques des vibrations. Cette technique est utile dans les douleurs rhumatologiques.

4. Contrôle de la douleur par l'électricité

C'est une méthode thérapeutique ancienne prise à nouveau en considération depuis la théorie du portillon de Wall et Melzach : stimulation à haute fréquence et de basse intensité. Le mécanisme d'action serait une activation des systèmes opiacés endogènes.

Dans certains cas (rhumatismes articulaires, lombalgies, raideurs articulaires posttraumatiques douloureuses), des stimulations à basse fréquence et à forte intensité peuvent être pratiquées à distance de la zone douloureuse, au niveau des points d'acupuncture ou des zones gâchettes.

5. Prise en charge psychologique

Il s'agit des thérapies classiques, mais aussi de techniques de relaxation soit hypnotiques, soit analytiques. L'indication sera posée par un spécialiste ITEMS 69, 142.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche **Dernier tour**

Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses

Stratégie de prise en charge globale d'une douleur aiguë ou chronique :

- le traitement antalgique dépend de l'étiologie, du mécanisme, du caractère aigu ou chronique, de l'intensité et de l'évolution dans le temps de la douleur ;
- traitement multimodal, voie d'administration la plus simple possible (PO +++), posologies adaptées, administration systématique en période douloureuse ;
- prévention des effets secondaires 0 ;
- réévaluation de l'efficacité régulièrement grâce aux échelles spécifiques ;
- prise en charge globale et multidisciplinaire 0 (relation médecin-malade +++). 0

Traitements médicamenteux de la douleur :

- analgésiques :
 - analgésiques de palier 1 *(tableau 66-5)* ;
 - analgésiques de palier 2 *(tableau 66-6)* ;
 - analgésiques de palier 3 (opioïdes forts) :
 - agonistes purs *(tableau 66-7)* ;
 - agonistes-antagonistes *(tableau 66-8)*.
- autres traitements médicamenteux :
 - antidépresseurs :
 - tricycliques ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ;
 - indiqués pour les douleurs neuropathiques 0, les céphalées, les douleurs rhumatologiques et cancéreuses 0 ;
 - antiépileptiques :
 - action sur les paroxysmes douloureux ;
 - indiqués dans les douleurs neuropathiques 0, les douleurs centrales, la migraine ;
 - autres : antimigraineux spécifiques, psychotropes (sédatifs, tranquillisants, hypnotiques), myorelaxants et antispasmodiques, traitements divers (corticothérapie).

Traitements non médicamenteux :

- traitements neurochirurgicaux :
 - méthodes d'interruption des voies de la nociception : radicellotomie postérieure sélective, cordotomie spinothalamique, thermocoagulation du trijumeau ;
 - méthodes augmentatives : neurostimulation transcutanée, stimulation médullaire, cérébrale profonde, ou du gyrus moteur ;
 - pharmacothérapies locales : morphinothérapie intrathécale ou intracérébroventriculaire ;
- traitements non chirurgicaux : thermothérapie, cryothérapie, vibrothérapie, contrôle de la douleur par l'électricité, prise en charge psychologique.

Évaluation de l'efficacité d'un traitement antalgique :

- échelles unidimensionnelles (EVS, ENS, EVA 0), multidimensionnelles (*Mac Gill Pain Questionnaire*, questionnaire Douleur Saint-Antoine), comportementales (échelle comportementale de Bourhis, échelle de Comfort) ;
- évaluation de la compliance 0.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche Dernier tour

Tableau 66-7. Agonistes morphiniques purs.

Médicaments	Puissance morphinique	Voie d'administration	Nom commercial	Posologie	Indications	Durée de prescription Ordonnance sécurisée
Morphine	1	PO à libération immédiate ou LP	*Sévrédol, Actiskénan, Moscontin LP, Skénan LP*	Débuter à 10 mg/4 h	Douleur aiguë ou chronique, en titration, en PCA ou en traitement de fond	7 j IV, 28 j en l'absence de système de perfusion, 14 j PO, 28 j PO LP
		IM, IV, SC	Chlorhydrate de morphine			
Hydromorphone	7,5	PO	*Sophidone LP*	Variable	Douleurs cancéreuses avec intolérance ou résistance à la morphine	28 j
Oxycodone	2	PO	*Oxycontin LP*	Variable	Douleurs cancéreuses avec intolérance ou résistance à la morphine	28 j
Fentanyl	100	IV	*Fentanyl*		Anesthésie	
		Patch transdermique	*Durogésic*	1 patch/72 h	Traitement de fond des douleurs chroniques	28 j
		Application buccale	*Actiq*		Interdoses	

Tableau 66-8. Agonistes-antagonistes morphiniques.

Médicaments	Puissance morphinique	Voie d'administration	Nom commercial	Posologie	Indications
Nalbuphine	1	IM, IV, SC	*Nubain*	10-20 µg/kg/4-6 h	Douleur aiguë en pédiatrie
Buprénorphine	30	PO, glossette sub-linguale IV, IM, SC	*Temgésic*	0,4 mg/4-6 h 0,3 mg/4-6 h	Douleur chronique (prescription pour 28 j)

Copyrighted material

Hidden page

• Information des patients. Recommandations destinées aux médecins – SFAR, mars 2000.

• Les examens préopératoires systématiques – SFAR, décembre 1998.

• Survey of anesthesia-related mortality in France. Lienhart A, Auroy Y, Pequignot F, Benhamou D, Warszawski J, Bovet M, Jougla E. *Anesthesiology* 2006 ; *105* (6) : 1087-97.

POUR COMPRENDRE…

- On réalise 8 millions d'anesthésies par an en France, dont 20 % d'anesthésies locorégionales.
- Il existe une augmentation de la probabilité d'avoir une anesthésie avec l'âge (30 % par an pour les hommes > 75 ans).
- Objectif de l'anesthésie : permettre la réalisation d'actes douloureux ou inconfortables.
- L'anesthésie évite au malade de ressentir la douleur et de garder un souvenir de l'acte.
- Elle évite ou limite les réactions neuroendocriniennes réflexes liées à l'agression.
- Elle procure une immobilité et un relâchement musculaire nécessaires pour la réalisation d'actes chirurgicaux.
- On distingue l'anesthésie générale avec perte de conscience, et l'anesthésie locale ou locorégionale avec disparition de la sensibilité douloureuse et immobilité d'une partie du corps. Les deux techniques peuvent être associées.
- Il existe un risque anesthésique : complications graves mais extrêmement rares. Une anesthésie peut provoquer de façon imprévisible le décès d'une personne considérée en bonne santé. On dénombre un décès ou accident grave (avec des séquelles neurologiques irréversibles) pour 10 000 anesthésies, soit 700 cas par an en France, 50 % des cas au moment du réveil et d'origine respiratoire.
- Des efforts importants et des obligations légales ont été mis en œuvre pour réduire la morbi-mortalité anesthésique (divisée par 10 entre 1982 et 1999).

I. ANESTHÉSIE GÉNÉRALE (AG)

A. Généralités

- L'AG consiste à provoquer une perte de conscience, associée à une analgésie et une immobilité.

Copyrighted material

■ Elle comporte 3 phases :

– l'**induction** : passage de l'état éveillé à l'état d'inconscience ;
– l'**entretien** : de durée aussi longue que nécessaire en fonction de la chirurgie, voire parfois au-delà ;
– le **réveil** : récupération progressive des différentes fonctions, de façon plus ou moins rapide suivant les médicaments injectés.

■ Il existe différentes profondeurs d'anesthésie :

– l'AG proprement dite, avec perte totale de la conscience pour la chirurgie profonde ;
– la sédation ou anesthésie vigile, avec conservation d'un certain degré de conscience, pour les procédures moins invasives.

■ L'anesthésie peut être précédée d'une **prémédication** visant à induire une sédation pour calmer l'anxiété.

■ L'AG est provoquée grâce à l'administration de trois types de médicaments :

– un **hypnotique** ou anesthésique général : 0
• administration par voie intraveineuse (IV) : barbiturique (thiopental), ou non barbiturique (propofol, étomidate ou kétamine), utilisé pour l'induction et plus rarement pour l'entretien (propofol) ;
• administration par voie inhalée : protoxyde d'azote et gaz halogénés (isoflurane, desflurane ou sévoflurane), utilisés pour l'entretien chez l'adulte et l'enfant et pour l'induction chez l'enfant et parfois l'adulte.
• les benzodiazépines (midazolam) administrées par voie IV provoquent également une sédation plus ou moins importante et peuvent être associées aux précédents ou utilisées en prémédication ;

– un **analgésique** central dérivé de la morphine : sufentanil, alfentanil, rémifentanil, drogues dérivées de la morphine, qui se différencient essentiellement par leur durée d'action ; 0

– si nécessaire un **curare** pour augmenter le relâchement musculaire au moment de l'intubation orotrachéale et pendant le geste chirurgical. Les curares agissent en bloquant la transmission synaptique au niveau de la jonction neuromusculaire. On distingue les curares dépolarisants (succinylcholine) et les curares non dépolarisants (vécuronium, atracurium/cisatracurium, rocuronium, mivacuriun). 0

■ Les médicaments anesthésiques vont entraîner une dépression hémodynamique (hypotension artérielle) et une dépression respiratoire plus ou moins importantes. En cas d'anesthésie générale (mais pas de sédation), la prise en charge artificielle de la ventilation est habituellement nécessaire (assistance ventilatoire avec masque laryngé ou intubation orotrachéale).

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

– collyre : chirurgie de la cataracte.

C. Contre-indications

- Communes à toutes les anesthésies locales et ALR :

– refus du patient (après information éclairée) ;

– infection au point de ponction ;

– troubles de l'hémostase spontanés ou secondaires à un traitement anticoagulant et compression artérielle locale impossible, en particulier pour les blocs périmédullaires (risque d'hématome compressif) ;

– contre-indications aux AL : allergie et certaines cardiopathies sévères (exceptionnelles) ;

– troubles neurologiques suspects ou mal étiquetés.

- Contre-indications spécifiques aux blocs périmédullaires : hypovolémie et instabilité hémodynamique (aggravées par le bloc sympathique induit).

D. Risques

- Échec et anesthésie insuffisante.
- Lésions neurologiques : localisation nerveuse traumatisante ou injection intraneurale ou solution injectée toxique.
- Toxicité systémique des AL.
- Perforation d'organe (pneumothorax…).
- Hématome et dissection artérielle, en particulier hématome périmédullaire avec compression médullaire pour les blocs centraux.
- Infection, en particulier méningite dans le cas de la rachianesthésie.
- Risque d'arrêt cardiaque secondaire aux conséquences hémodynamiques des blocs centraux.

III. OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES À RESPECTER AVANT UNE ANESTHÉSIE

L'anesthésie ne peut être pratiquée que par un médecin anesthésiste, éventuellement assisté par une infirmière anesthésiste diplômée d'État. La pratique de l'anesthésie est réglementée par le décret 94-050 du 5 décembre 1994.

A. Consultation d'anesthésie

Elle doit être réalisée plusieurs jours avant une intervention programmée (≥ 48 h). Elle consiste en :

- un interrogatoire, avec recueil des antécédents personnels et familiaux, notamment d'accidents anesthésiques, des traitements habituels et de risques allergiques (curares, latex, antibiotiques) ➤ ITEM 171 ;

Copyrighted material

- un examen clinique obligatoire, avec recherche de critères d'intubation difficile, notamment le degré d'ouverture de bouche (score de Mallampati), examen cardiovasculaire et pulmonaire ; [0]
- une évaluation du terrain selon la classification ASA *(American Society of Anesthesiology)* : [0]
 - ASA I : absence de maladie systémique ;
 - ASA II : présence de maladie(s) systémique(s) non invalidante(s) (par exemple, HTA contrôlée non compliquée) ;
 - ASA III : présence de pathologie(s) systémique(s) entravant la vie courante (par exemple, angor d'effort) ;
 - ASA IV : présence de pathologie(s) systémique(s) entravant gravement la vie courante avec risque vital permanent (par exemple, rupture d'anévrisme cérébral, insuffisance cardiaque ou respiratoire sévère) ;
 - ASA V : patient moribond ;
- la prescription d'examens complémentaires en fonction de l'intervention prévue et du terrain (RPC SFAR, décembre 1998) ➤ ITEMS 4, 5 ;
- la mise en place d'une stratégie anesthésique avec poursuite ou arrêt des traitements habituels, évaluation du risque transfusionnel ➤ ITEM 178, jeûne préopératoire de 6 à 8 h au minimum pour les solides et de 2 h pour les liquides clairs (eau, thé, café sans lait) afin de diminuer le risque d'inhalation, prescription d'une prémédication et d'une antibioprophylaxie, choix entre AG et/ou ALR, indication d'un monitorage peropératoire spécifique, évaluation du risque thrombotique péri-opératoire (RPC SFAR, 2005) ➤ ITEM 175. [0]

CONSENSUS

Information des patients.
Recommandations destinées aux médecins SFAR, mars 2000

L'anesthésiste doit donner des informations au patient [0] sur le choix de la stratégie anesthésique et son déroulement, sur les risques liés à l'anesthésie et les suites postopératoires ➤ ITEM 6.

B. Visite préanesthésique

Elle a lieu la veille ou dans les heures qui précèdent l'anesthésie.

Il s'agit de revoir le patient afin de rechercher des modifications pathologiques, vérifier les modalités thérapeutiques et la bonne application des consignes préopératoires, notamment du jeûne et de la prémédication.

C. Préparation de la salle d'intervention en vue d'une anesthésie

Il s'agit d'une préparation méthodique rigoureuse et systématique, avec des vérifications consignées sur un registre, datées et signées : vérification du bon [0]

Copyrighted material

Hidden page

F. Cas particulier de l'anesthésie en urgence

Les obligations réglementaires en cas d'anesthésie en urgence sont les mêmes qu'en dehors du contexte de l'urgence. Cependant les délais accordés ne sont pas les mêmes, en particulier, la consultation d'anesthésie peut avoir lieu immédiatement avant la chirurgie. La visite préanesthésique n'aura pas lieu d'être. La préparation de la salle en vue d'une anesthésie, le monitorage peropératoire et la surveillance postopératoire répondront aux mêmes obligations*.

*Concours Internat 2003

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Hidden page

ITEM 201

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces

	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Dernier tour
Date				

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

- ITEM 101 Pathologie d'inoculation.
- ITEM 103 Prévention du tétanos.
- ITEM 178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance.
- ITEM 192 Déficit neurologique récent.
- ITEM 195 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte.
- ITEM 197 Douleur thoracique aiguë et chronique.
- ITEM 198 Dyspnée aiguë et chronique.
- ITEM 199 État confusionnel et trouble de conscience.
- ITEM 200 État de choc.
- ITEM 213 Piqûres et morsures. Prévention de la rage.
- ITEM 214 Principales intoxications aiguës.
- ITEM 238 Fracture de l'extrémité inférieure du radius chez l'adulte.
- ITEM 239 Fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte.
- ITEM 144 Hémorragie méningée.
- ITEM 175 Péritonite aiguë.
- ITEM 276 Pneumothorax.
- ITEM 301 Déficit moteur et/ou sensitif des membres.
- ITEM 312 Épanchement pleural.
- ITEM 329 Troubles de l'hémostase et de la coagulation.

Sujets tombés aux concours de l'Internat

Sujets tombés

- 1996 : Plaie de main compliquée.
- 1998 : Écrasement de membre – « Crush » syndrome.
- 2000 : Plaie de main compliquée.
- 2002 : Traumatisme abdominal : contusion pancréatique.
- 2003 : Traumatisme crânien : hématome sous-dural.

Copyrighted material

CONSENSUS

- Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier – Conférence d'experts – SFAR, 2006.
- Prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce – Recommandations pour la pratique clinique – ANAES, 1998.
- Réanimation du brûlé à la phase aiguë – Conférence d'actualisation – SFAR, 2001.
- Prise en charge des plaies aux urgences – Conférence de consensus – décembre 2005.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un brûlé

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

- ITEM 49 Évaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap moteur, cognitif ou sensoriel.
- ITEM 91 Infections nosocomiales.
- ITEM 104 Septicémie.
- ITEM 110 Besoins nutritionnels et apports alimentaires de l'adulte. Évaluation de l'état nutritionnel. Dénutrition.
- ITEM 198 Dyspnée aiguë et chronique.
- ITEM 199 État confusionnel et trouble de conscience.
- ITEM 200 État de choc.
- ITEM 214 Principales intoxications aiguës.
- ITEM 219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydroélectrolytiques.
- ITEM 252 Insuffisance rénale aiguë – Anurie.

CONSENSUS

- Réanimation du brûlé à la phase aiguë – Conférence d'actualisation – SFAR, 2001.

POUR COMPRENDRE...

- La prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale d'un brûlé conditionne le pronostic vital, esthétique et fonctionnel ultérieur.
- Le médecin accueillant un brûlé doit :

Copyrighted material

– déterminer l'étiologie ;

– déterminer la localisation et l'étendue de la brûlure ;

– évaluer la gravité ;

– rechercher les intoxications associées (monoxyde de carbone et cyanures) ;

– débuter si besoin les manœuvres de réanimation ;

– orienter le patient vers un centre de prise en charge spécialisé.

I. ÉPIDÉMIOLOGIE

■ 500 000 personnes par an sont victimes de brûlures en France. Celles-ci entrent principalement dans le cadre d'accidents domestiques, mais peuvent également être secondaires à des accidents de la voie publique (AVP) (voir « Prise en charge du polytraumatisé », p. 247).

■ La brûlure chez l'enfant est fréquente et le plus souvent secondaire aux accidents domestiques par ébouillantement. Il s'agit le plus souvent de garçons âgés de 1 à 3 ans.

■ 2 000 personnes sont hospitalisées chaque année dans un centre spécialisé.

■ 1 000 personnes meurent de brûlures chaque année en France.

II. ÉTIOLOGIE

A. Brûlures thermiques (90 %)

■ Liquidiennes : eau bouillante, huile chaude.

■ Solides : métal chaud (poêle, fer à repasser…).

■ Autres : feu, gaz chaud lors d'une explosion.

B. Brûlures électriques (5 %)

Elles sont de 2 types :

■ arc électrique : le courant ne pénètre pas l'organisme et la brûlure est similaire à une brûlure thermique ;

■ contact direct avec le conducteur : elles sont profondes, avec un point d'entrée et un point de sortie qu'il faudra rechercher. Elles sont associées à une électrisation. Les conséquences sont cardiaques (troubles du rythme et de la conduction), rénales par nécrose tubulaire aiguë, et neurologiques.

C. Brûlures chimiques (5 %)

■ Il peut s'agir de brûlures dues à des produits d'entretien, de brûlures dans le cadre de professions de l'industrie chimique, de radiations ionisantes.

■ Elles réalisent des lésions le plus souvent punctiformes. Il ne faut jamais chercher à tamponner un acide ou une base. Le lavage à l'eau claire doit être abondant.

Copyrighted material

III. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Profondeur des brûlures

Profondeur	Histologie	Clinique	Évolution
1er degré	Couche cornée de l'épiderme	Érythème « Coup de soleil »	Guérison en quelques jours sans séquelle
2e degré superficiel	Ensemble de l'épiderme	Phlyctènes Aspect rosé Exulcérations suintantes Douleur intense	Guérison en 15 j sans séquelle
2e degré profond	Ensemble de l'épiderme et de la couche de Malpighi du derme, pas d'atteinte des phanères	Aspect blanc et rose Douleur moindre Hypoesthésie	Cicatrisation longue Cicatrices hypertrophiques
3e degré	Ensemble de l'épiderme et du derme ± hypoderme	Aspect cartonné et induré de la peau Indolore, anesthésie complète	Pas de cicatrisation spontanée Greffe de peau




Fig. 201-1. Profondeur des brûlures.

B. Étendue de la brûlure

La règle des 9 de Wallace *(fig. 201-2)* permet le calcul de la surface brûlée par rapport à la surface corporelle totale :

- tête : 9 % ;
- tronc : 9 % x 4 ;
- membres supérieurs : 9 %/membre ;
- membres inférieurs : 18 % x 2 ;
- organes génitaux externes 1 %.

C. Conséquences locales et générales

La perte du revêtement cutané secondaire à la brûlure va entraîner :

- une extravasation d'eau, d'électrolytes et de protéines en dehors du secteur vasculaire, à l'origine d'une hypovolémie et, à l'extrême, d'un choc hypovolémique ;

Copyrighted material




Fig. 201-2. Règle des 9 de Wallace.

- une diminution de la pression oncotique, pouvant induire un œdème pulmonaire et un œdème cérébral ;
- une hyperactivité métabolique, à l'origine d'une dénutrition, elle-même favorisant les complications infectieuses ;
- une contamination bactérienne et un risque infectieux.

D. Lésions associées

- Traumatismes dans le cadre d'un AVP (voir « Prise en charge du polytraumatisé », p. 247). 0
- Inhalation de suie et de fumée à l'origine d'un œdème pulmonaire lésionnel et de brûlures des voies aériennes, pouvant évoluer jusqu'au SDRA. 0
- Intoxications oxycarbonée et cyanhydrique ITEM 214. 0

IV. DIAGNOSTIC POSITIF

Il est principalement orienté vers la recherche de signes de gravité pouvant mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel.

A. Interrogatoire

- Terrain :
 - âge ;
 - antécédents médicochirurgicaux ;
 - statut vaccinal antitétanique ; 0
 - traitement au long cours.
- Mécanisme lésionnel :
 - circonstances de la brûlure, horaire ;
 - nature de l'agent responsable. 0

Copyrighted material

B. Examen clinique

1. Examen général

- État de conscience, score de Glasgow.
- Hémodynamique : fréquence cardiaque et pression artérielle.
- Fréquence respiratoire et saturation en oxygène.
- Température.
- Examen ophtalmologique en cas de projections chimiques.
- Recherche de lésions associées et d'une intoxication au CO et cyanures ITEM 214.

2. Examen local réalisé en asepsie rigoureuse

- Évaluation de la profondeur.
- Surface corporelle brûlée (SCB) : règle des 9 de Wallace.
- Siège.

3. Évaluation de la gravité

Les **critères de gravité** sont les suivants :

- polytraumatisme associé ;
- intoxication oxycarbonée et cyanhydrique ;
- 2e degré profond et 3e degré ;
- étendue de la brûlure > 20 % ;
- atteintes des muqueuses, de la face, des voies aériennes supérieures et des mains ;
- brûlures circulaires du thorax (dyspnée) et des membres (ischémie aiguë).

CONSENSUS

Scores pronostiques
SFAR, 2001

- **Score UBS** (unité de brûlure standard) :
 - % de surface brûlée + 3 × % de surface brûlée au 3e degré ;
 - une brûlure est grave si UBS > 100 ;
 - mise en jeu du pronostic vital si UBS > 150.
- **Indice de Baux :**
 - âge + % de surface brûlée ;
 - une brûlure est grave si l'indice de Baux est > 50.

4. Bilan paraclinique

- NFS, TP, TCA : recherche d'une hémoconcentration.
- Groupe ABO, Rhésus, RAI.

Copyrighted material

- Ionogramme sanguin, à la recherche de troubles hydroélectrolytiques (hypoprotidémie, insuffisance rénale aiguë). [0]
- Gaz du sang, HbCO, lactates artériels (intoxication CO et cyanure). [0]
- ECG (brûlures par électrisation).
- Radiographie thoracique, à la recherche d'un œdème pulmonaire aigu. [0]
- Prélèvements bactériologiques multiples et répétés des surfaces brûlées. [0]

V. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

A. Sur place

- Extraction de l'agent causal. [0]
- Refroidissement cutané.
- Pansements occlusifs des zones atteintes.
- Pose d'une voie veineuse de bon calibre et expansion volémique par Ringer-lactate (RL). [0]
- Antalgiques : morphiniques. [0]

B. Traitement hospitalier

CONSENSUS

Traitement hospitalier du brûlé à la phase aiguë
SFAR, 2001

Traitement général

- Transfert et hospitalisation dans un centre de prise en charge spécialisé selon la gravité suspectée de la brûlure.
- Pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre en zone saine.
- Poursuite de l'expansion volémique par des cristalloïdes [0] (le Ringer-lactate est le soluté de choix), selon le protocole de Percy :
 - 20 mL/kg la première heure ;
 - 20 mL/kg/% de surface cutanée brûlée (SCB) les 8 heures suivantes ;
 - 0,5 mL/kg/% de SCB + albumine : 0,5 mL/kg/% de surface brûlée les 16 heures suivantes si SCB > 30 % ; 1 mL/Kg/% de SCB de Ringer-lactate si SCB < 30 %.
- Correction des troubles hydroélectrolytiques.
- Oxygénothérapie [0] et si besoin intubation orotrachéale avec ventilation mécanique.
- Prise en charge des intoxications associées [0] :
 - CO : oxygénothérapie en FiO_2 100 %, discuter l'oxygénothérapie hyperbare en fonction de la gravité ;
 - cyanure : hydroxocobalamine *(Cyanokit)*.

Traitement local

- Refroidissement initial des brûlures [0].
- Réchauffement du patient [0] (lutte contre la déperdition thermique).
- Cicatrisation dirigée [0] avec détersion et nettoyage au moyen d'un savon antiseptique, mise à plat des phlyctènes.

Copyrighted material

- Pansements stériles quotidiens avec des topiques anti-infectieux, type *Flammazine*.
- Incisions de décharge en cas de brûlures circulaires.
- À distance, greffes de peau à envisager, amputations [0].

Mesures associées

- Antalgie/sédation [0] : paracétamol, 1 g × 4/j, et antalgiques majeurs si besoin (morphiniques). Pansements sous anesthésie générale si besoin.
- Nutrition entérale ou parentérale hypercalorique [0].
- Pas d'antibioprophylaxie systématique [0] car elle peut être responsable de l'émergence de germes multirésistants. Elle n'est justifiée qu'en cas de brûlures souillées, ou d'infections documentées (pénicilline en première intention).
- SAT-VAT [0].
- Anticoagulation préventive et prévention des complications de décubitus [0].

C. Surveillance clinique et biologique

- Constantes vitales, poids.
- Ionogramme sanguin, diurèse.
- Prélèvements bactériologiques.

VI. COMPLICATIONS

La compréhension de la survenue de complications secondaires à une brûlure découle de la compréhension des mécanismes physiopathologiques associés au phénomène.

A. À court terme

- Choc hypovolémique et troubles hydroélectrolytiques : liés à la perte du revêtement cutané, entraînant une fuite massive d'eau, d'électrolytes et de protéines en dehors du secteur vasculaire ➤ ITEM 219.
- Insuffisance rénale aiguë : soit fonctionnelle secondaire à l'hypovolémie, soit organique par nécrose tubulaire aiguë, secondaire à une rhabdomyolyse ➤ ITEM 252.
- Respiratoires : OAP lésionnel, SDRA, pneumopathie infectieuse. Le brûlé est exposé au risque d'OAP lésionnel soit directement par l'inhalation de fumées, soit indirectement par la baisse de la pression oncotique ➤ ITEM 198.
- Surinfection locale et choc septique, secondaires à l'effraction bactérienne par perte du revêtement cutané et à un état d'immunodépression lié à la dénutrition ➤ ITEMS 104, 200. Ces infections sont responsables de 60 % des décès. Elles sont d'origine cutanée et également respiratoire (pneumopathies), urinaire et au point de ponction des cathéters centraux.
- Ischémie aiguë de membre et syndrome de loges : l'ischémie est le plus souvent due à la survenue de rétractions et de brides cutanées qui devront être excisées (voir « Traumatisme des membres », p. 271).
- Hypothermie.
- Dénutrition par hypercatabolisme majeur ➤ ITEM 110 : elle favorise le risque septique et retarde les processus de cicatrisation. Elle doit faire l'objet d'une

Copyrighted material

prise en charge de renutrition agressive par alimentation entérale ou, le cas échéant, parentérale.

- Complications de décubitus ITEM 50.
- Décès.

B. À long terme

- Séquelles esthétiques et fonctionnelles (cicatrisation et rétraction de membres, amputations). Des cancers cutanés (épithélioma spinocellulaire) peuvent survenir secondairement.
- Psychiatriques, par dépression secondaire au traumatisme.
- Handicap social ITEM 49.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un polytraumatisé

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance.

ITEM 200 État de choc.

CONSENSUS

- Choix des produits de remplissage vasculaire pour le traitement des hypovolémies de l'adulte : http://www.srlf.org/conferences/conf4.html.
- Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier : http://www.sfar.org/s / IMG/pdf/monitotraumaprehosp_cexp.pdf.
- Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier (texte court) – Conférence d'experts : http://www.bmlweb.org/consensus_lien.html#Urgences.
- Prise en charge d'un blessé adulte présentant un traumatisme vertébromédullaire (texte court) – Conférence d'experts – SFAR, 2003 : http://www.sfar.org/s/IMG/pdf/rachis_cexp.pdf.

POUR COMPRENDRE...

- Un polytraumatisé, ou traumatisé grave, est un blessé qui présente au moins deux lésions dont une engageant le pronostic vital. Un polytraumatisé est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes.

Copyrighted material

Hidden page

– examen des pupilles et réflexe photomoteur ; [0]

– toucher rectal : recherche une atonie du sphincter anal faisant suspecter un traumatisme médullaire. [0]

- Hémodynamique :
 - plaie hémorragique (plaie du scalp) ou saignement extériorisé ;
 - fréquence cardiaque ;
 - pression artérielle.
- Respiratoire :
 - fréquence respiratoire ;
 - signes de lutte ;
 - signes d'hypoxie ;
 - mesure de la SpO_2.

3. Mise en condition simultanée

- Immobilisation en rectitude craniorachidienne :
 - collier cervical rigide avec appui mentonnier et occipital ; [0]
 - matelas à dépression (dit « coquille ») ;
 - mobilisation sur plan rigide ;
 - brancardage avec 4 opérateurs, médecin ou infirmière à la tête.
- Mise en place de 2 abords veineux périphériques courts d'un calibre ≥ 16 G.
- Électrocardioscope, pression artérielle non invasive automatisée, oxymétrie pulsée.
- Oxygénothérapie à fort débit au masque à réserve.
- Mesure de la température tympanique et prévention de l'hypothermie (couverture de survie).
- Mesure de l'hémoglobine capillaire (hemocue).

4. Prise en charge des défaillances vitales immédiates

a) Neurologique

- Intubation orotrachéale si GCS ≤ 8.
- Sédation par un hypnotique (midazolam) et un morphinique (sufentanil) en perfusion continue.
- Osmothérapie par mannitol IV en cas de mydriase unilatérale aréactive.

b) Hémodynamique

- Hémostase des plaies hémorragiques, en particulier suture d'une plaie du scalp.
- Traitement du choc hémorragique :
 - remplissage vasculaire par colloïdes ou cristalloïdes ;
 - perfusion de vasopresseurs (noradrénaline) IVSE ;
 - transfusion de produits sanguins (qs) :

Copyrighted material

- Gonflage du pantalon antichoc devant un choc hémorragique avec suspicion d'hématome rétropéritonéal, en l'absence de traumatisme thoracique grave.

MÉMO : ÉTIOLOGIES DES ÉTATS DE CHOC TRAUMATIQUES

- Hémorragique.
- Obstructif ;
 - tamponnade gazeuse ;
 - tamponnade sur hémopéricarde ;
 - embolie graisseuse sur fracture du fémur.
- Spinal : vasoplégie par sympatholyse sur des lésions médullaires.
- Cardiogénique : contusion myocardique sévère.

c) Respiratoire

- Oxygénothérapie à fort débit.
- Intubation en séquence rapide et ventilation mécanique.
- Exsufflation d'un pneumothorax compressif.
- Le drainage pleural doit rester exceptionnel en préhospitalier.

5. Bilan lésionnel secondaire et soins de deuxième ligne

- Examen clinique :
 - étage craniofacial, examen dentaire ;
 - palpation et auscultation thoracique ;
 - électrocardiogramme ;
 - inspection et palpation abdominale ;
 - examen bilatéral et comparatif des 4 membres.
- Analgésie :
 - titration de morphine IV ;
 - paracétamol IV systématiquement associé ;
 - mise en place d'une sédation continue si le patient est intubé-ventilé (midazolam et sufentanil IVSE).
- Prévention de l'hypothermie : couverture de survie.
- Réduction et immobilisation des fractures et/ou luxations.
- Lavage à l'eau stérile, antisepsie et pansement des plaies.

6. Bilan à la régulation médicale du Samu-centre 15

Tout patient victime ou suspect d'un traumatisme grave doit bénéficier d'un transport médicalisé vers une structure hospitalière spécialisée entraînée à la prise en charge de ce type de pathologie.

Copyrighted material

B. Prise en charge hospitalière initiale

La conduite à tenir diagnostique et thérapeutique suivante doit être systématique, quel que soit l'état clinique du patient. En particulier, un examen clinique rassurant ou une hémodynamique « stable » ne dispenseront pas de cet algorithme.

1. Orientation

- Réanimation chirurgicale.
- Salle de réveil.
- Salle d'accueil des urgences vitales du SAU.
- Le médecin qui accepte d'accueillir le patient se charge de prévenir et coordonner :
 - les équipes chirurgicales ;
 - le radiologue ;
 - l'artériographiste ;
 - le centre de transfusion sanguine.

2. Prise en charge médicale

- Transmissions par le médecin du Smur.
- Mise en place d'un cathéter veineux central et d'un cathéter artériel, en première intention par voie fémorale, pour le cas échéant :
 - administration de catécholamines ;
 - monitorage continu de la pression artérielle systémique ;
 - prélèvements sanguins itératifs.
- Prise en charge du choc hémorragique :
 - remplissage vasculaire par colloïdes ;
 - perfusion de vasopresseurs (noradrénaline) IVSE : pression artérielle moyenne cible > 80 mmHg si traumatisme crânien grave (TCG), > 50 mmHg dans les autres cas ;
 - transfusion de concentrés érythrocytaires (CGR) :
 - Hb cible : > 9 g/dL si TCG, > 7 g/dL dans les autres cas ;
 - adaptée au débit hémorragique ;
 - adaptée à l'hémodynamique ;
 - transfusion de plasmas frais congelés (PFC) :
 - dès le 3e CGR prescrit, en raison de la dilution prévisible des facteurs de coagulation ;
 - TP cible : > 50 % si TCG, > 30 % dans les autres cas ;
 - transfusion de culots plaquettaires :
 - en cas de thrombopénie : < 100 g/L si TCG, < 50 g/L sinon ;
 - ou d'emblée en cas d'hémorragie cataclysmique ;

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

– surveillance neurologique : conscience, GCS, pupilles, examens neurologiques répétés dans le cadre de suspicion de lésion médullaire ;

– température toutes les 4 h ;

– monitorage de la pression intracrânienne parfois (voir la prise en charge du traumatisé crânien, p. 263).

■ Paraclinique :

– bilans biologiques répétés toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures et tant que le patient n'est pas stabilisé : hémogramme, hémostase, gaz du sang artériels, lactates artériels ;

– puis bilans plus espacés en l'absence d'aggravation (par 12 h puis par 24 h) ;

– radiographies pulmonaires quotidiennes si le patient est intubé-ventilé ;

– surveillance spécifique en fonction des lésions objectivées (voir sections correspondantes).

8. Gravité et complications

■ La gravité et les complications spécifiques à chaque organe sont traitées dans les sections correspondantes.

■ Par définition, chez un polytraumatisé, le pronostic vital est potentiellement mis en jeu.

■ La gravité d'un polytraumatisme dépend :

– des lésions initiales, en particulier la présence d'un TCG pour le pronostic à plus long terme, et de l'association de ces lésions (par exemple, TCG et contusion pulmonaire hypoxémiante ou TCG et CIVD) ;

– du terrain du patient ;

– de la rapidité de mise en place des soins ;

– de la présence d'un état de choc réfractaire.

■ Les complications sont :

– à court terme : le décès par hémorragie cataclysmique ou lésion cérébrale ou médullaire gravissime (lésions létales d'emblée) ;

– à moyen terme : décès par défaillance multiviscérale, complications infectieuses, thromboemboliques ;

– à long terme : décès, invalidité, impotence fonctionnelle, séquelles psychologiques.

Copyrighted material

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé abdominal

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance.

ITEM 195 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 268 Pancréatite aiguë.

ITEM 275 Péritonite aiguë.

Sujets tombés aux concours de l'Internat

Sujets tombés

- 2002. Traumatisme abdominal : contusion pancréatique isolée secondaire à un AVP.

1) Arguments cliniques et paracliniques plaidant pour une contusion pancréatique.
2) Examens d'imagerie à réaliser pour orienter le diagnostic.
3) Traitement et conduite à tenir (hospitalisation en USI, O_2, réanimation hydroélectrolytique, jeûne, insulinothérapie, surveillance, prévention des complications de décubitus…).
4) et 5) Complications immédiates et à distance d'une contusion pancréatique (nécrose pancréatique, infection de nécrose, péritonite, choc hémorragique, diabète, complications de décubitus, faux kystes…).

CONSENSUS

- Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier – Conférence d'experts – SFAR, 2006.

POUR COMPRENDRE…

- Il convient de distinguer les contusions abdominales (traumatismes fermés de l'abdomen) des traumatismes pénétrants abdominaux.
- Les patients présentant un traumatisme abdominal sont à considérer comme polytraumatisés : ces traumatismes peuvent être associés à des lésions extra-abdominales. Le pronostic vital est en jeu, le plus souvent par choc hémorragique.
- La prise en charge initiale consiste à réaliser le bilan lésionnel, débuter la réanimation et coordonner les différents intervenants (anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens, radiologues), avant de débuter le traitement spécifique du traumatisme abdominal.

Copyrighted material

I. ÉPIDÉMIOLOGIE

- Les contusions abdominales représentent 80 % des traumatismes abdominaux. Elles sont dues principalement aux accidents de la voie publique (75 % des cas), suivis des chutes de grande hauteur.
- Les traumatismes pénétrants sont responsables de 20 % des traumatismes abdominaux. Les causes en sont les plaies par arme blanche et par arme à feu.
- Les victimes sont en majorité des hommes jeunes.
- La mortalité s'élève à 30 % et dépend :
 - du type de lésions (plus fréquentes en cas de contusion) ;
 - du type d'organe et du nombre de viscères atteints ;
 - de l'existence de traumatismes extra-abdominaux associés ;
 - des antécédents du patient.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Contusions abdominales (traumatismes fermés)

Au cours des AVP et des chutes, il se produit une décélération brutale. L'énergie cinétique libérée génère des ondes de choc à l'origine de forces d'écrasement, d'étirement et de cisaillement des organes intra-abdominaux. Ces forces entraînent principalement des lésions de rupture des organes pleins, de leurs pédicules vasculaires et de leurs mésos, à l'origine d'hémorragie intra-abdominale et à l'extrême d'un choc hémorragique. Cette hémorragie siège classiquement dans la cavité péritonéale. Dans 20 % des cas, elle peut être rétropéritonéale (traumatismes de la loge rénale ou des gros vaisseaux).

Les lésions des organes creux sont plus rares. On les retrouve principalement lors de phénomènes de blast (ondes générées lors d'une explosion). De diagnostic plus difficile, elles peuvent être révélées à distance par une péritonite secondaire.

B. Traumatismes pénétrants

Les lésions touchent principalement les organes creux. Elles apparaissent sur le trajet mais également à distance dans le cas des plaies par arme à feu (ondes de choc transmises).

III. PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE

0 Tout traumatisé abdominal est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire et tout polytraumatisé a un traumatisme abdominal jusqu'à preuve du contraire (voir la prise en charge diagnostique d'un patient polytraumatisé, p. 247) .

Copyrighted material

Hidden page

– examen de choix en cas d'instabilité hémodynamique si elle est réalisée en salle de déchoquage ;

– opérateur-dépendante ;

– recherche un épanchement intrapéritonéal ;

– recherche une lésion des organes pleins ;

– peu performante en cas de lésion des organes creux.

0 ■ **Scanner abdominopelvien avec injection de produit de contraste** :

– réalisé chez un patient stable hémodynamiquement, dans le cadre d'un scanner corps entier ;

– recherche un épanchement intrapéritonéal et un pneumopéritoine ;

– recherche des lésions des organes pleins et creux ;

– recherche des lésions vasculaires.

3. Ponction-lavage péritonéale :

■ Ses indications sont limitées et sa pratique reste exceptionnelle en France.

■ Elle consiste à instiller 500 mL de sérum physiologique dans la cavité péritonéale, puis à recueillir le liquide. L'examen du liquide recueilli met en évidence la présence ou non d'un hémopéritoine.

*Concours Internat 2002

IV. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE*

L'examen clinique et la réponse aux mesures initiales de réanimation permettent de différencier les patients présentant :

■ **un choc hémorragique non stabilisé :** le patient doit bénéficier d'une hémostase chirurgicale immédiate. Le bilan lésionnel n'a pas le temps d'être réalisé, à l'exception possible d'une échographie abdominale pour mettre en évidence un épanchement péritonéal et orienter le geste chirurgical ;

■ **un état hémodynamique stable ou stabilisé :** le bilan lésionnel est réalisé (échographie abdominale, scanner abdominopelvien, éventuellement artériographie).

0 ### A. Réanimation du choc hémorragique ITEM 200

■ Hospitalisation en réanimation.

■ Surveillance cardioscopique.

■ Le but est de rétablir un apport en O_2 adapté au besoin de l'organisme : oxy-

0 génothérapie en ventilation spontanée ou mécanique après intubation orotrachéale en cas d'insuffisance respiratoire aiguë associée et/ou de troubles de la conscience (score de Glasgow ≤ 8).

0 ■ Hémostase par compression, garrot, embolisation ou chirurgicale.

■ Compensation des pertes :

0 – 2 voies veineuses périphériques de bon calibre ;

Copyrighted material

– position de Trendelenburg ;

– expansion volémique par cristalloïdes ou colloïdes ; [0]

– transfusion de concentrés globulaires iso-groupe iso-Rhésus, PFC, plaquettes, fibrinogène ; [0]

– l'utilisation de catécholamines ne doit en rien remplacer l'expansion volémique et permet d'éviter la survenue d'un collapsus et d'un arrêt cardiaque par désamorçage.

- Autres mesures :

– lutte contre l'hypothermie ;

– corrections des troubles hydroélectrolytiques : hyperkaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie.

B. Antibiothérapie

- Nécessaire en cas de péritonite associée, ou de contusion abdominale grave.
- Efficace sur les bacilles Gram négatif et les anaérobies.
- Elle comprend une pénicilline (amoxicilline + acide clavulanique) et un aminoside (gentamycine).

C. Prise en charge chirurgicale

- **Laparotomie exploratrice** à visée diagnostique et thérapeutique : [0]

– bilan lésionnel *in situ* organe par organe ;

– hémostase chirurgicale : splénectomie d'hémostase, *packing* hépatique ;

– sutures, résections, anastomoses, stomies des organes creux en fonction des lésions observées ;

– drainages.

- **Traitement conservateur :** il n'est envisageable qu'en cas de stabilité hémodynamique, sous couvert d'une surveillance stricte en réanimation.
- **Artério-embolisation :**

– à visée diagnostique : localisation du saignement ;

– à visée thérapeutique : embolisation sélective des artères responsables de l'hémorragie. Elle est principalement utilisée dans la prise en charge des hématomes rétropéritonéaux, en cas de traumatismes du bassin et des reins ;

– elle ne doit en aucun cas retarder une prise en charge chirurgicale.

V. TRAUMATISMES ABDOMINAUX : EXEMPLES

A. Traumatismes spléniques

La rate est l'organe le plus fréquemment atteint dans les contusions abdominales (50 %).

1. Lésions spléniques (classification de Butain)

- Stade 1 : lésions capsulaires ou hématome sous-capsulaire sans atteinte du parenchyme.

Copyrighted material

Hidden page

- Stade II : hématome sous-capsulaire < 50 % de la surface, rupture parenchymateuse < 3 cm de profondeur.
- Stade III : hématome sous-capsulaire > 50 % de la surface ou rupture d'un hématome sous-capsulaire, rupture parenchymateuse > 3 cm de profondeur. (*fig. 201-4*)
- Stade IV : destruction parenchymateuse avec destruction de 25 à 75 % d'un lobe.
- Stade V : destruction > 75 % d'un lobe avec atteinte des veines sus-hépatiques ou de la veine cave inférieure.
- Stade VI : avulsion hépatique.




Fig. 201-4. a. Traumatisme fermé du foie. Scanner abdominal injecté. Contusions hépatiques. b. Même patient. Scanner injecté. Fuite de produit de contraste. Saignement actif. Hématome sous-capsulaire en voie de constitution.
Source : *Imagerie du foie, des voies biliaires et du pancréas*, O. Ernst, Masson, 2005, 240 p.

- **Traitement conservateur** :
 - en cas de stabilité hémodynamique ;
 - surveillance clinique et paraclinique (échographie et scanner) en réanimation ;
 - prise en charge chirurgicale dans un second temps si nécessaire.
- **Traitement chirurgical d'emblée** :
 - en cas d'instabilité hémodynamique ;
 - contrôle de l'hémostase par un *packing* périhépatique, une hémostase intra-hépatique avec clampage du pédicule, ou une résection hépatique partielle.

2. Complications

- Choc hémorragique.
- Hémobilie (fistule artériobiliaire).
- Abcès hépatique.
- Fistule biliaire.

C. Traumatismes pénétrants

Les organes les plus touchés sont le grêle et le côlon.

Copyrighted material

1. Prise en charge chirurgicale

a) Exploration de la plaie

- En cas de plaie non pénétrante (péritoine intact) : parage, suture et surveillance en milieu chirurgical ;
- En cas de plaie pénétrante (péritoine ouvert) :
 - laparotomie exploratrice avec toilette péritonéale, résection-suture des plaies digestives, parage-suture de l'orifice d'entrée ;
 - en cas de plaie digestive :
 - plaie minime : suture digestive simple ;
 - plaie digestive délabrante : résection intestinale et anastomose ;
 - plaie avec contamination majeure : résection sans anastomose et confection de stomies.

b) Mesures associées

- Antibioprophylaxie efficace sur les bacilles Gram négatif et les anaérobies. Elle comprend une pénicilline (amoxicilline + acide clavulanique) et un aminoside (gentamycine).
- SAT-VAT.

VI. PRINCIPALES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ABDOMINAUX*

*Concours Internat 2002

- **Immédiates** : choc hémorragique, décès ITEM 200.
- **Précoces** :
 - infectieuses : péritonite secondaire par perforation d'organe creux ou par translocation, abcès de paroi, fistules digestives ITEM 275 ;
 - rupture de rate en 2 temps d'un hématome sous-capsulaire pouvant être à l'origine d'un choc hémorragique dans les jours suivant le traumatisme. Elle nécessite une surveillance rapprochée du patient en cas de traitement conservateur ;
 - ischémie-nécrose digestive ;
 - hémobilie, fistule biliaire ;
 - pancréatite ITEM 268.
- **Tardives** :
 - abcès sous-phréniques :
 - collection purulente sous-diaphragmatique survenant à distance d'une chirurgie abdominale ou d'un traumatisme abdominal ;
 - elle associe un syndrome infectieux, avec un abdomen chirurgical aigu plus ou moins des signes pleuropulmonaires (dyspnée et épanchement pleural). Le diagnostic est porté par l'échographie ou le scanner abdominal injecté ;

Copyrighted material

• le traitement repose sur le drainage percutané ou chirurgical associé à l'antibiothérapie active sur les bacilles Gram négatif (céphalosporines et aminosides) ;

• l'abcès sous-phrénique peut se compliquer d'une péritonite, d'une pleurésie purulente, d'un syndrome occlusif ou d'un choc septique ;

– faux kyste du pancréas en cas de traumatismes pancréatiques ITEM 268.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé crânien

OBJECTIF

• Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 5 Indications et stratégies d'utilisation des principaux examens d'imagerie.

ITEM 192 Déficit neurologique récent.

CONSENSUS

• Prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce : http://www.srlf.org/s/article046a.html?id_article=273.

POUR COMPRENDRE...

Traumatisé crânien non grave adulte

- GCS ≥ 9 et évolution favorable du GCS.
- Pas de contexte évocateur de polytraumatisme.
- Motif fréquent de consultation au SAU.
- Deux questions se posent :
 - hospitalisation ou retour à domicile ;
 - prescription d'un scanner cérébral en urgence ou pas.

Traumatisé crânien grave

- Un traumatisme crânien grave (TCG) se définit par un traumatisme crânien avec un score de Glasgow ≤ 8.
- Tout TCG est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire (50 % des cas).
- Tout TCG est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire.

Copyrighted material

- Le traumatisme crânien détermine le pronostic du polytraumatisé en réanimation une fois les défaillances respiratoires et hémodynamiques maîtrisées.
- L'organisation de la prise en charge des TCG doit être parallèle à celle de tout polytraumatisé.

I. TRAUMATISÉ CRÂNIEN NON GRAVE ADULTE

A. Situation n° 1

1. Définition

Perte de connaissance initiale (PCI) avec examen neurologique strictement normal au SAU.

2. Conduite à tenir

- Hospitalisation en urgence en service de chirurgie.
- Analgésie.
- Laisser à jeun.
- Surveillance neurologique : GCS, pupilles, motricité-sensibilité des 4 membres toutes les 4 h pendant 24 h.
- Scanner cérébral au moindre symptôme nouveau :
 - paresthésies ;
 - vomissements ;
 - diplopie ;
 - déficit moteur ;
 - baisse du GCS ;
 - anomalie pupillaire.

B. Situation n° 2

1. Définition

Situation identique à la précédente, mais le patient présente une blessure périphérique nécessitant une intervention sous anesthésie générale.

2. Conduite à tenir

Scanner cérébral en urgence car surveillance neurologique clinique impossible sous AG.

C. Situation n° 3

1. Définition

Examen neurologique perturbé.

2. Conduite à tenir

- Hospitalisation.
- Scanner cérébral en urgence.

Copyrighted material

D. Situation n° 4

1. Définition

Pas de perte de connaissance initiale. Examen neurologique strictement normal.

2. Conduite à tenir

- Surveillance d'une durée de 2 h au SAU.
- La sortie est autorisée si les éléments suivants sont réunis :
 - présence d'une tierce personne auprès du patient pendant 24 h ;
 - domicile à proximité d'un service d'urgences ;
 - conduite automobile et de machines interdite pendant 24 h ;
 - ne prendre aucune décision importante pendant 24 h (crédit…) ;
 - bonne observance prévisible des consignes.
- Consigne de consulter en urgence si :
 - somnolence ;
 - discours incohérent ;
 - troubles de la parole ;
 - mouvements anormaux ;
 - majoration des céphalées ;
 - troubles de la vision ;
 - faiblesse d'un membre ;
 - vomissements ;
 - devant tout symptôme nouveau, en particulier apparition de signes de localisation.
- On remet une feuille récapitulant ces informations, signée par le patient, dont le double est conservé dans le dossier médical.

II. TRAUMATISÉ CRÂNIEN GRAVE

A. Physiopathologie

1. Lésions initiales

Elles peuvent se présenter sous différentes formes :

- des contusions hémorragiques ;
- des hémorragies sous-durales ;
- des hémorragies extra-durales ;
- des hémorragies sous-arachnoïdiennes ;
- des lésions axonales diffuses ;
- des embarrures fermées ou ouvertes.

Elles peuvent être isolées ou associées entre elles.

Copyrighted material

2. Lésions secondaires

■ Elles ont comme aboutissement l'ischémie cérébrale et sont favorisées par les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) *(fig. 201-5)*.




Fig. 201-5. Cascade délétère de Rosner (1999).

■ La pression de perfusion cérébrale (PPC) =
pression artérielle moyenne (PAM) – pression intracrânienne (PIC).

■ Les ACSOS aggravent la cascade en augmentant la PIC ou en diminuant la PAM :

– **hypotension artérielle : PAS < 90 mmHg** ;

– **hypoxémie : PaO_2 < 60 mmHg** ;

– hypercapnie et hypocapnie ;

– hyperthermie ;

– hypoglycémie et hyperglycémie ;

– hyponatrémie.

B. Prise en charge

Tout TCG doit être considéré comme à haut risque de lésion rachidienne instable et devra donc bénéficier d'une immobilisation de l'axe craniorachidien lors de toutes les procédures diagnostiques et thérapeutiques.

La mise en condition standard de tout polytraumatisé sera appliquée dans cette situation (voir la prise en charge du polytraumatisé, p. 247).

1. En préhospitalier

a) Prise en charge neurologique

■ Score de Glasgow (GCS) *(tableau 201-4)* : le score s'obtient par la somme des meilleures réponses obtenues. Ainsi, l'état de vigilance et de conscience normal est coté Glasgow 15 alors que le coma le plus profond est coté Glasgow 3. Les stimulations nociceptives validées sont : la pression sus-orbitaire et la pression du lit unguéal. Les frottements/pincements cutanés sont à éviter.

Copyrighted material

Tableau 201-4. Score de Glasgow (CGS).

Note	Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
6			Réponse aux ordres
5		Cohérente, orientée	Adaptée, localise la douleur
4	Spontanée	Confuse	Évitement inadapté
3	À la demande	Inappropriée	Flexion-décortication
2	À la stimulation nociceptive	Inintelligible	Extension-décérébration
1	Absente	Absente	Absente

- Examen des pupilles, bilatéral et comparatif :
 - état de base :
 - diamètre : myosis, intermédiaire, mydriase ;
 - symétrie ;
 - réflexe photomoteur.
- Recherche d'un déficit moteur aux 4 membres.
- Recherche des réflexes ostéotendineux.
- Réflexe cutané plantaire.
- Tonus anal au toucher rectal.
- Thérapeutique :
 - en cas de mydriase aréactive, osmothérapie en urgence par mannitol 20 % : 250 mL IVL renouvelable 1 fois ; 0
 - contrôle des VAS par intubation orotrachéale après induction en séquence rapide puis ventilation mécanique sous anesthésie générale ;
 - pas de sonde nasogastrique (risque de brèche de la dure-mère) mais sonde orogastrique possible ; 0
 - maintien de la rectitude craniorachidienne pendant toute la procédure. 0

b) Prise en charge hémodynamique

- Traitement d'un état de choc.
- Maintien d'une PAM ≥ 85 mmHg pour préserver la PPC : 0
 - remplissage vasculaire par du sérum physiologique ;
 - perfusion de vasopresseurs : noradrénaline IVSE.

c) Prise en charge respiratoire

- Ventilation mécanique avec monitorage du CO_2 expiré.
- Réglage des paramètres du respirateur pour maintenir une normocapnie et une SpO_2 normale.

2. Dans la structure d'accueil

- **Un dogme :** ne jamais oublier qu'un TCG est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. Il doit bénéficier de la même stratégie diagnostique et thérapeutique que tout polytraumatisé.

Copyrighted material

■ L'hémostase d'une lésion hémorragique menaçant le pronostic vital est prioritaire sur toute intervention neurochirurgicale.

■ **Une obsession :** ne pas méconnaître une lésion rachidienne instable.

■ **Un examen clé :** le scanner cérébral sans injection de produit de contraste en urgence, qui recherche :

– une fracture du crâne en fenêtre osseuse ;

– une hyperdensité spontanée en fenêtre parenchymateuse, en faveur d'un saignement.

■ Réalisation d'un doppler transcrânien évaluant la perfusion cérébrale.

a) Neuroréanimation

■ Lutte contre l'hypertension intracrânienne (HTIC) :

– sédation suffisante par des benzodiazépines (midazolam) et des morphiniques (sufentanil) ;

– positionnement demi-assis en l'absence de lésion rachidienne instable ;

– tête dans l'axe pour libérer le retour veineux jugulaire ;

– **les corticoïdes n'ont aucune indication en traumatologie crânienne**.

■ Prévention et traitement des ACSOS :

– glycémie : insulinothérapie pour contrôle glycémique strict ;

– traitement d'une fièvre :

• paracétamol IV : 1 g × 4/j ;

• refroidissement externe ;

• traitement étiologique ;

– traitement d'une hypoxémie, d'une hypercapnie :

• réglage du respirateur ;

• traitement d'une pneumonie d'inhalation par amoxicilline-clavulanate ;

– maintien d'une PAM > 85 mmHg ;

– soluté vecteur : NaCl à 0,9 % ; **contre-indication aux solutés hypotoniques** ;

– maintien d'une Hb > 9 g/dL par transfusion de concentrés érythrocytaires et plaquettes > 100 000 m^3 par transfusion de concentrés plaquettaires.

■ Correction des troubles de l'hémostase : **contre-indication des anticoagulants préventifs pendant 5 jours**.

■ Prévention des convulsions précoces par acide valproïque *(Dépakine)* pendant 7 jours.

■ Surveillance neurologique clinique régulière (GCS, pupilles, motricité des 4 membres), surveillance de la pression intracrânienne si nécessaire et réalisation d'un Doppler transcrânien deux fois par jour en phase aiguë.

■ Scanner cérébral de contrôle.

■ Prévention des complications de décubitus : escarres (matelas à flux, massage des points d'appui) et complications thromboemboliques (bas de conten-

Copyrighted material

tion, puis le risque de resaignement passé, anticoagulation préventive par HBPM).

b) Indications neurochirurgicales en urgence

Elles représentent moins de 5 % des hospitalisations pour TCG :

- hématome extra-dural ;
- hématome sous-dural aigu avec déviation de la ligne médiane > 5 mm ;
- embarrure ouverte.

- **Hématome extra-dural** (HED) :
 - la sémiologie est typique :
 - perte de connaissance initiale inconstante ;
 - retour à une vigilance normale ;
 - puis, après un intervalle libre, survenue d'un coma ;
 - le saignement est le plus souvent lié à la lésion d'une artère méningée ;
 - imagerie (*fig. 201.6*) :



Fig. 201-6. Scanner cérébral sans injection – hématome extra-dural hémisphérique gauche. Lentille biconvexe hyperdense. Engagement sous-factoriel. Hématome des parties molles en regard.

- lentille biconvexe hyperdense ;
- effet de masse : déviation des structures médianes, disparition des sillons corticaux, effacement des ventricules latéraux, comblement des citernes de la base ;
- en regard de l'HED, il faut rechercher : une fracture du crâne associée, un hématome des parties molles, voire un engagement (sous-falcoriel, central, temporal) ;
- un HED peut masquer un HSD plus discret, diamétralement opposé, survenant par un mécanisme de contrecoup ;

Copyrighted material

– traitement chirurgical : il s'agit d'une urgence neurochirurgicale :
 • incision puis évacuation de l'hématome ;
 • examen de la dure-mère en peropératoire ;
– le pronostic dépend essentiellement de la rapidité de la prise en charge.

■ **Hématome sous-dural aigu** (HSD) :
– imagerie (*fig. 201-7*) :
 • lentille biconcave hyperdense intracrânienne, extraparenchymateuse ;
 • fréquemment associée à des pétéchies hémorragiques intraparenchymateuses ;
– indication neurochirurgicale en cas de déviation des structures médianes ≥ 5 mm ;
– le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge et des contusions sous-jacentes.




Fig. 201-7. Scanner cérébral – hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche. Lentille biconcave. Déviation des structures médianes.

c) Soins paramédicaux

■ Surveillance hémodynamique.
■ Surveillance régulière et écrite, au mieux sur un document spécifique :
– score de Glasgow ;
– examen bilatéral et comparatif des pupilles et du réflexe photomoteur, horaire ;
– motricité des 4 membres ;
– monitorage de la pression intracrânienne continu en cas d'hypertension intracrânienne.
■ Nursing.
■ Prévention d'escarres.

Copyrighted material

- Kinésithérapie motrice passive puis active.
- Bas antithrombose.

C. Complications

1. Précoces

- Engagement cérébral.
- Mort encéphalique.
- Arrêt cardiorespiratoire.

2. Tardives

- Complications de réanimation :
 - infection nosocomiale ;
 - maladie thromboembolique ;
 - gastrite aiguë de stress ;
 - neuromyopathie de réanimation.
- Méningite bactérienne sur brèche dure-mérienne :
 - souvent retardée de plusieurs mois après le traumatisme ;
 - ne justifie pas d'antibioprophylaxie au long cours ni de vaccination antipneumococcique.
- Complications fonctionnelles :
 - déficit moteur ;
 - déficit intellectuel ;
 - déficit praxique ;
 - état paucirelationnel ;
 - état végétatif.
- Épilepsie séquellaire.
- Syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
- Troubles neuropsychiques, voire psychiatriques.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé des membres

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 103 Prévention du tétanos.

Copyrighted material

ITEM 192 Déficit neurologique récent.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 208 Ischémie aiguë des membres.

ITEM 219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydroélectrolytiques.

ITEM 238 Fracture de l'extrémité inférieure du radius chez l'adulte.

ITEM 239 Fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte.

ITEM 252 Insuffisance rénale aiguë – Anurie.

ITEM 283 Surveillance d'un malade sous plâtre.

ITEM 301 Déficit moteur et/ou sensitif des membres.

Sujets tombés

Sujets tombés aux concours de l'Internat

• 1998 : Écrasement de membre – « Crush » syndrome. Patient présentant un volumineux membre inférieur tendu et douloureux dans les suites d'un AVP avec hyperkaliémie et insuffisance rénale aiguë.

1) Diagnostic suspecté.
2) Physiopathologie.
3) Signes biologiques associés.
4) Signes ECG d'hyperkaliémie.
5) Traitement symptomatique en urgence.

CONSENSUS

• Il n'existe à ce jour aucune conférence de consensus sur ce thème.

POUR COMPRENDRE…

■ Le diagnostic et la prise en charge d'un traumatisé des membres sont relativement aisés lorsque ce traumatisme est isolé.

■ À l'inverse, lorsqu'il s'intègre dans le cadre d'un polytraumatisme, le diagnostic et la prise en charge d'un traumatisme de membre sont souvent négligés, et cette méconnaissance peut être à l'origine de séquelles fonctionnelles graves.

■ Un bilan des traumatismes de membres doit donc systématiquement être réalisé dans les 24 h suivant l'arrivée du polytraumatisé.

I. GÉNÉRALITÉS SUR LES FRACTURES TRAUMATIQUES DES MEMBRES

A. Épidémiologie

Elles touchent le plus souvent l'homme jeune, dans un contexte d'AVP, de chute ou d'accident de sport.

B. Physiopathologie

■ Deux mécanismes peuvent être distingués :

– traumatisme direct : la lésion se situe au niveau du point d'impact ;

Copyrighted material

– traumatisme indirect : par torsion ou flexion. La lésion siège à distance du point d'impact.

- Les fractures peuvent être classées selon ITEMS 238, 239 :
 - le trait de fracture : simple ou complexe ;
 - l'état cutané : ouvertes ou fermées ;
 - la localisation : le plus souvent diaphysaire ;
 - le déplacement : fractures non déplacées et déplacées.

C. Diagnostic

Évident lorsque la fracture est isolée, il est plus difficile en cas de polytraumatisme ITEMS 238, 239.

1. Terrain et anamnèse

- Âge, antécédents, traitements.
- Mécanisme lésionnel : point d'impact, traumatisme direct ou indirect, heure du traumatisme.
- Prise en charge pré-hospitalière.

2. Examen clinique

- Douleur spontanée ou exquise à la palpation.
- Impotence fonctionnelle totale du membre atteint.
- Déformation.
- Mobilité anormale.
- Hématome.

3. Recherche de complications

- Polytraumatisme (voir le bilan lésionnel du polytraumatisé, p. 247).
- Locorégionales :
 - fractures ouvertes ;
 - perte de substance ;
 - syndrome de loges ;
 - déficit sensitivomoteur par atteinte neurologique (compression, section nerveuse…) : examen neurologique ;
 - lésions vasculaires associées (compression, section artérielle) : palpation des pouls périphériques.

D. Bilan paraclinique

La radiographie du membre concerné de face et de profil *(fig. 201-8 et 201-9)* permet l'étude : [0]

- du trait de fracture : simple (transversal, oblique ou spiroïde) ou complexe (bifocal, comminutive) ;
- du déplacement : angulation, translation, rotation.

Copyrighted material

Hidden page

2. Traitement chirurgical

- Réduction et ostéosynthèse sous anesthésie du foyer de fracture.
- La technique d'ostéosynthèse dépendra du type de fracture et de la présence de complications associées *(fig. 201-10 à 201-12)* :
 - broches, vis, plaque ;
 - enclouage centromédullaire ;
 - fixateur externe.



Fig. 201-10. Radiographies de face et de profil montrant un enclouage centromédullaire verrouillé d'une fracture de jambe.
Source : « Traumatisme du genou et de la jambe », S. Zilber, J. Allain, Elsevier, EMC Urgences, volet 24-100-C-90.



Fig. 201-11. Radiographie de face et de profil montrant le traitement d'une fracture ouverte diaphysaire transverse des 2 os de la jambe par fixateur externe.
Source : « Traumatisme du genou et de la jambe », S. Zilber, J. Allain, Elsevier, EMC Urgences, volet 24-100-C-90.

Copyrighted material



Fig. 201-12. Radiographie montrant une fracture diaphysaire des 2 os de l'avant-bras. Ostéosynthèse par plaque vissée.
Source : « Traumatisme de l'avant-bras et du poignet », J. Allain, S. Pannier, D. Goutallier, Elsevier, EMC Urgences, volet 24-100-C-40, 2000.

3. Mesures associées

0 ■ Antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, morphiniques, paracétamol.

0 ■ Rééducation, kinésithérapie : mobilisation des doigts ou des orteils sous plâtre, puis à distance récupération active de la force musculaire et des amplitudes articulaires.

0 ■ Prophylaxie thromboembolique en cas de fracture du membre inférieur ou de polytraumatisme.

0 ■ Béquillage en cas de fracture du membre inférieur.

4. Surveillance

0 ■ Surveillance d'un malade sous plâtre ➤ ITEM 283.

■ Radiologique à J0, J2, J7, J15, J30, J45 : recherche d'un déplacement secondaire.

■ Complications des traumatismes des membres.

II. COMPLICATIONS LOCALES

A. Fractures ouvertes

■ Le diagnostic est clinique : abrasion, contusion, effraction cutanée, décollement, délabrement.

■ On distingue 2 mécanismes lésionnels :

– indirect : ouverture cutanée de dedans en dehors, à risque septique faible ;

– direct : ouverture cutanée de dehors en dedans, souvent associée à des lésions plus délabrantes et à risque septique élevé.

Copyrighted material

1. Classification de Cauchoix-Duparc

- Cauchoix I : plaie simple sans décollement ni contusion, suture possible sans tension.
- Cauchoix II : plaie large avec contusion ou décollement sous-cutané, suture possible. Haut risque de nécrose secondaire.
- Cauchoix III : perte de substance, suture impossible *(fig. 201-13)*.




Fig. 201-13. Fracture ouverte de jambe stade III de la classification de Cauchoix avec brûlure et nécrose cutanéomusculaire après fixation externe.
Source : « Traumatisme du genou et de la jambe », S. Zilber, J. Allain, Elsevier, EMC Urgences, volet 24-100-C-90.

2. Traitement

Il doit avoir lieu dans les 6 heures suivant la fracture ouverte : urgence thérapeutique.

- Traitement local :
 - détersion, lavage ;
 - parage et suture sans tension ;
 - lambeau et greffe de peau à distance dans les fractures Cauchoix III.
- Réduction du foyer de fracture :
 - Cauchoix I : traitement identique à une fracture fermée ;
 - Cauchoix II : l'ostéosynthèse dépendra du type de fracture et du délai de prise en charge ;
 - Cauchoix III : fixateur externe.
- Mesures générales :
 - antibiothérapie parentérale, bactéricide : amoxicilline + acide clavulanique, 2 g en IVD puis 1 g x 3/jour avec relais *per os*, pendant 48 h ;
 - SAT, VAT ;
 - antalgiques ;
 - pansements antiseptiques ;
 - surveillance.

B. Syndrome des loges

Il s'agit d'un syndrome ischémique lié à une hyperpression au sein des loges aponévrotiques ITEM 283.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

Hidden page

Hidden page

– aponévrotomie de décharge ;

– ostéosynthèse par fixateur externe.

■ **Surveillance** :

– aspect cutané local ;

– scope ;

– diurèse ;

– ionogramme sanguin, gaz du sang artériels, lactates artériels, hémostase et enzymes musculaires.

C. Embolie graisseuse

Elle est observée dans les suites d'un polytraumatisme ou d'une fracture des os longs, le plus souvent fracture de la diaphyse fémorale. Elle touche l'adulte jeune.

1. Physiopathologie

On retrouve des microemboles de graisse au sein de la microcirculation, principalement pulmonaires et neurologiques, ayant 2 conséquences :

■ obstruction de la circulation d'aval, responsable de signes d'ischémie ;

■ libération d'acides gras libres (toxiques), à l'origine d'une agrégation plaquettaire et d'une activation de la cascade inflammatoire. Il en résulte un OAP lésionnel et une CIVD.

2. Diagnostic positif

■ Elle survient classiquement dans les 24-48 h après le traumatisme.

■ Elle associe :

– début brutal ;

– fièvre constante à 39 °C ;

– atteinte respiratoire : SDRA ;

– atteinte neurologique : troubles de la conscience et signes neurovégétatifs (hyperthermie, tachycardie) ;

– atteintes cutanéomuqueuses : purpura et pétéchies cervicothoraciques ;

– atteintes oculaires avec au fond d'œil : hémorragies rétiniennes, emboles graisseux.

3. Paraclinique

■ Radiographie thoracique : syndrome alvéolo-interstitiel.

■ NFS, hémostase : CIVD, anémie hémolytique.

■ Lavage bronchoalvéolaire, à la recherche d'emboles graisseux, cependant non spécifique.

■ Scanner cérébral : élimine un diagnostic différentiel (hématome extradural).

4. Traitement

■ Il est avant tout préventif : immobilisation précoce du foyer de fracture.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

- Utilisation du pantalon anti-choc :
 - indication : choc hémorragique sévère avec forte suspicion de traumatisme du bassin ;
 - contre-indication formelle en cas de traumatisme thoracique grave ; [0]
 - après sédation et analgésie efficaces.
- Le patient doit être orienté vers un centre spécialisé dans l'accueil des traumatisés graves et disposant d'un plateau technique de radiologie interventionnelle 24/24 h.

III. PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE

A. Examen physique

- Inspection :
 - contusion ou hématome de la paroi pelvienne ;
 - état cutané ;
 - déformation, asymétrie du bassin ;
 - examen des organes génitaux externes : hématome, contusion.
- Palpation :
 - douce et prudente ;
 - recherche une instabilité latérale ou antéropostérieure ;
 - recherche un globe vésical.
- Touchers pelviens : [0]
 - hémorragie : plaie vaginale ou rectale ;
 - palpation d'une esquille osseuse ;
 - atonie du sphincter anal, anesthésie périnéale : en faveur d'une lésion des racines de la queue de cheval par un traumatisme du sacrum.
- Percussion :
 - matité sus-pubienne ;
 - l'association d'un globe vésical avec une hématurie évoque fortement une lésion urétrale qui contre-indique le sondage vésical avant avis spécialisé d'un urologue. Dans l'attente, un cathéter sus-pubien sera mis en place. [0]

B. Examens complémentaires

1. Biologie

Bilan usuel de tout traumatisé grave. On recherche en particulier une anémie et une coagulopathie (CIVD et/ou fibrinolyse).

2. Imagerie

- Radiographie du bassin de face au lit du malade (analyse bilatérale et comparative) (*fig. 201-15*):
 - interlignes sacro-iliaques ;
 - trous de conjugaison sacrés ;

Copyrighted material

Hidden page

■ Si un pantalon anti-choc a été mis en place en préhospitalier, il ne sera dégonflé qu'une fois le patient installé en salle de radiologie interventionnelle ou en salle d'opération pour fixation externe.

1. Artérioembolisation en urgence si l'hémorragie est non contrôlée

■ Diagnostic :

– saignement actif : fuite de produit de contraste ;

– topographique ;

– vasospasme : vaisseau ayant saigné.

■ Thérapeutique :

– embolisation sélective du ou des vaisseau(x) incriminé(s) ;

– embolisation préventive de vaisseaux spasmés ;

– désilet d'artériographie laissé en place 24 h dans l'éventualité d'une réintervention pour récidive hémorragique.

2. Fixateur externe en urgence

■ Permet de diminuer le débit hémorragique.

■ Solution d'attente, mise en œuvre au lit du malade.

■ Ne peut se substituer à l'artérioembolisation.

3. Chirurgie ?

Il n'y a pas d'indication à l'abord chirurgical du rétropéritoine dans les traumatismes du bassin. En effet, l'augmentation de la pression dans cette cavité participe à l'hémostase. La levée de cette pression expose au risque de saignement cataclysmique inaccessible à l'hémostase chirurgicale.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé thoracique

OBJECTIF

- Identifier les situations d'urgence.

LIENS TRANSVERSAUX

ITEM 193 Détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures.

ITEM 198 Dyspnée aiguë et chronique.

ITEM 276 Pneumothorax.

ITEM 312 Épanchement pleural.

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

– le rachis dorsal ;

– le gril costal ;

– les plèvres ;

– le parenchyme pulmonaire et la trachée ;

– le médiastin supérieur, moyen et inférieur.

■ Échographie pleurale, à la recherche d'un pneumothorax et/ou d'un hémothorax.

■ Échographie péricardique, à la recherche d'un hémopéricarde.

2. Scanner thoracique avec injection de produit de contraste

Comme pour le polytraumatisé, le scanner du traumatisé thoracique sera effectué sur un patient stabilisé et ne retardera pas la prise en charge d'une blessure thoracique mettant en jeu le pronostic vital.

■ Indications :

– traumatisme thoracique dans le cadre d'un polytraumatisme ;

– choc à forte cinétique ;

– traumatisme pénétrant ;

– anomalie radiographique et/ou échographique.

■ Structures analysées :

– cadre osseux :

• côtes ;

• rachis dorsal ;

• sternum ;

• clavicules/scapula ;

– plèvres ;

– péricarde ;

– médiastin ;

– gros vaisseaux intrathoraciques : aorte thoracique avec injection ;

– parenchyme pulmonaire.

B. Biologie

Il s'agit de l'ensemble des examens du traumatisé grave.

IV. PRISE EN CHARGE DES LÉSIONS PRINCIPALES

Les mesures générales sont celles de la prise en charge de tout polytraumatisé :

■ mise en condition : voir « Prise en charge du polytraumatisé », p. 247 ;

■ oxygénothérapie à fort débit au masque à réserve.

Copyrighted material

A. Volet costal

1. Physiopathologie

- Trait de fracture passant par plusieurs côtes voisines.
- Désolidarisation d'un segment de paroi thoracique.
- Ventilation paradoxale et douleur intense : atélectasies, hypoventilation alvéolaire = détresse respiratoire aiguë.

2. Examen clinique

- Dyspnée, détresse respiratoire avec tirage inspiratoire.
- Dépression inspiratoire du volet.
- Douleur intense.

3. Imagerie thoracique

- Trait de fracture sur le cliché de radiographie pulmonaire.
- Volet sur le scanner thoracique.

4. Traitement

- Assistance ventilatoire, non invasive voire invasive après intubation trachéale.
- Analgésie efficace.
- Traitement systémique : association d'antalgiques des paliers I, II et III de l'OMS.
- Traitement locorégional : analgésie péridurale thoracique après contrôle de l'hémostase.
- Stabilisation chirurgicale : indications spécialisées.

B. Pneumothorax

1. Physiopathologie

Lacération pulmonaire, par :

- fractures costales ;
- projectile ou arme blanche ;
- rupture de la corticalité pulmonaire par décélération ;
- surpression trachéobronchique à glotte fermée ;
- choc direct (mécanisme contendant) ;
- onde de pression (blast).

2. Diagnostic

a) Clinique

- Diminution de l'ampliation thoracique.
- Emphysème sous-cutané (crépitements à la palpation).
- Diminution de la transmission des vibrations vocales.
- Diminution du murmure vésiculaire.

Copyrighted material

Hidden page

3. Traitement

Il consiste en un drainage pleural percutané :

- asepsie chirurgicale ;
- repères : ligne axillaire moyenne, 4e ou 5e espace intercostal ;
- anesthésie locale ;
- incision cutanée ;
- dissection des plans musculaires ;
- pleurotomie au doigt ;
- insertion du drain en direction apicale puis fixation ;
- aspiration à – 20 cmH_2O.

C. Hémothorax

1. Physiopathologie

- Fractures costales.
- Traumatisme des vaisseaux pleuraux.
- Traumatisme des vaisseaux bronchiques.
- Traumatisme des gros vaisseaux intrathoraciques.

2. Complications

- Surinfection : empyème pleural.
- Troubles de ventilation voire atélectasies.
- Insuffisance respiratoire aiguë.

3. Traitement

- Drainage pleural (voir *supra*) : le drain sera orienté en direction postérieure.
- Thoracotomie d'hémostase en urgence, indiquée en cas de :
 - saignement ≥ 1 500 mL à la pleurotomie ;
 - et/ou débit de sang ≥ 150 mL/h.
- Exceptionnellement, thoracotomie de sauvetage au lit du malade.

Diagnostic différentiel d'un hémothorax gauche = rupture diaphragmatique.

D. Rupture de l'isthme aortique

Les lésions aortiques traumatiques siègent sur l'isthme chez 90 % des blessés qui arrivent vivants à l'hôpital.

1. Rappel anatomique

Le bloc formé par le cœur, l'aorte ascendante et la crosse aortique en amont de l'artère sous-clavière gauche est mobile dans le médiastin alors que l'aorte thoracique descendante en aval de la sous-clavière gauche est fixée dans le médiastin postérieur.

Copyrighted material

Hidden page



Fig. 201-19. Scanner thoracique : rupture de l'isthme aortique, flap intra-luminal – hémomédiastin.

4. Traitement

Les indications thérapeutiques sont du domaine de la spécialité :

- traitement endovasculaire ;
- ou traitement chirurgical : prothèse aortique mise en place sous circulation extracorporelle.

E. Contusion myocardique

- Clinique : hypotension artérielle.
- ECG : troubles de la repolarisation, troubles du rythme.
- Biologie : mise en circulation de troponine.
- Traitement : surveillance électrocardioscopique et enzymatique.

F. Contusion pulmonaire

1. Physiopathologie

Transmission de l'onde de choc au parenchyme pulmonaire par la paroi thoracique :

- hémorragie intra-alvéolaire ;
- anomalies du surfactant ;
- inflammation péri-alvéolaire.

2. Clinique

Signes d'hypoxémie et de détresse respiratoire aiguë.

3. Imagerie pulmonaire

Le délai entre le traumatisme et l'apparition des signes radiologiques est de 4 à 6 heures :

- infiltrats ;
- bandes d'atélectasies ;
- parfois bronchogramme aérien ;
- pneumatocèles (clartés gazeuses) au scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse.

Copyrighted material

4. Complications

- Encombrement bronchique.
- Pneumopathies bactériennes.
- Abcédation.
- SDRA.

5. Traitement

- Endoscopie bronchique :
 - bilan des lésions ;
 - évacuation des caillots.
- Soins respiratoires :
 - kinésithérapie de drainage bronchique ;
 - oxygénothérapie ;
 - ventilation mécanique, non invasive voire invasive ;
 - analgésie.

G. Rupture diaphragmatique *(fig. 201-20 et 201-21)*

1. Physiopathologie

- Déchirure de coupole diaphragmatique, gauche > droite.
- Ascension des viscères abdominaux.

2. Clinique

- État de choc.
- Détresse respiratoire aiguë.
- BHA à l'auscultation thoracique.

3. Imagerie

- RP de face : sonde gastrique intrathoracique.
- Scanner thoracique : diagnostic de certitude.

4. Traitement

Il est chirurgical.



Fig. 201-20. Hémopneumothorax gauche compressif – emphysème sous-cutané- fractures de côtes.

Copyrighted material

Hidden page

Sujets tombés

Sujets tombés aux concours de l'Internat : 1996, 2000

- 1996 : Plaie de main compliquée.

1) Énoncer les différentes lésions nerveuses et tendineuses en fonction de l'examen clinique et leur prise en charge.
2) Énoncer l'ensemble des lésions associées.

- 2000 : Plaie de main compliquée.

Énoncer les différentes lésions nerveuses et tendineuses en fonction de l'examen clinique et leur prise en charge.

CONSENSUS

- Prise en charge des plaies aux urgences – Conférence de consensus – Société francophone de médecine d'urgence (SFMU), décembre 2005.

POUR COMPRENDRE...

- Motif de consultation fréquent aux urgences, la prise en charge d'une plaie des parties molles doit être rigoureuse. En effet, une plaie des parties molles peut masquer des lésions plus profondes pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou même vital.
- Une plaie siégeant sur le crâne, le thorax ou l'abdomen, notamment en cas de retentissement sur l'état de conscience, hémodynamique ou respiratoire, doit faire rechercher une atteinte des organes sous-jacents. Ces types de plaies font l'objet d'un paragraphe spécifique dans les sections des traumatismes abdominaux et thoraciques.
- La prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale d'une plaie des parties molles conditionne le pronostic esthétique et fonctionnel ultérieur.

I. PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE

A. Terrain

- Âge.
- Profession.
- Antécédents médicaux pouvant interférer avec la cicatrisation (diabète, alcool, corticothérapie).
- Statut vaccinal antitétanique.
- Main dominante (en cas de plaie siégeant sur les membres supérieurs).

B. Mécanisme lésionnel

- Type d'accident.
- Nature de l'objet contondant.
- Souillure tellurique.

Copyrighted material

- Plaie par morsure.
- Site du traumatisme : toute plaie siégeant sur un axe vasculonerveux ou en regard d'un organe vital comporte des risques spécifiques.

C. Examen clinique

- **Examen général** :
 - recherche d'une atteinte organique sous-jacente ;
 - état de conscience ;
 - fréquence cardiaque et pression artérielle ;
 - fréquence respiratoire et saturation en oxygène ;
 - température.
- **Examen régional** :
 - siège, profondeur apparente de la plaie ;
 - souillure ;
 - corps étranger ;
 - perte de substance ;
 - l'examen doit rechercher une atteinte des tissus nobles sous-jacents (nerfs, vaisseaux sanguins et tendons) : déficit sensitif et moteur, palpation des pouls, temps de recoloration cutanée, mobilité ; [0]
 - tout déficit neurologique doit être consigné dans le dossier médical et le patient prévenu des séquelles neurologiques potentielles. [0]
- **Exploration de la plaie :** voir *infra* « Prise en charge thérapeutique ».

D. Examens paracliniques

Ils ne sont pas systématiques :

- exploration radiologique :
 - recherche de fractures ;
 - recherche d'un corps étranger ;
 - en cas de plaies siégeant sur le thorax et sur l'abdomen : radiographie thoracique, échographie abdominale et scanner thoracoabdominopelvien injecté (voir les traumatismes abdominaux et thoraciques, p. 255 et 287) ;
- NFS, CRP, prélèvements bactériologiques.

II. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

L'examen clinique initial permet de classer les plaies des parties molles en 4 catégories :

- plaies simples ;
- plaies avec atteintes vasculonerveuses ou tendineuses sous-jacentes ;
- plaies avec pertes de substance ;

Copyrighted material

■ plaies faisant suspecter une lésion organique plus profonde et nécessitant la mise en place de mesures de réanimation et une prise en charge chirurgicale spécialisée (voir la prise en charge du polytraumatisé, p. 247).

CONSENSUS

Prise en charge des plaies aux urgences
SFMU, 2005

Les plaies suivantes doivent bénéficier d'une prise en charge chirurgicale :
■ plaies contuses ou souillées avec nécessité de parage étendue ;
■ pertes de substance ;
■ plaies avec suspicion d'atteintes d'éléments nobles sous-jacents ;
■ amputation.

0

A. Exploration de la plaie

■ Elle se fait sous anesthésie locale ou générale et dans des conditions d'asepsie rigoureuse :

– nettoyage et irrigation, ablation des corps étrangers ;

– ostéosynthèse d'un foyer de fracture associé ;

– recherche et suture microchirurgicale des lésions tendineuses, nerveuses et vasculaires ;

– sutures plan par plan du revêtement cutané.

■ Les plaies avec perte de substance nécessitent une prise en charge chirurgicale plus complexe et bénéficient le plus souvent d'une cicatrisation dirigée avec réalisation de lambeau et de greffes cutanées. Plusieurs interventions chirurgicales sont souvent nécessaires.

B. Principes de la cicatrisation dirigée

CONSENSUS

Prise en charge des plaies aux urgences
SFMU, 2005

■ Détersion : lors du parage et améliorée par des pansements gras.
■ Bourgeonnement : grâce à l'utilisation de pansements occlusifs absorbants type hydrocolloïdes.
■ Épithélialisation : pansements occlusifs ou semi-occlusifs.

Copyrighted material

C. Mesures générales

CONSENSUS

Prise en charge des plaies aux urgences
SFMU, 2005

- Antalgiques 0 : de niveau 1 à 3 selon l'EVA.
- Antibiothérapie/antibioprophylaxie par bêtalactamines en l'absence d'allergie pour les lésions avec risque infectieux élevé (souillures, morsures, signes généraux d'infection, fracture ouverte associée, plaies articulaires, vasculonerveuses ou tendineuses) : durée de 3-5 jours.
- SAT, VAT 0 ITEM 103.
- Prise en charge du risque rabique en cas de morsure 0 ITEM 213.
- Rééducation.

III. SPÉCIFICITÉS ET COMPLICATIONS

A. Choc hémorragique ITEM 200

- Il doit faire rechercher une lésion thoracique ou abdominale associée (voir les polytraumatismes, p. 247).
- Il est exceptionnel en cas de plaie siégeant sur les membres et doit faire rechercher une lésion artérielle ou osseuse (fémorale, humérale…).
- Le traitement repose sur la prise en charge du choc hémorragique, l'hémostase locale et la prise en charge spécifique de la lésion de membre avec si nécessaire suture vasculaire.

- Un cas particulier est celui de la plaie du cuir chevelu qui, à elle seule, peut être très hémorragique et nécessiter une suture rapide par fils ou agrafes.

B. Plaies thoraciques et abdominales

Elles menacent le pronostic vital à court terme. Ce sont des plaies par armes blanches ou armes à feu. Leur prise en charge est détaillée dans les sections des traumatismes thoraciques et abdominaux.

C. Plaies de la face

La peau, au niveau facial et cervical, recouvre de nombreux éléments nobles. Les complications peuvent être nombreuses et il convient d'orienter les patients vers un milieu chirurgical adapté :

- plaies avec atteintes des branches du nerf trijumeau ou du nerf facial ;
- atteintes des voies lacrymales, globes oculaires, paupières, canal de Sténon ;
- plaies de l'oreille ;
- plaies profondes des joues, de la langue et de la cavité buccale ;
- plaie du cuir chevelu avec embarrure.

Copyrighted material

CONSENSUS

Prise en charge des plaies aux urgences
SFMU, 2005

- L'examen clinique d'une plaie de la face doit être détaillé et consigné par écrit, avec schéma et photographies **0**.
- Le risque de séquelles esthétiques est important.

*Concours Internat 1996 et 2000

D. Plaies de la main*

- Incidence élevée : près de 500 000/an en France.
- Toute plaie d'allure banale doit bénéficier d'une exploration à la recherche de lésions vasculaires, nerveuses et tendineuses sous-jacentes.
- Il est nécessaire de connaître l'anatomie de la main et de l'ensemble du membre supérieur pour comprendre les spécificités de l'exploration clinique d'une plaie de la main.

1. Examen clinique

0 Réalisé avant toute anesthésie et consigné sur un schéma daté et signé, il sera complété par l'exploration chirurgicale.

- Bilan cutané :
 - siège et profondeur des lésions ;
 - pertes de substance ;
 - présence d'un corps étranger ;
 - souillure.
- Bilan vasculaire : chaleur, pouls capillaire, temps de recoloration.
- Bilan neurologique : évaluation de la sensibilité et de la motricité dans les territoires radial, médian et ulnaire.
- Bilan tendineux : les lésions des tendons extenseurs sont les plus fréquentes. Les aspects cliniques et les lésions correspondantes sont résumés dans le *tableau 201-5*.
- Bilan ostéoarticulaire :
 - recherche d'une fracture ;
 - recherche d'une plaie articulaire.

Copyrighted material

Tableau 201-5. Lésions tendineuses.

Lésions	Aspect
Appareil extenseur	
Tendon extenseur commun des doigts	Chute du doigt par flexion de la MCP
Bandelette médiane du tendon extenseur	Boutonnière : flexion de l'IPP et extension de l'IPD
Tendon terminal de l'extenseur	*Mallet finger* : déficit de l'extension de l'IPD avec flexion de l'IPD
Appareil fléchisseur	
Tendon fléchisseur commun superficiel	Flexion impossible de l'IPP après suppression de l'action du fléchisseur commun profond par blocage des autres doigts en extension
Tendon fléchisseur commun profond	Flexion impossible de l'IPD après blocage de l'IPP et MCP
Deux fléchisseurs	Déficit de l'extension de l'IPP et de l'IPD

IPP : interphalangienne proximale ; IPD : interphalangienne distale ; MCP : métacarpophalangienne.

2. Examen paraclinique

Radiographie de la main ou du doigt concerné de face et de profil en cas de suspicion de fracture ou de corps étrangers.

3. Traitement

- Traitement chirurgical :
 - débridement, lavage, parage et exploration sous anesthésie générale ou locale ;
 - traitement des lésions associées :
 - ostéosynthèse des foyers de fracture ;
 - sutures vasculaires ;
 - sutures tendineuses (cicatrisation en 6 semaines) ;
 - suture/greffe nerveuse ;
 - suture musculaire ;
 - fermeture plan par plan du revêtement cutané.
- Mesures générales :

 - antalgiques : de niveau 1 à 3 selon l'EVA. 0
 - antibiothérapie/antibioprophylaxie par bêtalactamine en l'absence d'allergie pour les lésions avec risque infectieux élevé, de durée de 3-5 jours ;
 - SAT, VAT ITEM 103 0
 - prise en charge du risque rabique en cas de morsure ITEM 213 ;
 - immobilisation en cas de fractures ou de lésions tendineuses ;
 - rééducation.

Copyrighted material

Hidden page

ITEM 56 Ostéoporose.

ITEM 65 Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique.

ITEM 66 Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses.

ITEM 92 Infections ostéoarticulaires. Disco spondylite.

ITEM 154 Tumeurs des os primitives et secondaires.

ITEM 192 Déficit neurologique récent.

ITEM 198 Dyspnée aiguë et chronique.

ITEM 200 État de choc.

ITEM 215 Rachialgie.

ITEM 231 Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval.

ITEM 279 Radiculalgie et syndrome canalaire.

ITEM 301 Déficit moteur et/ou sensitif des membres.

Sujets tombés aux concours de l'Internat et aux ECN

Sujets tombés

Aucun sujet traitant d'une lésion traumatique du rachis n'est tombé à l'Internat ou aux ECN. En revanche, plusieurs sujets traitent de compressions médullaires non traumatiques (métastases osseuses, infection, hématome par surdosage en AVK…) ou des rachialgies (cervicalgies et lombalgies).

CONSENSUS

- Prise en charge d'un blessé adulte présentant un traumatisme vertébro-médullaire – Conférence d'experts – SFAR, 2003.
- Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier – Conférence d'experts – SFAR, 2006.

POUR COMPRENDRE…

- Les traumatismes vertébro-médullaires sont fréquents, touchant environ 10 000 sujets par an en France, principalement des sujets jeunes.
- Ils sont responsables d'une morbi-mortalité importante.
- La notion de lésions secondaires pouvant aggraver la lésion initiale nécessite une prise en charge rigoureuse et coordonnée entre les différents acteurs.
- Tout traumatisé doit bénéficier d'une immobilisation de l'axe crânio-rachidien jusqu'à l'élimination formelle d'une lésion vertébro-médullaire.
- La prise en charge initiale, faisant intervenir urgentiste, orthopédiste et anesthésiste-réanimateur vise :
 - à établir le bilan clinique et paraclinique du traumatisme médullaire ;
 - à en déterminer les conséquences neurologiques : niveau lésionnel, caractère complet ou non de la lésion ;
 - à dépister et traiter les complications ventilatoires et cardiovasculaires ;
 - à rechercher toute lésion associée dans le cadre d'un polytraumatisme.

Copyrighted material

Le scanner est l'examen de référence qui doit systématiquement compléter des radiographies du rachis standard dès lors qu'une lésion du rachis est suspectée.

Le maintien d'une pression de perfusion médullaire et d'une oxygénation normale a pour objectif de limiter l'ischémie tissulaire.

L'existence d'un déficit neurologique et le caractère instable de la lésion rachidienne conditionne l'indication opératoire en urgence.

I. EPIDÉMIOLOGIE

- Les traumatismes du rachis sont une pathologie fréquente, touchant environ 10 000 sujets par an en France.
- Ils se compliquent dans environ 10 à 30 % des cas d'une atteinte médullaire.
- On compte environ 1 000 à 2 000 sujets par an en France touchés par une lésion médullaire traumatique.
- La population atteinte est à prédominance masculine (3-4 hommes pour 1 femme) et jeune (âge moyen 15-30 ans).
- Les accidents incriminés dans une lésion médullaire traumatique sont :
 - AVP ;
 - chutes de grande hauteur (défenestration) ;
 - accidents de sports (équitation, rugby, cyclisme, rollers…).
- L'association à un polytraumatisme est fréquente :
 - 70 % des traumatisés du rachis ont une lésion menaçant le pronostic vital à court terme ;
 - 10 % des polytraumatisés ont une lésion rachidienne traumatique.
- Plus rarement, les fractures surviennent sur un os pathologique et touchent le sujet âgé (tumeur osseuse, métastase osseuse d'un cancer primitif, ostéoporose, cervicarthrose et infection) ➤ ITEMS 56, 92, 154, 231.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Anatomie et notion de stabilité

Schématiquement, le rachis peut être divisé en 3 segments verticaux et 2 segments horizontaux.

- Les segments verticaux comprennent :
 - le segment vertébral antérieur : ligament commun vertébral antérieur, corps vertébral et disque ;
 - le segment vertébral moyen (SVM) : mur vertébral postérieur, pédicules, isthmes et surfaces articulaires ;
 - le segment postérieur : épineuses et ligament interépineux.

Copyrighted material

- Les segments horizontaux comprennent :
 - la vertèbre ;
 - le segment mobile rachidien (SMR), non osseux, comprenant l'ensemble des ligaments unissant deux vertèbres : ligament commun vertébral antérieur, disque intervertébral, ligament commun vertébral postérieure, ligament jaune, ligament interépineux et surfaces articulaires.

Toutes les lésions du SVM et du SMR entraînent un risque d'instabilité rachidienne et donc d'atteinte médullaire.




Fig. 201-22. Les 3 segments verticaux.
Source : *Imagerie musculosquelettique. Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.




Fig. 201-23. Biomécanique du rachis.
Source : *Prise en charge du rachis traumatique*, par O. Langeron, B. Riou. EMC, Anesthésie-Réanimation, 36-605-A-20.

B. Lésions médullaires

1. Lésions primaires

Elles constituent la lésion primitive liée au traumatisme et à l'impact initial.

Il existe différents types de lésions primaires :

Copyrighted material

- la commotion : atteinte médullaire simple avec récupération en quelques heures ;
- la contusion : atteinte médullaire associant ecchymoses, microhémorragies et œdème. Il s'agit d'une lésion définitive mais le tableau neurologique peut être incomplet ;
- la section médullaire : lésion définitive par section de moelle ;
- la compression médullaire : ischémie de moelle par compression extrinsèque dont la levée permet d'envisager une éventuelle récupération.

2. Lésions secondaires (notions)

Ces notions sont à mettre en parallèle avec la survenue de lésions secondaires au cours des traumatismes crâniens.

- L'inflammation initiale au niveau de la lésion primaire va entraîner une perte de la régulation du débit sanguin médullaire à l'origine d'une hypoperfusion médullaire.
- Au niveau cellulaire, l'inflammation va entraîner la libération de nombreux médiateurs de l'inflammation, d'acides aminés excitateurs (glutamate) et de radicaux libres à l'origine d'un syndrome d'ischémie-reperfusion.
- Au total, il existe un risque d'extension de l'atteinte neurologique au-dessus ou en-dessous de la lésion initiale par des phénomènes d'apoptose et de lyse cellulaire touchant les neurones et les cellules gliales.
- Hypotension artérielle, hypoxie, hypercapnie, hyperglycémie sont des facteurs d'agression secondaire.

C. Conséquences de l'atteinte médullaire

1. Conséquences neurologiques ITEMS 192, 279, 301

- Le **syndrome lésionnel** correspond au niveau de l'atteinte de la substance grise. Il est défini par la première racine motrice atteinte et correspond le plus souvent à la limite de disparition de la sensibilité.
- Le **syndrome sous-lésionnel** correspond à l'interruption de la conduction nerveuse par atteinte de la substance blanche. Selon la gravité de son atteinte, on distingue les syndromes médullaires complets et incomplets.

a) Syndromes médullaires complets

- On parle de paraplégie lorsque le niveau lésionnel est situé sous C7 et de tétraplégie au-dessus de C7.
- Le syndrome est complet lorsqu'il existe une interruption médullaire complète (section médullaire).
- Il constitue à la phase initiale le choc spinal, associant sous le niveau lésionnel :
 - paralysie flasque ;
 - abolition de tous les réflexes ostéotendineux ;

Copyrighted material

– anesthésie à tous les modes ;

– rétention aiguë d'urines, priapisme, atonie du sphincter anal, disparition du réflexe bulbocaverneux ;

– atteinte respiratoire et cardiovasculaire selon le niveau lésionnel.

■ Il évolue par la suite en quelques semaines vers l'automatisme médullaire associant :

– syndrome pyramidal avec paralysie spasmodique ;

– anesthésie à tous les modes ;

– récupération des réflexes anal et bulbocaverneux.

b) Syndromes médullaires incomplets ITEM 279

■ Syndrome de Brown-Séquard :

– il est dû à une lésion unilatérale de la moelle ;

– il associe une hémiplégie et un déficit sensitif épicritique homolatéral avec déficit thermo-algique controlatéral.

■ Syndrome centro-médullaire :

– il touche principalement les personnes âgées cervicarthrosiques ;

– il constitue une tétraplégie incomplète avec atteinte motrice prédominante notamment aux membres supérieurs.

■ Syndrome de contusion antérieure de la moelle :

– il est lié à une compression par fragments osseux intracanalaires ou à une hernie discale ;

– il constitue une atteinte motrice et thermo-algique avec respect de la sensibilité épicritique.

■ Syndrome de contusion postérieure de la moelle : il est responsable d'une atteinte de la proprioception.

■ Syndrome de la queue de cheval ITEM 231 : il est responsable d'une atteinte motrice et sensitive sciatique uni- ou bilatérale avec anesthésie en selle et incontinence vésicale et anale.

2. Conséquences cardiovasculaires ITEM 200

■ Les centres sympathiques responsables du contrôle de l'activité cardiovasculaire sont situés entre T1 et T6.

■ L'atteinte de ces centres va être à l'origine d'une altération de la balance sympathovagale avec abolition de l'activité sympathique au profit du parasympathique.

■ Il en résulte :

– une vasoplégie avec hypovolémie relative responsable d'une hypotension artérielle et à l'extrême d'un collapsus ;

– une bradycardie avec à l'extrême arrêt cardiocirculatoire.

Copyrighted material

■ L'hypotension artérielle est responsable de l'apparition des lésions médullaires secondaires.

3. Conséquences ventilatoires ITEM 198

Elles dépendent du niveau lésionnel :

■ pour des lésions de niveau supérieur à C4, il existe une paralysie diaphragmatique responsable d'une perte totale de l'autonomie respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire ;

■ pour des lésions de niveau C4 à C7 et dorsales hautes, ce sont les muscles respiratoires accessoires qui sont touchés rendant l'autonomie respiratoire possible (pas d'atteinte diaphragmatique) mais précaire par diminution des volumes courants et de la capacité vitale et par l'absence de toux efficace (encombrement). L'assistance ventilatoire est souvent nécessaire à la phase initiale ;

■ pour des lésions thoraciques basses et lombaires, les conséquences ventilatoires sont négligeables.

L'hypoxie est responsable de l'apparition des lésions médullaires secondaires.

4. Conséquences digestives

Les lésions médullaires sont responsables d'un iléus paralytique et d'une atonie gastrique.

5. Conséquences urinaires

Rétention aigüe d'urine.

6. Conséquences thermiques :

La perte des phénomènes de régulation thermique associée à la vasodilatation par atteinte sympathique sont responsables de la survenue d'hypothermie.

D. Lésions associées ITEM 201

0

Dogmes :

■ tout traumatisé crânien a une lésion du rachis cervical instable jusqu'à preuve du contraire et tout traumatisé du rachis cervical est un traumatisé crânien jusqu'à preuve du contraire ;

■ tout polytraumatisé possède une lésion du rachis instable jusqu'à preuve du contraire ;

■ tout traumatisme du rachis doit faire rechercher une autre lésion (crânienne, thoracique, abdominale, bassin et membres) menaçant le pronostic vital.

Copyrighted material


III. LES DIFFÉRENTS TYPES DE FRACTURES ET LÉSIONS RACHIDIENNES

Il faut distinguer les lésions stables des lésions instables, à risque de déplacements secondaires.

Deux éléments sont fondamentaux pour la stabilité du rachis : le SVM et le SMR. Toute atteinte de ces éléments va entraîner une instabilité rachidienne. Le risque est alors la survenue d'une compression médullaire et/ou radiculaire.

A. Lésions stables

Lésions	Mécanisme	Aspect
		Rachis cervical supérieur
Fracture des arcs de C1	Compression axiale et/ou hyperextension	• Clinique : cervicalgies importantes • Radiographies : divergence des masses latérales de C1 par rapport à C2 et à l'odontoïde sur le cliché bouche ouverte • Le scanner fait le bilan des différents traits de fracture • Fracture de Jefferson : double fracture des arcs antérieurs et postérieurs de C1 (fig. 201-24)
		Rachis cervical inférieur
Entorses bénignes	Flexion/ extension	• Clinique : – cervicalgies spontanées ou provoquées, céphalées – examen neurologique normal • Bilan radiologique (statique et dynamique) normal : le SMR est intact
Fractures des épineuses	Compression	• Clinique : cervicalgies • Radiographies : fracture d'une épineuse sur le cliché de profil
Fractures tassements antérieurs (fig. 201-25)	Flexion	• Clinique : cervicalgies • Radiographies : – tassement de la partie antérieure du corps vertébral – intégrité du mur postérieur
		Rachis dorsolombaire
Fracture tassement du corps vertébral	Compression antérieure	• Clinique : – dorsalgies ou lombalgies provoquées – examen neurologique normal • Radiographies : – tassement de la partie antérieure du corps vertébral – intégrité du mur postérieur



a b

Fig. 201-24. Fracture de Jefferson.
A. Cliché de face bouche-ouverte : on observe la disjonction des masses latérales de C1.
B. Scanner d'une fracture de Jefferson typique.
Source : *Imagerie musculosquelettique, Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.

Copyrighted material



Fig. 201-25. Fracture tassement de C4 .

Source : *Évaluation et orientation thérapeutique devant un traumatisme du rachis cervical*, par C. Laporte, C. Samaha. EMC, AKOS, Encyclopédie pratique de Médecine, 2-0608.

B. Lésions instables

Lésions	Mécanisme	Aspect
		Rachis cervical supérieur
Disjonction occipito-cervicale (fig. 201-26)	Hyperflexion	• Rupture des structures ligamentaires entre C1 et l'occiput • Clinique : – décès – tétraplégie haute – atteinte des paires crâniennes • Scanner : perte des rapports normaux entre le trou occipital et l'odontoïde
Fracture de l'odontoïde de C2 (fig. 201-27)	Hyperflexion et/ou hyperextension	• Clinique : – atteinte neurologique variable chez 1/3 des patients – dysphagie • Radiographies standard : – trait de fracture : apex, horizontal, oblique en bas et en avant, oblique en bas et en arrière – déplacement antérieur ou postérieur • Scanner : reconstruction tridimensionnelle de l'odontoïde et de son déplacement
Entorse grave C1-C2	Hyperflexion	Radiographies standard : diastasis de C1 sur C2
Fracture de Hangmann (fig. 201-28)	Hyperextension (pendaison)	• Lésions neurologiques inconstantes par déplacement centrifuge des fragments osseux • Radiographies : – fracture bipédiculaire de C2 le plus souvent (parfois bi-articulaires) – antélisthésis de C2 – recul de l'épineuse de C2

Copyrighted material

Rachis cervical inférieur		
Entorses graves (fig. 201-29)	Hyperflexion	• Examen clinique normal ou déficit neurologique • Radiographies normales le plus souvent • Les clichés dynamiques réalisés à 10 jours retrouvent : – écart interépineux large – perte du parallélisme des plateaux vertébraux angulation > 11° – décalage des surfaces articulaires – un antélisthésis > 3,5 mm – un tassement antérieur du corps vertébral
Luxation unilatérale/ Fracture luxation (fig. 201-30)	Flexion-rotation	• Clinique : – cervicalgie – atteinte médullaire inconstante – syndrome radiculaire fréquent • Radiographies : – décalage des épineuses – aspect de 3/4 de la vertèbre luxée sur le profil – trous de conjugaison asymétriques – antélisthésis de la vertèbre luxée – fracture du massif articulaire (supérieur ou postérieur)
Luxation bilatérale (fig. 201-31)	Hyperflexion	• Clinique : atteinte médullaire fréquente • Charnière cervico-dorsale • Radiographies : translation antérieure de la vertèbre supérieure
Fracture comminutive du corps vertébral/ Burst fracture	Compression axiale	• Clinique : atteinte médullaire fréquente • Radiographies : – écrasement de la vertèbre – traits multiples au niveau du corps vertébral – rupture et recul du mur postérieur
Tear-drop fracture (fig. 201-32)	Compression axiale-flexion	• Clinique : atteinte médullaire fréquente • Radiographies : – fracture corporéale antérieure – rupture du SMR (bâillement des articulaires et de l'espace interépineux) – recul du mur postérieur
Rachis dorsolombaire		
Fracture comminutives/ Burst Fracture (fig. 201-33 et 201-34)	Compression axiale	• Clinique : atteinte médullaire fréquente • Radiographies : – écrasement de la vertèbre – traits multiples au niveau du corps vertébral – rupture et recul du mur postérieur
Luxation/ Fracture luxation	Flexion-rotation	• Lésions du SMR • Clinique : atteinte neurologique fréquente • Radiographies : – décalage des épineuses – aspect de 3/4 de la vertèbre luxée sur le profil – trous de conjugaison asymétriques – antélisthésis de la vertèbre luxée – fracture du massif articulaire (supérieur ou postérieur)


Copyrighted material

Hidden page



Fig. 201-28. Fracture de Hangman avec antélisthésis de C2 et recul postérieur de l'épineuse.

Source : *Imagerie musculosquelettique, Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.



a



b

Fig. 201-29. Entorse grave du rachis cervical inférieur

A. Entorse grave : antélisthésis > 3,5 mm (a), angulation > 11 ° (b), décalage des surfaces articulaires, écart inter-épineux large.

B. Entorse grave C5-C6 avec fracture tassement su coin antéro-supérieur de C6.

Source : *Imagerie musculosquelettique, Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.



Fig. 201-30. Luxation unilatérale C6-C7.

Source : *Évaluation et orientation thérapeutique devant un traumatisme du rachis cervical*, par C. Laporte, C. Samaha. EMC, AKOS, Encyclopédie pratique de Médecine, 2-0608.



Fig. 201-31. Luxation biarticulaire de C5 sur C6.

Source : *Évaluation et orientation thérapeutique devant un traumatisme du rachis cervical*, par C. Laporte, C. Samaha. EMC, AKOS, Encyclopédie pratique de Médecine, 2-0608.

Copyrighted material




Fig. 201-32. Tear-drop fracture de C5.

Source : *Imagerie musculosquelettique. Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.



Fig. 201-33. Fracture comminutive de L2 avec recul du mur postérieur.

Source : *Traumatisme du Rachis*, par E. Rolland, J.-Y. Lazennec, G. Saillant. EMC, Médecine d'urgence, 25-200-E-10.




Fig. 201-34. Fracture comminutive du rachis lombaire avec recul du mur postérieur (scanner).

Source : *Imagerie musculosquelettique. Pathologies générales*, par A. Cotten. Masson, collection « Imagerie médicale Précis », 2005.

Copyrighted material

Hidden page

1. Mise en condition

- Immobilisation en rectitude craniorachidienne :
 - collier cervical rigide avec appui mentonnier et occipital ;
 - matelas à dépression (dit « coquille ») ;
 - mobilisation sur plan rigide ;
 - brancardage avec 4 opérateurs, médecin ou IDE à la tête.
- Mise en place de 2 abords veineux périphériques courts d'un calibre ≥ 16 G.
- Électrocardioscope, pression artérielle non invasive automatisée, oxymétrie pulsée.
- Oxygénothérapie à fort débit au masque à réserve.
- Analgésie.
- Prévention de l'hypothermie.

2. Neurologique

- Intubation orotrachéale si CGS ≤ 8.
- Sédation par un hypnotique (midazolam) et un morphinique (sufentanil) en perfusion continue.

3. Hémodynamique

Maintien d'une pression artérielle moyenne supérieure à 80 mmHg avec si besoin :

- remplissage vasculaire par colloïdes ou cristalloïdes (sérum physiologique) ;
- perfusion de vasopresseurs (noradrénaline) IVSE ;
- atropine en cas de bradycardie.

4. Respiratoire

- Oxygénothérapie à fort débit.
- Intubation en séquence rapide et ventilation mécanique en cas de détresse respiratoire aigue. L'intubation doit respectée les principes de l'immobilisation rachidienne.

5. Bilan à la régulation médicale du Samu – Centre 15

CONSENSUS

L'orientation d'un blessé vertébro-médullaire suspecté ou avéré doit s'effectuer vers une structure hospitalière entraînée à la prise en charge de ce type de pathologie.

V. PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE

Le traumatisé vertébro-médullaire se présente la plupart du temps comme un monotraumatisé du rachis. Il peut s'inscrire également dans le cas d'un poly-

Copyrighted material

traumatisme. Dans cette dernière situation, la prise en charge du traumatisme vertébro-médullaire doit se faire conjointement à la prise en charge du polytraumatisme (cf. paragraphe correspondant).

A. Diagnostic positif

L'examen du patient victime d'un traumatisme vertébro-médullaire doit se faire après immobilisation stricte et respect de l'axe cranio-rachidien. Toute manipulation doit être prudente.

1. Terrain et anamnèse

- Antécédents.
- Âge.
- Traitements.
- Horaire de l'accident.
- Mécanisme lésionnel : point d'impact, cinétique, ceinture de sécurité, décélération, airbag… [0]
- Nombre de victimes.
- Prise en charge pré-hospitalière.

2. Examen clinique

a) Examen général

- Recherche d'une défaillance vitale : [0]
 - score de Glasgow ;
 - cardiocirculatoire : tachycardie et/ou bradycardie, hypotension artérielle, collapsus ;
 - respiratoire : détresse respiratoire aiguë par atteinte des centres ventilatoires.
- Recherche de lésions extrarachidiennes : cranio-faciales, thorax, abdomen, bassin et membres.
- Mesure de l'hémoglobine capillaire (hémocue). [0]

b) Examen vertébro-médullaire

- Interrogatoire :
 - douleurs rachidiennes spontanées ;
 - paresthésies ;
 - faiblesses musculaires.
- Inspection :
 - ecchymoses ;
 - déformation.
- Palpation :
 - douleur reproductible à la palpation des épineuses ;
 - contracture des muscles paravertébraux.

Copyrighted material

c) Examen neurologique

L'examen neurologique doit être complet, consigné sur un schéma daté et répété afin d'apprécier l'évolution d'un éventuel déficit.

■ Syndrome médullaire : recherche du niveau lésionnel (déficit moteur et/ou sensitif).

Tableau 201-6. Niveau lésionnel et atteinte motrice.

C5	Flexion du coude
C6	Extension du poignet
C7	Extension du coude
C8	Flexion des doigts
T1	Abduction du 5e doigt
L2	Flexion de la hanche
L3	Extension du genou
L4	Flexion dorsale de cheville
L5	Extension du gros orteil
S1	Flexion plantaire de cheville

Tableau 201-7. Niveau lésionnel et atteinte sensitive (exemple).

T4	Mamelon
T6	Xyphoïde
T10	Ombilic
T12	Pli de l'aine

■ Recherche d'un syndrome sous-lésionnel : à la phase initiale, il constitue le choc spinal et associe sous le niveau lésionnel :

– paralysie flasque ;

– anesthésie à tous les modes ;

– absence de réflexes ostéotendineux ;

– rétention aigue d'urine ;

– priapisme ;

– atonie du sphincter anal, abolition du réflexe bulbo-caverneux.

■ Examen du périnée :

– sensibilité périnéale ;

– tonus du sphincter anal ;

– réflexe bulbo-caverneux ;

– priapisme ;

– rétention aigue d'urine.

L'existence d'une atteinte périnéale, notamment atonie du sphincter anal et priapisme, signe le caractère complet de l'atteinte médullaire et est de mauvais pronostic.

Copyrighted material

■ Caractère complet ou incomplet : il est étudié par le score de Frankel, sous le niveau lésionnel.

– A : déficit moteur et sensitif complet.
– B : déficit moteur complet avec sensibilité préservée.
– C : motricité conservée avec score moteur < 3.
– D : motricité conservé avec score moteur ≥ 3.
– E : motricité et sensibilité normale.

■ Recherche d'un syndrome radiculaire par atteinte d'une racine rachidienne.
■ Recherche d'un syndrome de la queue de cheval. 0



L'ensemble de cet examen est consignée grâce au score ASIA et doit être répété.

B. Bilan paraclinique

1. Radiographies standards 0

■ Rachis cervical de face et de profil en dégageant C7.
■ Rachis dorsolombaire de face et de profil.
■ Cliché de face bouche ouverte : étude de l'odontoïde.
■ Cliché de 3/4 si besoin.

On étudie :

■ l'alignement des bords antérieurs et postérieurs des vertèbres ;
■ l'alignement des bords latéraux des vertèbres ;
■ l'alignement des épineuses ;
■ les pédicules ;
■ la hauteur des disques ;
■ l'écart interépineux ;
■ les parties molles prévertébrales.

On recherche

■ lésions osseuses :
– traits de fracture,
– déplacement avec recul du mur postérieur ;
■ lésions disco-ligamentaires :
– pincement discal,
– antélisthésis,
– bâillement des espaces interépineux ;
■ signes indirects : épaississement des parties molles (hématome) prévertébrales.
■ Clichés dynamiques :
– ils sont réalisés à distance, à la recherche d'arguments pour une entorse grave an présence d'un médecin et en l'absence de signes neurologiques.
– ils ne sont pas recommandés dans le contexte de l'urgence.

Copyrighted material




Fig. 201-35. Score ASIA.

Source : *Prise en charge d'un blessé adulte présentant un traumatisme vertébro-médullaire – Conférence d'experts – SFAR, 2003.*

Copyrighted material

Hidden page




Fig. 201-36. IRM du rachis cervical.
Luxation spontanément réduite, l'IRM montre une hernie discale C4-C5 avec compression médullaire, un hypersignal postérieur témoin de la déchirure ligamentaire et un hématome intramédullaire. L'examen neurologique retrouve une tétraplégie alors que les clichés standards sont normaux.
Source : *Évaluation et orientation thérapeutique devant un traumatisme du rachis cervical*, par C. Laporte, C. Samaha. EMC, AKOS, Encyclopédie pratique de Médecine, 2-0608.

5. Bilan des lésions associées dans le cadre du patient polytraumatisé ITEM 201

- Radiographie de thorax : traumatisme thoracique associé et fractures des dernières côtes.
- Radiographie du bassin : fracture du bassin.
- Échographie abdominale.
- Scanner corps entier (body-scanner) sans, puis avec injection de produit de contraste.

VI. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

A. Mise en condition

- Transfert et hospitalisation dans une structure hospitalière spécialisée en fonction des lésions associées.
- Immobilisation en rectitude craniorachidienne :
 - collier cervical rigide avec appui mentonnier et occipital ;
 - matelas à dépression (dit « coquille ») ;
 - mobilisation sur plan rigide ;
 - brancardage avec 4 opérateurs, médecin ou IDE à la tête.
- Mise en place de 2 abords veineux périphériques courts d'un calibre ≥ 16 G.
- Électrocardioscope, pression artérielle non invasive automatisée, oxymétrie pulsée.
- Oxygénothérapie.
- Prévention de l'hypothermie.
- Prise en charge des lésions associées dans le cadre du polytraumatisme (voir page 247).

Copyrighted material

Hidden page

Hidden page

- Lutte contre la spasticité qui apparaît à distance du traumatisme : baclofène (*Liorésal*).
- Sondage vésical à demeure puis apprentissage de l'autosondage.
- Arrêt de travail.
- Psychothérapie de soutien.

E. Surveillance

- Paramètres vitaux.
- Examen neurologique consigné selon le score ASIA.
- Déplacement secondaire (radiographies standards).
- Complications de décubitus.

CONSENSUS

L'objectif de la prise en charge du traumatisé médullaire est de l'amener vers l'autonomisation lorsque celle-ci est possible. Elle nécessite une équipe médicale et paramédicale entraînée avec des structures d'accueil d'urgence puis de réadaptation spécialisées.

VII. COMPLICATIONS

A. Complications à court terme

1. Décès

- Lésions associées.
- Détresse ventilatoire.
- Troubles cardiovasculaires.

2. Neurologiques ITEMS 192, 279

- Elles sont détaillées ci-dessus.
- Tout traumatisé du rachis doit bénéficier d'un examen neurologique à la recherche d'un déficit sensitivomoteur, d'un syndrome médullaire ou radiculaire.

3. Ventilatoires ITEM 198

- Elles sont avec les complications cardiovasculaires au premier rang de la mortalité du traumatisé vertébro-médullaire.
- Bilan des complications respiratoires :
 - score ASIA, niveau lésionnel ;
 - mesure répétée de la capacité vitale ;
 - gazométrie artérielle.
- Pour des lésions de niveau supérieur à C4, il existe une paralysie diaphragmatique responsable d'une perte totale de l'autonomie respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire. La trachéotomie est à envisager de manière précoce.

Copyrighted material

■ Pour des lésions de niveau C4 à C7 et dorsales hautes, ce sont les muscles respiratoires accessoires qui sont touchés. Il existe une diminution de la capacité vitale et des volumes de réserves inspiratoire et expiratoire. L'assistance ventilatoire est souvent nécessaire à la phase initiale. L'autonomie respiratoire est possible. La kinésithérapie respiratoire est essentielle dans cette phase de réadaptation.

■ Pour des lésions thoraciques basses et lombaires, les conséquences ventilatoires sont négligeables.

4. Cardiovasculaires ITEM 200

Elles sont liées à l'atteinte du système sympathique :

■ hypotension artérielle et collapsus par vasoplégie et hypovolémie relative ;

■ bradycardie sévère, arrêt cardiaque lors de stimulations vagales (mobilisations, aspirations bronchiques).

5. Rétention aiguë d'urines

Sondage vésicale à demeure puis auto/hétérosondage intermittent.

6. Lésions associées dans les cadres des patients polytraumatisés ITEM 201

B. Complications à moyen et long termes

1. Complications de décubitus ITEM 50

■ Escarres (talons, sacrum, occiput).

■ Infections : urinaires, pneumopathies.

■ Thromboses veineuses profondes.

■ Troubles du transit, ulcère de stress.

■ Hypercalcémie.

■ Enraidissements articulaires.

2. Orthopédiques

■ Déficit neurologique secondaire par déplacement secondaire d'une lésion instable.

■ Infection de matériel d'ostéosynthèse.

■ Brèche duremérienne et méningites postopératoires.

■ Cals vicieux.

■ Pseudarthroses.

3. Souffrance psychique

■ Dépression et anxiété sont fréquentes (plus de 60 % des patients) et précoces. Un traitement antidépresseur et anxiolytique peut s'avérer nécessaire.

■ Elle est liée à la perte du contrôle de sa vie et de son corps, avec perte de l'autonomie et des liens socioprofessionnels.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche **Dernier tour**

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un brûlé

Étiologie :

- brûlures thermiques (90 %) ;
- brûlures électriques (5 %) ;
- brûlures chimiques (5 %).

Physiopathologie :

- profondeur des brûlures 0 :

Profondeur	Histologie	Clinique	Évolution
1er degré	Couche cornée de l'épiderme	Érythème « Coup de soleil »	Guérison en quelques jours sans séquelle
2e degré superficiel	Ensemble de l'épiderme	Phlyctènes Aspect rosé Exulcérations suintantes Douleur intense	Guérison en 15 jours sans séquelle
2e degré profond	Ensemble de l'épiderme et de la couche de Malpighi du derme, pas d'atteinte des phanères	Aspect blanc et rose Douleur moindre Hypoesthésie	Cicatrisation longue Cicatrices hypertrophiques
3e degré	Ensemble de l'épiderme et du derme ± hypoderme	Aspect cartonné et induré de la peau Indolore, anesthésie complète	Pas de cicatrisation spontanée Greffe de peau

- étendue de la brûlure : règle des 9 de Wallace = calcul de la surface brûlée par rapport à la surface corporelle totale :
 - tête : 9 % ;
 - tronc : 9 % × 4 ;
 - membres supérieurs : 9 %/membre ;
 - membres inférieurs : 18 % × 2 ;
 - organes génitaux externes : 1 %.

Conséquences locales et générales :

- hypovolémie et choc hypovolémique ;
- œdème pulmonaire et œdème cérébral ;
- dénutrition favorisant les complications infectieuses ;
- contamination bactérienne et risque infectieux.

Lésions associées :

- traumatismes associés 0 ;
- inhalation de suie et de fumée 0 ;
- intoxications oxycarbonée et cyanhydrique 0.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Diagnostic positif :

- **mécanisme lésionnel :** circonstances de la brûlure et nature de l'agent responsable [0] ;
- **examen général :**
 - score de Glasgow [0] ;
 - paramètres vitaux : FC, PA, FR, SpO_2, température ;
 - recherche de lésions associées et d'une intoxication au CO et cyanures [0] ;
- **examen local** réalisé en asepsie rigoureuse : évaluation de la profondeur [0], de l'étendue [0] (règle des 9 de Wallace) et du siège des brûlures ;
- **bilan paraclinique :**
 - NFS, TP, TCA [0] ;
 - groupe ABO, Rhésus, RAI [0] ;
 - ionogramme sanguin [0], gaz du sang, HbCO [0] ;
 - ECG (brûlures par électrisation) ;
 - radiographie thoracique [0] ;
 - prélèvements bactériologiques [0].

Prise en charge thérapeutique :

- **traitement général :**
 - expansion volémique par Ringer-lactate [0] ;
 - oxygénothérapie [0] ;
 - prise en charge des intoxications associées [0] ;
 - hospitalisation dans un centre de prise en charge spécialisée ;
- **traitement local :**
 - initialement :
 - extraction de l'agent causal [0] ;
 - refroidissement des brûlures [0] ;
 - puis réchauffement du patient [0] ;
 - dans une structure spécialisée :
 - cicatrisation dirigée ;
 - pansements stériles quotidiens ;
 - incisions de décharge ;
 - greffes de peau [0] ;
 - amputation ;
- **mesures associées :**
 - antalgie/sédation [0] ;
 - nutrition hypercalorique [0] ;
 - pas d'indication à une antibioprophylaxie systématique [0] ;
 - SAT/VAT [0] ;
 - anticoagulation préventive et prévention des complications de décubitus [0] ;
 - surveillance.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche Dernier tour

- Scanner corps entier *(body-scanner)* : examen incontournable dans la prise en charge des traumatisés graves 0.
- Bilan prétransfusionnel : groupe ABO et Rhésus (2 déterminations), RAI 0.
- Vérification et mise à jour de la vaccination antitétanique, voire séroprophylaxie antitétanique 0.
- Dosage des β-HCG chez la femme 0.
- Indications de « bloc direct » (sans bilan lésionnel complet) = instabilité hémodynamique avec :
 - une lésion vasculaire non contrôlée ;
 - ou un hémothorax massif (1 500 mL d'emblée et débit > 150 mL/h) ;
 - ou un hémopéritoine massif rapidement progressif.
- La prise en charge thérapeutique consiste en une surveillance rapprochée en salle de réveil les premières heures puis en réanimation chirurgicale. Le traitement spécifique dépendra des lésions objectivées et de leur association : traitement chirurgical et/ou artérioembolisation, prise en charge médicale en réanimation.
- Surveillance clinique (FC, PA invasive, SpO_2, FR, température, surveillance neurologique +++) et paraclinique (hémogramme, hémostase, gaz du sang artériels, lactates artériels, radiographie pulmonaire).
- La gravité dépend des lésions, du terrain, de la rapidité de la prise en charge et de la présence d'un état de choc réfractaire.
- Les complications sont le décès, qui peut se produire à court (lésions létales d'emblée, état de choc hémorragique gravissime), moyen (défaillance multiviscérale) ou long terme, les surinfections, les complications thromboemboliques, l'invalidité, l'impotence fonctionnelle et les séquelles psychologiques.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé abdominal

Épidémiologie :

- contusions abdominales dans 80 % des cas :
 - accidents de la voie publique ;
 - chutes de grande hauteur ;
- traumatismes pénétrants dans 20 % des cas : plaies par arme blanche et arme à feu ;
- les victimes sont en majorité des hommes jeunes ;
- la mortalité s'élève à 30 %.

Physiopathologie :

- tout traumatisme thoracique et/ou du bassin doit faire rechercher une lésion abdominale ;
- contusions abdominales (traumatismes fermés) :
 - rupture des organes pleins, de leurs pédicules vasculaires et de leurs mésos ;
 - hémorragie intra-abdominale et choc hémorragique ;
 - plus rarement, lésions des organes creux ;
- traumatismes pénétrants : lésions des organes creux.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Prise en charge diagnostique :

- **une règle : tout traumatisé abdominal est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire et tout polytraumatisé a un traumatisme abdominal jusqu'à preuve du contraire** 0 ;
- mécanisme lésionnel 0 : point d'impact, cinétique, ceinture de sécurité, airbag… ;
- examen général :
 - recherche d'un état de choc 0 ;
 - recherche de lésions extra-abdominales 0 ;
 - hémocue 0 ;
- examen abdominal :
 - ecchymoses, hématomes ;
 - plaies, éviscération ;
 - distension abdominale ;
 - défense, contracture 0 ;
 - matité, météorisme ;
 - côtes flottantes et instabilité du bassin ;
- touchers pelviens et examen des organes génitaux externes 0 ;
- bilan sanguin :
 - NFS 0, TP, TCA, fibrinogène ;
 - groupe sanguin ABO, Rhésus et RAI 0 ;
 - ionogramme sanguin, bilan hépatique et gaz du sang ;
- imagerie :
 - radiographie de thorax 0 ;
 - radiographie du bassin 0 ;
 - échographie abdominale 0 : épanchement intrapéritonéal, recherche d'une lésion des organes pleins ;
 - scanner abdominopelvien 0, réalisé sur un patient stable hémodynamiquement, dans le cadre d'un *body-scanner* :
 - épanchement intrapéritonéal, pneumopéritoine ;
 - lésions des organes pleins et creux ;
 - lésions vasculaires.

Prise en charge thérapeutique :

- on distingue deux situations :
 - choc hémorragique avec instabilité hémodynamique : le patient doit bénéficier d'une hémostase chirurgicale immédiate ;
 - état hémodynamique stable ou stabilisé : un bilan lésionnel est réalisé (échographie abdominale, scanner abdominopelvien, éventuellement artériographie) ;
- réanimation du choc hémorragique ; ➤ ITEM 200
- antibiothérapie :
 - efficace sur les bacilles Gram négatif et les anaérobies ;
 - pénicilline + aminoside ;
- laparotomie exploratrice à visée diagnostique et thérapeutique 0 :
 - bilan lésionnel ;
 - hémostase chirurgicale : splénectomie d'hémostase, *packing* hépatique ;
 - sutures ou résections, anastomoses associées à la confection de stomies ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

- traitement conservateur : chez un patient stable hémodynamiquement, sous couvert d'une surveillance stricte en réanimation ;
- artério-embolisation :
 - à visée diagnostique et thérapeutique ;
 - embolisation sélective des artères responsables de l'hémorragie ;
- mesures associées en cas de splénectomie :
 - vaccination antipneumococcique [0] et anti-*Haemophilus* [0] ± antibioprophylaxie par pénicilline au long cours ;
 - éducation [0] du patient splénectomisé.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé crânien

Traumatisé crânien non grave adulte :

	PCI	Pas de PCI
Examen normal	Hospitalisation, surveillance	Sortie, surveillance
Examen perturbé	TDM	TDM
Anesthésie générale	TDM	TDM

Traumatisé crânien grave (TCG) :

- tout TCG doit bénéficier d'une immobilisation en rectitude craniorachidienne par collier cervical rigide et matelas à dépression [0] ;
- la prise en charge d'un TCG a pour objectif de prévenir l'ischémie cérébrale secondaire à l'hypertension intracrânienne ;
- la prévention et le traitement des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) doivent débuter dès la phase pré-hospitalière :
 - hypotension artérielle < 90 mmHg de PAS ;
 - hypoxémie < 60 mmHg de PaO_2 ;
 - hypercapnie et hypocapnie ;
 - hyperthermie ;
 - hypoglycémie et hyperglycémie ;
 - hyponatrémie ;
- la stratégie diagnostique repose sur :
 - l'examen neurologique : GCS, pupilles, motricité ;
 - le Doppler transcrânien ;
 - le scanner encéphalique non injecté ;
- la stratégie thérapeutique repose sur :
 - la réanimation hémodynamique et respiratoire : maintien d'une pression artérielle moyenne > 90 mmHg [0] ;
 - le traitement de l'HTIC ;
 - l'osmothérapie par mannitol en cas de mydriase aréactive [0] ;
 - le contrôle des ACSOS ;
 - la chirurgie, parfois ;
- le sondage nasogastrique est contre-indiqué ainsi que les solutés hypotoniques [0] ;
- les anticoagulants préventifs sont contre-indiqués pendant 5 jours [0] ;
- le pronostic d'un polytraumatisé est aggravé en présence d'un traumatisme crânien grave.

Copyrighted material

Hidden page

Fiche **Dernier tour**

– traitement :
 • détersion, lavage, parage et suture sans tension ;
 • lambeau et greffe de peau à distance dans les fractures Cauchoix III ;
 • réduction du foyer de fracture : Cauchoix I = traitement identique à une fracture fermée, Cauchoix II = l'ostéosynthèse dépendra du type de fracture et du délai de prise en charge, Cauchoix III : fixateur externe ;
 • mesures associées : antibiothérapie 0, SAT, VAT 0 pansements antiseptiques, antalgiques, prophylaxie thromboembolique ;

■ **syndrome des loges :**
– syndrome ischémique lié à une hyperpression au sein des loges aponévrotiques ;
– clinique :
 • survient dans les 24 h suivant le traumatisme ;
 • douleurs intenses ;
 • œdème avec tension douloureuse des loges ;
 • déficit sensitivomoteur ;
 • persistance des pouls périphériques ;
– traitement :
 • urgence thérapeutique 0 ;
 • ouverture et ablation du plâtre 0 ;
 • aponévrotomie de décharge 0 ;

■ **autres complications :**
– locales :
 • précoces : ischémie de membre par lésions artérielles, lésions nerveuses, infection, déplacement secondaire du foyer de fracture ;
 • tardives : retard de consolidation, cal vicieux, pseudarthrose, ostéite chronique, algodystrophie, troubles trophiques ;
– générales :
 • choc hémorragique ;
 • Crush syndrome ;
 • embolie graisseuse ;
 • décompensation d'une pathologie chronique associée ;
 • complications de décubitus ➤ ITEM 50.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé du bassin

■ **Pronostic vital engagé** par le risque de choc hémorragique cataclysmique sur hématome rétropéritonéal.

■ **Mécanismes lésionnels** :
– compression latérale (fracture de l'aile iliaque, de la branche ischiopubienne et/ou iliopubienne) ;
– compression antéropostérieure (disjonction sacro-iliaque, disjonction pubienne, fracture du sacrum) ;
– cisaillement (lésions complexes) ;
– traumatisme ouvert (risque infectieux).

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

■ **Prise en charge pré-hospitalière** :
– voir les principes de la prise en charge de tout polytraumatisé ;
– utilisation du pantalon antichoc en cas de choc hémorragique sévère avec forte suspicion de traumatisme du bassin, contre-indication formelle en cas de traumatisme thoracique grave 0, après sédation et analgésie efficaces.

■ Prise en charge hospitalière :
– **particularités de l'examen clinique :**
• touchers pelviens 0 ;
• percussion, recherche d'une matité sus-pubienne ;
• l'association d'un globe vésical avec une hématurie évoque fortement une lésion urétrale qui contre-indique le sondage vésical 0 avant l'avis spécialisé d'un urologue. Dans l'attente, un cathéter sus-pubien sera mis en place ;
– **examens complémentaires :**
• bilan usuel de tout traumatisé grave. On recherche en particulier une anémie et une coagulopathie (CIVD et/ou fibrinolyse) ;
• radiographie du bassin de face ;
• scanner du bassin avec injection de produit de contraste ;
– **stratégie thérapeutique :**
• réanimation du choc hémorragique ;
• hémostase radio-interventionnelle rapide ;
• fixation des fractures ;
• pas d'indication à l'abord chirurgical du rétropéritoine dans les traumatismes du bassin.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé thoracique

■ Les traumatisés du thorax sont des polytraumatisés jusqu'à preuve du contraire.

■ Deux types de lésions mettent en jeu le pronostic vital :
– cœur et gros vaisseaux : rupture de l'isthme aortique ;
– tamponnade gazeuse.

■ Trois diagnostics parfois difficiles qu'il faut savoir évoquer :
– déchirure de coupole diaphragmatique ;
– contusion myocardique ;
– pneumothorax antérieur : radio de face souvent normale.

Physiopathologie :

■ traumatisme fermé du thorax (AVP, chutes) :
– lésions de décélération ;
– lésions par transmission directe de l'onde de pression ;

■ traumatisme thoracique pénétrant : arme à feu, arme blanche.

Examen clinique :

■ voir le polytraumatisé ;

■ les traumatisés du thorax sont des polytraumatisés jusqu'à preuve du contraire.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Examens complémentaires :

- imagerie :
 - examens de première ligne :
 - radiographie thoracique de face (diagnostic de lésions nécessitant un traitement urgent de sauvetage) ;
 - examen du médiastin supérieur 0 ;
 - échographie pleurale et péricardique ;
 - scanner thoracique avec injection de produit de contraste :
 - indispensable pour éliminer une lésion d'un gros vaisseau intrathoracique ;
 - comme pour le polytraumatisé, le scanner du traumatisé thoracique sera effectué sur un patient stabilisé et ne retardera pas la prise en charge d'une blessure thoracique mettant en jeu le pronostic vital ;
- biologie : ensemble des examens du traumatisé grave (voir la section correspondante).

Prise en charge des lésions principales :

- les mesures générales sont celles de la prise en charge de tout polytraumatisé ;
- la prise en charge repose sur le traitement des défaillances :
 - respiratoires :
 - oxygénothérapie ;
 - ventilation mécanique ;
 - kinésithérapie respiratoire ;
 - analgésie efficace ;
 - systémique et locorégionale ;
 - hémodynamiques :
 - correction du choc hémorragique ;
 - évacuation des épanchements ;
 - hémostase chirurgicale ou radio-interventionnelle ;
- contre-indication du pantalon anti-choc 0 ;
- antibiothérapie prophylactique si traumatisme pénétrant du thorax 0 ;
- **volet costal :**
 - trait de fracture passant par plusieurs côtes voisines ;
 - désolidarisation d'un segment de paroi thoracique ;
 - risque d'ateléctasie et de détresse respiratoire aiguë ;
 - traitement : assistance ventilatoire non invasive, voire invasive, analgésie efficace, stabilisation chirurgicale (indications spécialisées) ;
- **pneumothorax :**
 - au maximum, tamponnade gazeuse ;
 - traitement : drainage pleural percutané ;
- **hémothorax :**
 - risque de surinfection (empyème pleural), de troubles de ventilation voire atélectasies et d'insuffisance respiratoire aiguë ;
 - traitement : drainage pleural, thoracotomie d'hémostase en urgence si saignement ≥ 1 500 mL à la pleurotomie, ou débit de sang ≥ 150 mL/h ;
 - diagnostic différentiel d'un hémothorax gauche : rupture diaphragmatique ;

Copyrighted material

Hidden page

Fiche **Dernier tour**

– plaies révélant une lésion organique nécessitant la mise en place de mesures de réanimation et une prise en charge chirurgicale.

■ **Prise en charge thérapeutique :**

– exploration de la plaie 0 :
 • sous anesthésie et dans des conditions d'asepsie rigoureuse ;
 • nettoyage et irrigation ;
 • recherche et suture microchirurgicale des lésions tendineuses, nerveuses et vasculaires ;

– mesures générales :
 • antalgiques 0 : de niveau 1 à 3 selon l'EVA ;
 • antibiothérapie/antibioprophylaxie par bêtalactamines en l'absence d'allergie pour les lésions avec risque infectieux élevé (souillures, morsures, signes généraux d'infection, fracture ouverte associée, plaies articulaires, vasculonerveuses ou tendineuses), de durée de 3-5 jours ;
 • SAT, VAT 0 ➤ ITEM 103 ;
 • prise en charge du risque rabique en cas de morsure ➤ ITEM 213 ;
 • rééducation.

■ **Complications :**

– artérielles : traitement par suture de l'artère lors de l'exploration chirurgicale ;
– nerveuses : traitement par suture nerveuse lors de l'exploration chirurgicale ;
– tendineuses : suture tendineuse et immobilisation pendant 6 semaines ;
– infectieuses : ce type de plaies doit bénéficier d'une prise en charge spécifique ➤ ITEMS 101, 103, 213 ;
– amputations : le segment amputé doit être lavé abondamment et conservé dans un sachet en plastique, lui-même placé dans la glace. Tout contact direct avec la glace est proscrit.

Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces chez un traumatisé du rachis

Epidémiologie

■ Pathologie fréquente avec 10 à 30 % d'atteinte médullaire.
■ 1 000 à 2 000 sujets par an en France touchés par une lésion médullaire traumatique.
■ Population masculine et jeune.
■ Mécanismes : AVP, chutes de grande hauteur, accidents de sports.
■ Association fréquente à un polytraumatisme.

Physiopathologie

■ Toute lésion du SVM et du SMR = instabilité rachidienne = risque d'atteinte médullaire 0.
■ Lésion primaire : directement liée au traumatisme.
■ Notion de lésion secondaire : aggravant la lésion initiale.
■ Hypotension artérielle, hypoxie, hypercapnie, hyperglycémie sont des facteurs d'agression secondaire.
■ **Conséquences neurologiques** ➤ ITEMS 192, 279, 301 :

Syndrome lésionnel = première racine motrice atteinte, limite de disparition de la sensibilité.

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

Syndrome sous-lésionnel.

– Syndromes médullaires complets

• Choc spinal, initial : paralysie flasque, abolition de tous les réflexes ostéo-tendineux, anesthésie à tous les modes, rétention aiguë d'urines, priapisme, atonie du sphincter anal, disparition du réflexe bulbo-caverneux , atteintes respiratoire et cardiovasculaire.

• Évolution vers l'automatisme médullaire : syndrome pyramidal avec paralysie spasmodique, anesthésie à tous les modes, récupération des réflexes anal et bulbo-caverneux.

– Syndromes médullaires incomplets ➤ ITEM 279

• Syndrome de Brown-Séquard.

• Syndrome centro-médullaire.

• Syndrome de contusion antérieure de la moelle.

• Syndrome de contusion postérieure de la moelle.

• Syndrome de la queue de cheval ➤ ITEM 231.

■ **Conséquences cardiovasculaires** ➤ ITEM 200

– Abolition de l'activité sympathique au profit du parasympathique.

– Vasoplégie, hypovolémie relative, hypotension artérielle, bradycardie, arrêt cardiocirculatoire.

■ **Conséquences ventilatoires** ➤ ITEM 198

– Supérieur à C4 : paralysie diaphragmatique avec perte totale de l'autonomie respiratoire.

– De C5 à dorsales hautes : autonomie respiratoire possible mais précaire (encombrement).

– Thoraciques basses et lombaires : conséquences ventilatoires négligeables.

■ **Autres :** iléus paralytique, rétention aiguë d'urine, hypothermie.

■ **Lésions associées** ➤ ITEM 201.

Dogmes 0 :

■ Tout traumatisé crânien a une lésion du rachis cervical instable jusqu'à preuve du contraire et tout traumatisé du rachis cervical est un traumatisé crânien jusqu'à preuve du contraire.

■ Tout polytraumatisé possède une lésion du rachis instable jusqu'à preuve du contraire.

■ Tout traumatisme du rachis doit faire recherche une autre lésion (crânienne, thoracique, abdominale, bassin et membres) menaçant le pronostic vital.

Prise en charge préhospitalière

Un principe : tout traumatisé grave est à haut risque de lésion rachidienne instable et doit bénéficier d'une immobilisation de l'axe craniorachidien durant toute la prise en charge 0.

■ Circonstances de l'accident et bilan clinique lésionnel.

■ Prise en charge des défaillances vitales (question polytraumatisé) ➤ ITEM 201.

■ Orientation dans un centre de pris en charge spécialisé.

Prise en charge hospitalière

■ Terrain et anamnèse.

■ Mécanisme lésionnel 0.

■ **Examen clinique :**

– recherche d'une défaillance vitale 0 et hémocue 0 ;

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– examen vertébro-médullaire : douleur spontanée ou provoquées à la palpation, déformation, contractures des muscles paravertébraux ;
– examen neurologique complet, consigné sur un schéma (classification ASIA) daté et répété [0] :
 • recherche d'un syndrome médullaire avec niveau lésionnel et syndrome sous-lésionnel,
 • examen du périnée [0] syndrome de la queue de cheval [0],
 • caractère complet ou incomplet,
 • syndrome radiculaire.

■ **Radiographies standards** [0] : rachis face, profil (dégageant C7 en cervical) ± 3/4, bouche ouverte.
■ **Scanner du rachis** [0] : examen de référence chez le polytraumatisé, devant toute anomalie des clichés standards et en cas de forte suspicion clinique de lésions rachidiennes.
■ **IRM médullaire** [0] : en cas de suspicion de lésion médullaire ou de déficit neurologique sans anomalie radiologique ou scannographique.
■ Bilan sanguin :
– NFS [0], TP, TCA, fibrinogène ;
– Groupe sanguin, Rhésus et RAI [0] ;
– Ionogramme sanguin, bilan hépatique et gaz du sang selon le contexte.
■ **Bilan des lésions associées dans le cadre du patient polytraumatisé** [0].

Prise en charge thérapeutique

■ Transfert et hospitalisation dans une structure hospitalière spécialisée en fonction des lésions associées.
■ Immobilisation en rectitude craniorachidienne [0].
■ Deux voies veineuses périphériques de bon calibre.
■ Monitorage standard ± pression invasive.
■ Prévention de l'hypothermie.
■ **Maintien d'une pression artérielle moyenne ≥ 80 mmHg :** contre-indication des solutés hypotoniques [0].
■ **Lutte contre l'hypoxie et assistance ventilatoire :**
– oxygénothérapie [0] ;
– intubation orotrachéale et ventilation mécanique en cas :
 • de détresse respiratoire aigue liée au traumatisme médullaire,
 • de trouble de la conscience (GCS ≤ 8) ;
– monitorage du CO2 expiré, objectif =normocapnie.
■ **Équilibre glycémique strict.**
■ **Corticothérapie :** non recommandée.
■ **Traitement orthopédique ou traitement chirurgical :**
– dans tous les cas immobilisation par minerve (rachis cervical) ou corset (rachis dorsolombaire) ;
– les indications chirurgicales sont l'affaire du spécialiste, elles dépendent de l'existence d'une instabilité et d'un déficit neurologique.
■ **Mesures associées :**
– Immobilisation et repos au lit strict.
– Antalgiques [0] ITEM 66.
– SAT-VAT le cas échéant [0].
– Anticoagulation préventive et prévention des complications de décubitus [0].

Copyrighted material

Fiche Dernier tour

– Rééducation, kinésithérapie motrice et respiratoire 0.
– Lutte contre la spasticité.
– Sondage vésical à demeure puis apprentissage de l'autosondage.
– Arrêt de travail.
– Psychothérapie de soutien.
– Surveillance clinique répétée (neurologique), radiologique.
– L'objectif de la prise en charge du traumatisé médullaire est de l'amener vers l'autonomisation lorsque celle-ci est possible. Elle nécessite une équipe médicale et paramédicale entraînée avec des structures d'accueil d'urgence, puis de réadaptation spécialisées.

Complications

A court terme (voir « Physiopathologie »)	A moyen et long termes
■ Décès ■ Neurologiques ➤ ITEMS 192, 279 ■ Ventilatoires ➤ ITEM 198 ■ Cardiovasculaires ➤ ITEM 200 ■ Rétention aiguë d'urines ■ Lésions associées dans les cadres des patients polytraumatisés ➤ ITEM 201	■ Complications de décubitus ➤ ITEM 50 ■ Orthopédiques : – déficit neurologique secondaire, déplacement secondaire – infection de matériel d'ostéosynthèse – brèche dure-mérienne et méningites postopératoires – cals vicieux – pseudarthrose ■ Souffrance psychique ■ Douleurs ➤ ITEMS 65, 66 – nociceptives : antalgiques classiques (niveau I à III) – neurogènes : antidépresseurs tricycliques et anticonvulsivants ■ Spasticité

Copyrighted material

Index

A

Abcès, 262
- sous-phrénique, 260, 262

Acide acétylsalicylique (aspirine), 208
Acidose
- métabolique, 105, 108, 165
- respiratoire, 106, 110

Actiq, 214
Actiskénan, 213
Acupan, 211
Adrénaline, 26, 58, 71, 72
Agression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS), 266, 268
Alcalinisation urinaire, 97
Alcalose
- métabolique, 105, 109
- respiratoire, 106, 111

Alcoolémie, 92
Alfentanil, 227
Algie vasculaire de la face, 216
Algodystrophie, 283
Allergène, 67
Aminoamide
- bupivacaïne, 229
- étidocaïne, 229
- lidocaïne, 229
- mépivacaïne, 229
- ropivacaïne, 229

Aminoester
- chloroprocaïne, 229
- procaïne, 229
- tétracaïne, 229

Amitriptyline (*Laroxyl*), 216
Amputation, 304
Anaérobie, 6
Analgésie péridurale, 291
Analgésique, 227
Analyse toxicologique, 82
Anesthésie
- aiguille de Tuohy, 230
- locale et locorégionale (ALR), 229
- péridurale, 230, 231

Anexate, 83
Antibiothérapie, 12, 15, 17
Antidépresseurs tricycliques, 83
Antidote, 82
Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 209
Anurie, 159
Aponévrotomie, 278
- de décharge, 278, 282

Arc électrique, 241
Arrêt cardio-circulatoire, 21
Artérioembolisation, 253, 259, 287
Aspégic, 208
Aspirine pH 8, 208
Asthme aigu, 45
Asystolie, 22
Atropine, 97
Automatisme médullaire, 309
Avulsion hépatique, 261
Axonotmésis, 279

B

Bacilles Gram négatif (BGN), 6, 13
Baclofène (*Liorésal*), 218
Bactéries multirésistantes (BMR), 178
Barbituriques, 84
Bas de contention, 268
Bassin, 283
Benzodiazépine, 83
Bêtabloquants, 86
Bétalactamase à spectre élargi (BLSE), 178
Biphosphonate, 218
Bi-profénid, 209
Blast, 256, 291
Bourgeonnement, 300
Brèche dure-mérienne, 271
Brosse distale protégée, 186
Brûlure, 241
- chimique, 241
- électrique, 241

Copyrighted material

– profondeur, 242
– thermique, 241
Bupivacaïne, 230
Buprénorphine, 214

C

Cal vicieux, 283
Calcitonine, 218
Candida, 13
Candidémie, 6
Carbamate, 84
Carbamazépine (*Tégrétol*), 217
Carboxyhémoglobine, 87, 88
Catalgine, 208
Catécholamine, 58
Cathéter
– artériel, 251
– pulmonaire, 56
– veineux central, 251
Celebrex, 209
Céphalée, 216
Charbon activé, 97
Chloroquine, 86
Choc, 54, 250
– anaphylactique, 52, 53, 55, 58, 59, 71, 229
– cardiogénique, 51, 53, 55, 59, 250
– hémorragique, 59, 249, 250, 251
– hypovolémique, 51, 53, 55, 59
– obstructif, 250
– septique, 8, 51, 53, 55, 59
– spinal, 250
Cicatrisation dirigée, 300
Citalopram (*Seropram*), 216
Clairance de la créatinine, 160
Classification
– ASA, 193, 233
– d'Altemeier, 194
– de Butain, 259
– de Cauchoix-Duparc, 277
– de Moore, 260
Clomipramine (*Anafranil*), 216
Clonazepam (*Rivotril*), 217
Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), 10, 55, 155, 281, 282
Codoliprane, 210
Coma, 79, 137, 140
Complication de décubitus, 268, 283
Conscience, 138
Consultation d'anesthésie, 232
Contramal, 211
Contusion
– abdominale, 255, 256
– myocardique, 289, 295
– pulmonaire, 289
Cordotomie spinothalamique, 219
Corps étranger des voies aériennes supérieures, 31, 40
Corticothérapie, 218
Coxibs, 209
Crises convulsives, 79
Cryothérapie, 220
Cryptocoque, 7, 13
Curare, 227
– dépolarisant (succinylcholine), 227
– non dépolarisant (vécuronium, atracurium/cisatracurium, rocuronium, mivacurium), 227

D

Dafalgan, 208
– codéiné, 210
Débit de filtration glomérulaire (DFG), 151, 160
Décérébration, 140
Décontamination digestive, 84, 96
Décortication, 140
Décubitus ventral, 37
Défibrillation, 24
– automatisée externe (DAE), 25
Désipramine (*Pertofran*), 216
Désordres hydroélectrolytiques, 103
Détersion, 300
Détresse respiratoire aiguë, 31
Dialyse conventionnelle, 168
Di-antalvic, 210
Diazépam (*Valium*), 218
Dicodin, 210
Digitaliques, 85
Dissociation électromécanique, 23
Diurèse alcaline, 281
Dobutamine, 58
Dopamine, 58
Doppler transcrânien, 268
Douleur neuropathique, 216
– périphérique, 217
Drainage pleural, 293
Durogésic, 214

Copyrighted material

Dyspnée, 38
– de Cheyne-Stockes, 142
– de Küssmaul, 143

E

Échelle
– comportementale de Bourhis, 221
– de Comfort pour les enfants, 221
– numérique simple (ENS), 221
– verbale simple (EVS), 221
– visuelle analogique (EVA), 221
Échographie
– abdominale, 257, 258
– cardiaque transthoracique, 56
– – transœsophagienne, 294
Efferalgan, 208
– codéiné, 210
Effet
– quinidine-*like*, 81, 83
– stabilisant de membrane, 81, 86
Électroencéphalogramme (EEG), 82, 84, 144, 146
Électromyogramme, 279
Embarrure, 265, 269
Embolie graisseuse, 250, 282
EMLA, 231
Emphysème sous-cutané, 289, 291, 292, 296
Encéphalopathie de Wernicke, 145
Enclouage centromédullaire, 275
Endocardite, 16
Endoscopie bronchique, 296
End-tidal CO_2, 234
Entorse
– bénigne, 311
– grave, 312, 313
Entretien, 227
Épithélialisation, 300
Équation d'Henderson-Hasselbach, 106
Escarres, 268
État de choc, 49
État de mal épileptique (EME), 145
Étomidate, 227
Exposition aux fumées d'incendie, 87

F

Faux kyste du pancréas, 263
Fentanyl, 214
Fibrillation ventriculaire (FV), 22
Fibrose rétropéritonéale, 154
Fistule biliaire, 261, 262
Fixateur externe, 275
Flap
– intimal, 294
– intra-luminal – hémomédiastin, 295
Floctafénine, 210
Flumazénil, 82, 97
Fluvoxamine (*Floxyfral*), 216
Foie de choc, 54
Fracture
– Burst, 313
– de côtes, 292, 296
– de l'odontoïde de C2, 312
– ouverte, 276, 277
– splénique, 260
– Tear-drop, 313
Fragment FAB d'anticorps antidigitaliques, 85

G

Gabapentine (*Neurontin*), 217
Gaz du sang, 39, 107
Gaz halogéné
– desflurane, 227
– isoflurane, 227
– sévoflurane, 227
Glomérulonéphrite rapidement progressive, 157
Glucagon, 97

H

Hématome
– extra-dural (HED), 269
– périmédullaire, 232
– rétropéritonéal, 250, 259, 283, 286
– sous-dural aigu (HSD), 269, 270
Hémobilie, 261, 262
Hémoculture, 8
Hémodialyse, 97
– intermittente, 60
Hémofiltration continue, 60, 168
Hémopéricarde, 250, 253
Hémopéritoine, 253
Hémopneumothorax, 288, 296
Hémorragie
– extra-durale, 265
– sous-arachnoïdienne, 265
– sous-durale, 265

Copyrighted material

Hémothorax, 253, 288, 293, 294
Hépatite fulminante, 93, 96
Histamine, 69
HIV-associated nephropathy (HIVAN), 158
Hormone antidiurétique, 113
Hydrocolloïde, 300
Hydromorphone, 213
Hydroxocobalamine, 89
Hypercalcémie, 126
Hyperkaliémie, 119, 165
Hyperlactatémie, 55
Hypernatrémie, 117
Hypertension intracrânienne (HTIC), 268
Hyperthermie maligne, 229
Hypnotique, 227
Hypocalcémie, 128
Hypoglycémie, 144
Hypokaliémie, 122
Hyponatrémie, 113

I

Imipramine (*Tofranil*), 216
Indice de Baux, 244
Induction, 227
Infection
- associée aux soins (IAS), 176
- cutanée, 16
- des tissus mous, 16
- du site opératoire, 193
- intra-abdominale, 16
- liée aux cathéters veineux centraux, 17, 187
- nosocomiale, 175, 176
- urinaire, 15, 181

Inhibiteur calcique, 86
Insuffisance rénale aiguë (IRA)
- anurie, 149
- fonctionnelle, 54, 152, 161
- obstructive, 152
- par NTA, 161
- parenchymateuse, 152

Insuffisance respiratoire aiguë, 31, 45
Insuffisance surrénalienne relative, 60
Intoxication
- à l'acide glycyrrhizique, 122
- aiguë, 77
- alcoolique aiguë (IAE), 91
- au paracétamol, 93
- aux salicylés, 94
- cyanhydrique, 87, 89, 243
- oxycarbonée, 243
- par antalgiques, 93
- par cardiotropes, 85
- par le monoxyde de carbone, 87
- par psychotropes, 83

Intubation, 44
Ischémie aiguë de membre, 246
Isolement, 179

J

Jeûne, 233
- préopératoire, 233

K

Kapanol LP, 213
Kétamine, 227

L

Laparotomie exploratrice, 259, 260, 262
Lavage
- bronchoalvéolaire, 186
- des mains, 179, 181
- gastrique, 96

Lésion axonale diffuse, 265
Lexomil, 218
Libération des voies aériennes, 144
Lidocaïne, 230
Lithium, 84
Luxation cardiaque, 288, 297

M

Manœuvre de Heimlich, 41
Massage cardiaque externe, 24
Matelas à flux, 268
Méningite, 15, 232, 271
Méningococcémie, 11
Microangiopathie thrombotique, 158, 159
Migraine, 216, 217
Monitorage peranesthésique, 234
Monoxyde d'azote, 37
Morphine
- morphine-3-glycuronide, 212
- morphine-6-glycuronide, 212

Morphinothérapie
- intracérébroventriculaire, 220
- intrathécale, 219

Mort encéphalique, 143
Moscontin LP, 213
Mydriase aréactive, 267

Copyrighted material

Myélinolyse centropontine, 116
Myélome, 155
Myoglobine, 281
Myoglobinurie, 281

N

N-acétylcystéine, 93, 97, 171, 209
Nalbuphine, 214
Naloxone, 82, 94, 97, 144
Nécrose tubulaire aiguë, 54, 154, 246, 281
Néphropathie
– glomérulaire aiguë, 156
– interstitielle aiguë, 156
– vasculaire aiguë, 158
Neurapraxis, 279
Neuroleptiques, 84
Neuromyopathie de réanimation, 271
Neuropathie diabétique, 217
Neuropmésis, 279
Neurostimulation transcutanée, 219
Névralgie
– du trijumeau, 217, 219
– postzostérienne, 217
Nifluril, 209
Noradrénaline, 58, 249
Noramidopyrine, 210
Normogramme de Rumack et Matthew, 93
Nubain, 214

O

Œdème
– aigu du poumon lésionnel, 246, 282
– angioneurotique, 70
– de Quincke, 40, 68, 72
– pulmonaire, 45
Oligurie, 159
Ordonnance sécurisée, 211
Osmolalité, 112
Osmolarité, 80, 112
Osmothérapie, 267
Ostéite, 279
– chronique, 283
Ostéosynthèse, 276, 282
Oxycodone, 213
Oxycontin LP, 213
Oxygénothérapie, 42, 88
– hyperbare, 88

P

Packing hépatique, 259
Pancréatite, 262
Pantalon anti-choc, 250, 285
Paracétamol, 208
Paroxétine (*Deroxat*), 216
PCA, 212
Perfalgan, 208
Péritonite, 259, 262, 263
Phloroglucinol (*Spasfon*), 218
Plaie
– de la face, 301
– de la main, 302
– des parties molles, 297
Pleurésie, 263
Pneumatocèle, 295
Pneumopathie, 15
– acquise sous ventilation mécanique (PAVM), 184, 185
– aiguë communautaire, 45
Pneumothorax, 40, 288, 291, 292
Polypnée de Kussmaul, 108
Polytraumatisé, 247
Ponction-biopsie rénale, 163, 164
Ponction-lavage péritonéale, 258
Prégabaline (*Lyrica*), 217
Prémédication, 227, 233
Pression
– artérielle
– – diastolique, 54
– – différentielle, 54
– – moyenne, 54, 58
– – pulsée, 54
– de perfusion cérébrale (PPC), 266
– expiratoire positive (PEP), 37
– intracrânienne (PIC), 266
Profénid, 209
Prophylaxie thromboembolique, 276
Propofol, 227
Protéine C activée, 59
Protoxyde d'azote, 227
Pseudarthrose, 283
Purpura, 59, 144
– aigu fébrile, 11

Q

Questionnaire
– Douleur de Saint-Antoine, 221
– Mac Gill Pain, 221

Copyrighted material

R

Rachianesthésie, 230, 231
Radicellotomie postérieure sélective, 218
Réanimation cardiopulmonaire
– de base, 24
– spécialisée, 26
Règle des 9 de Wallace, 242, 244
Rémifentanil, 227
Remplissage vasculaire, 27, 57, 71
Réponse inflammatoire systémique (SIRS), 8, 52
Réveil, 227
Rhabdomyolyse, 155, 246
Ropivacaïne, 230
Rosner, 266
Rotation des opioïdes, 212
Rupture
– de l'isthme aortique, 288, 293, 294, 295
– diaphragmatique, 293, 296, 297
– œsophagienne, 288
– trachéobronchique, 288

S

Salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI ou salle de réveil), 228
SAT, 301
Saturation pulsée en oxygène (SpO2), 234
Scanner
– cérébral, 268
– corps entier (body-scanner), 253
Score
– ASIA, 321, 322
– de Frankel, 321
– de Glasgow (GCS), 140, 248, 266, 267
– de Glasgow-Liège, 142
– de Mallampati, 233
– NNISS, 194
– UBS, 244
Sédation, 227
Segment
– mobile rachidien (SMR), 307
– vertébral moyen (SVM), 306
Sepsis, 8, 52
– sévère, 8, 52
Septicémie, 3
Sertraline (*Zoloft*), 216
Sévrédol, 213
Signalement, 180
Skénan LP, 213
Solupsan, 208
Solution hydroalcoolique, 179, 181
Sophidone LP, 213
Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality (SCIWORA), 323
Splénectomie, 259, 260
Staphylocoque, 5, 13, 178
Stimulation
– cérébrale profonde, 219
– du gyrus moteur, 219
– médullaire, 219
Stomie, 262
Streptocoque, 6, 13
Substance réticulée activatrice ascendante (SRAA), 138
Sufentanil, 227
Surveillance, 253
– postinterventionnelle (SSPI), 234
Syndrome(s)
– adrénergique, 82
– atropinique, 81
– centro-médullaire, 309
– Crush, 280
– d'hyperthermie maligne, 82
– d'ischémie-reperfusion, 280
– de Brown-Séquard, 309
– de contusion
– – antérieure de la moelle, 309
– – postérieure de la moelle, 309
– de détresse respiratoire aiguë (SDRA), 36, 54, 246, 281
– de la queue de cheval, 309
– de loges, 246, 273, 277
– de Lyell, 209
– de myorelaxation, 81
– de Pancoast-Tobias, 218
– de pénétration, 40
– de Reye, 208
– hépatorénal (SHR), 153
– lésionnel, 308
– *Locked-in*, 146
– médullaires complets, 308
– néphritique, 157
– néphrotique impur, 156
– opioïde, 82, 94
– postintervallaire, 88
– sérotoninergique, 82

Copyrighted material

– *Sick cell*, 115
– sous-lésionnel, 308
Système rénine-angiotensine-aldostérone, 113

T

Tamponnade, 250
– gazeuse, 292
Temgésic, 215
Tentative de suicide, 78
Tétrazépam (*Myolastan*), 218
Théorie du portillon de Wall et Melzach, 220
Thermocoagulation du nerf trijumeau, 219
Thermothérapie, 220
Thiopental, 227
Thoracotomie, 293
Titration, 212, 250
Tonicité, 112
Topalgic, 211
Toxidrome, 81
Tractotomie pédonculaire stéréotaxique, 219
Tramadol, 210
Tranxène, 218
Traumatisé
– abdominal, 255
– des membres, 271
– du bassin, 283
– du rachis, 304
– grave, 247
– thoracique, 287
Traumatisme(s)
– crânien, 144
– – grave (TCG), 254, 263
– hépatique, 260
– pénétrant, 256, 261
– – abdominal, 255
– splénique, 259
– vertébro-médullaires, 305
Trou
– anionique (TA), 107
– osmolaire, 80, 114
Troubles de l'équilibre acidobasique, 103
Tryptase, 69

U

Urbanyl, 218

V

Vaccination
– anti-*Haemophilus*, 260
– antipneumococcique, 260
Vasopressine, 27
VAT, 301
Venlafaxine (*Effexor*), 216
Ventilation
– mécanique, 37, 43, 60
– non invasive, 44
Vibrothérapie, 220
Vigilance, 138
Visite préanesthésique, 233
Volet costal, 289, 291
Vomissements provoqués, 96

Z

Zamudol, 211

Copyrighted material

Copyrighted material

408340 - I - (4) - OSB 80 - PMS 1788 - EXEGRAPH

*
* *

ELSEVIER MASSON S.A.S.
62, rue Camille-Desmoulins
92442 Issy-les-Moulineaux
Dépôt légal : novembre 2007

*
* *

Achevé d'imprimer en octobre 2007
par NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S.
61250 LONRAI
N° Imprimeur : 073261

Imprimé en France

Copyrighted material

Copyrighted material

Copyrighted material

Urgences-Réanimation

D. Osman

Anesthésie

M.-P. Bonnet, K. Bouferrache, J. Josserand

L'OUVRAGE

Cet ouvrage de **cours synthétique** traite l'ensemble des items d'**urgences-réanimation** et d'**anesthésie** figurant au **programme de DCEM2-DCEM4**.
Chaque chapitre, consacré à un item, est rédigé suivant un plan identique, original, clair et très didactique qui facilite l'**apprentissage**.
Chaque item comprend les éléments systématiques suivants :
- les **conférences de consensus**, d'experts et les recommandations existantes ;
- des **schémas**, des **algorithmes** et de l'**iconographie** ;
- des **encadrés** sur les notions importantes ;
- des repères permettant d'identifier les **sujets déjà tombés** au concours de l'internat et aux ECN (depuis 1995), clairement indiqués en regard du thème tombé avec leur date et un court résumé des Annales ;
- des **renvois transversaux** vers les autres items du programme (intra- et interdisciplinaires) ;
- les « **zéros** » aux questions ;
- une « **Fiche Dernier tour** » qui propose un résumé de l'item pour une révision complète et rapide de celui-ci.

LE PUBLIC

Les étudiants de DCEM qui souhaitent se préparer efficacement aux **Épreuves Classantes Nationales**.

LES AUTEURS

David Osman *est réanimateur, praticien hospitalier, service de réanimation médicale, hôpital de Bicêtre, le Kremlin-Bicêtre.*

Marie-Pierre Bonnet *est chef de clinique-assistant en anesthésie-réanimation, hôpital Antoine Béclère, AP-HP.*

Koceila Bouferrache *est interne en anesthésie-réanimation des hôpitaux de Paris.*

Julien Josserand *est interne en anesthésie-réanimation des hôpitaux de Paris.*

*Les directeurs de la collection – **Gabriel Perlemuter, David Montani et Léon Perlemuter** – sont réputés pour leurs qualités pédagogiques et sont auteurs de nombreux ouvrages.*

978-2-294-08340-2



© BSIP LARRY MULVEHILL

Pour vous préparer aux ECN
retrouvez tous les items et les ouvrages de DCEM
sur www.masson.fr

Copyrighted material